AgroStar

INSTRUCTIONS

READ BEFORE USE

AGGRESSOR

Emamectin Benzoate 5% SG

(Insecticide)

Manufactured & Marketed By:

Ulink Agritech Private Limited,
Regd. Office: Office Nos. 001 and 002, Ground Floor, Wing "A"
Office Nos. 003 and 004, Ground Floor, Wing "B"
Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune – 411014, Maharashtra, India

Manufactured At:

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit I - Facility B-1, Plot No.238/1/A , GIDC Estate Panoli, Ankleshwer, Bharuch Gujarat-394116	GJ-BHA-01485
AGB	Unit II - Khasra No 713/84, Gram Dahmi Khurd, Bagru, Jaipur, Rajasthan - 302007	MLJDPP/2025-26/221

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

AgroStar

सुचना

इस्तेमाल करनेसे पहले ध्यान पूर्वक पढें।

एग्रैसर

इमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी.

(कीटनाशक)

निर्माित एवं विपणन द्वारा:

यू-लिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय सं. ००१ और ००२, भूतल, विंग "ए"
कार्यालय सं. ००३ और ००४, भूतल, विंग "बी"
न्याती टेक पार्क, वडगांव शेरी, पुणे – ४११०१४, महाराष्ट्र, भारत

निर्माण स्थल:

यूनिट कोड	फैक्ट्री पता	निर्माण लाइसेंस संख्या
ए. जी. के.	यूनिट I – शेड नं. ७३/बी, सर्वे नं. ७३, जूनी जीठारडी, तालुका करजन, वडोदरा, गुजरात – ३९१२४०	जी.जे-ए.एच.एम-०१२१३
ए. जी. पी.	यूनिट I – सुविधा बी-१, प्लॉट नं. २३८/१/ए, जीआईडीसी एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात – ३९४११६	जी.जे.बी.एच.ए.-०१४८५
ए. जी. बी.	यूनिट II – खसरा नं. ७१३/८४, ग्राम दहमी खुर्द, बगरू, जयपुर, राजस्थान – ३०२००७	एम.एल.जे.डी.पी.पी.-२५-२६/२२१

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Emamectin Benzoate 5% SG

(Insecticide)

Emamectin benzoate 5% SG is a water soluble granular formulation containing 5% active ingredient and is recommended for the control of Bollworms on cotton, Fruit and shoot borer on okra, DBM on cabbage, Fruit borer, thrips, mites on chilli, fruit and shoot borer on brinjal, pod borer on red gram, chickpea Graps-Thrips and Tea - Tea looper. It is an insecticide with stomach action and should be ingested by the larvae to be most effective. Affected larvae become paralyzed and stop feeding shortly after exposure to Emamectin Benzoate 5% SG and subsequently die after 2–4 days.

Recommendation :

Crops	Common Name of Pests	Dosage/Ha		Dilution in water (ltr)	Waiting period between last spray and harvesting (Days)
		AI (g)	Formulation (g)		
Brinjal	Fruit & Shoot borer	10	200	500	3
Cabbage	Diamond back moth	7.5–10	150–200	500	3
Chickpea	Pod borer	11	220	500	14
Chilli	Fruit borer, Thrips, Mites	10	200	500	3
Cotton	Bollworms	9.5–11.0	190–220	500	10
Grapes	Thrips	11	220	500–1000	5
Okra	Fruit and shoot borer	6.75–8.5	135–170	500	5
Redgram	Pod borer	11	220	500–750	14
Tea	Tea looper	10	200	500	1

Directions for Use:
Apply the insecticide when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary. Apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the foliage.

Precautions:
1. Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use a stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Also avoid inhalation of fog and vapours. 2. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. 3. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. 4. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after work is over. Also wash the contaminated clothes. 5. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticides.

Symptoms of Poisoning:
Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular incoordination, ataxia and muscle tremors.

First Aid Measures:
1. Remove the affected person from the danger zone to well-ventilated rooms or to fresh air and protect from under cooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 2. Rinse eyes with clean water for several minutes. 3. If ingested give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately.

Note:
Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Antidote:
No specific antidote. Treat symptomatically.

Caution:
NOT to be used on crops other than the ones specified above.

Storage:
1. The package containing the insecticides should be stored in original containers in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms and premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit, and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Disposal of used containers:
1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Caution :
Not to be used on crops other then specified on this label / leaflet.

एमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी.

(कीटनाशक)

एमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी. एक जल में घुलनशील दानेदार फॉर्म्युलेशन है जिसमें ५% सक्रिय घटक होता है और इसे कपास पर बॉलवर्म, भिंडी पर फल एवं तना छेदक, पत्ता गोभी पर डी.बी.एम., मिर्च पर फल छेदक, थ्रिप्स, माइट्स, बैंगन पर फल एवं तना छेदक, अरहर पर फली छेदक, चना पर फली छेदक, अंगूर पर थ्रिप्स तथा चाय पर टी लूपर के नियंत्रण हेतु अनुशंसित किया जाता है। यह एक पेट की क्रिया वाला कीटनाशक है जिसे प्रभावी परिणाम के लिए लार्वा द्वारा निगलना आवश्यक होता है। प्रभावित लार्वा सुन्न हो जाते हैं और एमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी. के संपर्क में आने के थोड़े समय बाद भोजन करना बंद कर देते हैं तथा तत्पश्चात २–४ दिनों में मर जाते हैं।

सिफारिश

फसल	कीटों का सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी में घोलने की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव और फसल कटाई के बीच प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)
		सक्रिय घटक (ग्रा.)	फॉर्म्युलेशन (ग्रा.)		
बैंगन	फल एवं तना छेदक कीट	१०	२००	५००	३
पत्ता गोभी	डायमंड बैक मॉथ	७.५–१०	१५०–२००	५००	३
चना	फली छेदक कीट	११	२२०	५००	१४
मिर्च	फल छेदक, थ्रिप्स, माइट्स	१०	२००	५००	३
कपास	बॉलवर्म्स	९.५–११.०	१९०–२२०	५००	१०
अंगूर	थ्रिप्स	११	२२०	५००–१०००	५
भिंडी	फल एवं तना छेदक कीट	६.७५–८.५	१३५–१७०	५००	५
अरहर	फली छेदक कीट	११	२२०	५००–७५०	१४
चाय	टी लूपर	१०	२००	५००	१

उपयोग की दिशा:
कीटनाशक का प्रयोग तब करें जब इल्ली की उपस्थिति पहली बार देखी जाए और आवश्यकता अनुसार पुनः प्रयोग करें। कीटनाशक को पर्याप्त मात्रा में पानी में मिलाकर फसल की पत्तियों पर समान रूप से छिड़काव करें ताकि पूरा भाग अच्छी तरह से भीग जाए।

सावधानियाँ:
१) छिड़काव घोल तैयार करने के लिए रसोई के बर्तनों का उपयोग न करें। घोल को हिलाने के लिए डंडी का प्रयोग करें। त्वचा, आँखों और कपड़ों के संपर्क से बचें। धुंए और वाष्पों के साँस में जाने से भी बचें। २) त्वचा के संपर्क से बचने के लिए हाथों में दस्ताने पहनें। ३) उत्पाद को संभालते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क, चश्मा और जूते पहनें। उत्पाद को संभालते या छिड़कते समय खाना, पीना या धूम्रपान न करें। ४) कार्य समाप्त होने के बाद साबुन और पर्याप्त पानी से हाथ धोएँ तथा कपड़े बदलें। संक्रमित कपड़ों को भी धोएँ। ५) हवा और जल स्रोतों को कीटनाशकों से प्रदूषित होने से बचाएँ।

विषाक्तता के लक्षण:
विषाक्तता के प्रारंभिक लक्षणों में आँखों की पुतलियों का फैलना, मांसपेशियों का असंतुलन, चलने में डगमगाहट और मांसपेशियों में कंपकंपी शामिल हो सकती है।

प्राथमिक उपचार:
१) प्रभावित व्यक्ति को खतरे वाले क्षेत्र से निकालकर हवादार स्थान या खुले वातावरण में ले जाएँ और ठंड से बचाएँ। दूषित कपड़े उतरें और प्रभावित भाग को साबुन व पानी से अच्छी तरह धोएँ। २) आँखों को कई मिनट तक साफ पानी से धोएँ। ३) यदि व्यक्ति ने इसे निगल लिया है और वह निगलने में सक्षम है तो उसे एक या दो गिलास पानी दें। उल्टी न कराएँ। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

नोट:
उल्टी न कराएँ और बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें।

प्रतिविष:
कोई विशिष्ट प्रतिविष नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

सावधानी:
ऊपर निर्दिष्ट फसलों के अतिरिक्त अन्य किसी फसल पर उपयोग न करें।

भंडारण:
१) कीटनाशक वाले पैकेट को मूल कंटेनर में ही अलग कमरे या स्थान पर रखें जहाँ अन्य वस्तुएँ विशेषकर खाद्य सामग्री न रखी गई हों या इन्हें अलग अलमारी में ताले में बंद रखें। २) कीटनाशक भंडारण के लिए बनाए गए कमरे पक्के, हवादार, रोशन और पर्याप्त आकार के होने चाहिए ताकि वाष्पों से प्रदूषण न हो।

प्रयुक्त कंटेनरों का निपटान:
१) पैकेट, बची हुई सामग्री या मशीनों व कंटेनरों से निकले पानी को इस प्रकार निपटाएँ कि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो। २) प्रयुक्त पैकेटों को बाहर न छोड़ें ताकि उनका पुनः उपयोग न किया जा सके। ३) पैकेटों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

सावधानी :
इस लेबल / पुस्तिका में निर्दिष्ट फसलों के अतिरिक्त अन्य किसी फसल पर उपयोग न करें।

એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ ૫% એસ.જી.

(જીવાતનાશક)

ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ ૫% એસ.જી. એક પાણીમાં દ્રાવ્ય દાણેદાર ફોર્મ્યુલેશન છે જેમાં ૫% સક્રિય ઘટક હોય છે અને તેનો ઉપયોગ કપાસ પર બોલવોર્મ, ભીંડા પર ફળ અને શૂટ બોરર, કોબી પર ડી.બી.એમ., મરચાં પર ફળ બોરર, થ્રિપ્સ, માઇટ્સ, રીંગણ પર ફળ અને શૂટ બોરર, તુવેર પર ફળી બોરર, ચણા પર ફળી બોરર, દ્રાક્ષ પર થ્રિપ્સ અને ચા પર ટી લૂપરના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ એક પેટની ક્રિયાવાળી કીટનાશક છે. જેંનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માટે લાર્વાએ તેને ગળવું આવશ્યક છે. અસરગ્રસ્ત લાર્વા સુન્ન થઈ જાય છે અને ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ ૫% એસ.જી.ના સંસર્ગ બાદ થોડા સમયમાં ખાવું બંધ કરી દે છે અને ત્યારબાદ ૨–૪ દિવસમાં મરી જાય છે.

ભલામણ :

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીમાં દ્રાવણ (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવ અને પાક કાપણી વચ્ચેની રાહ જોવાની અવધિ (દિવસોમાં)
		સક્રિય પદાર્થ (ગ્રા.)	ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રા.)		
રીંગણ	ફળ અને શૂટ બોરર	૧૦	૨૦૦	૫૦૦	૩
કોબી	ડાયમંડ બેક મોથ	૭.૫–૧૦	૧૫૦–૨૦૦	૫૦૦	૩
ચણા	ફળી બોરર	૧૧	૨૨૦	૫૦૦	૧૪
મરચાં	ફળ બોરર, થ્રિપ્સ, માઇટ્સ	૧૦	૨૦૦	૫૦૦	૩
કપાસ	બોલવર્મ્સ	૯.૫–૧૧.૦	૧૯૦–૨૨૦	૫૦૦	૧૦
દ્રાક્ષ	થ્રિપ્સ	૧૧	૨૨૦	૫૦૦–૧૦૦૦	૫
ભીંડો	ફળ અને શૂટ બોરર	૬.૭૫–૮.૫	૧૩૫–૧૭૦	૫૦૦	૫
તુવેર	ફળી બોરર	૧૧	૨૨૦	૫૦૦–૭૫૦	૧૪
ચા	ટી લૂપર	૧૦	૨૦૦	૫૦૦	૧

ઉપયોગની દિશા:
ઇયળનું પ્રકોપ પ્રથમવાર જોવામાં આવે ત્યારે જ કીટનાશકનો ઉપયોગ કરો અને જરૂરી હોય ત્યારે પુનઃપ્રયોગ કરો. કીટનાશકને પૂરતી માત્રામાં પાણીમાં ભેળવીને પાકનાં પાંદડાઓ પર સમાન રીતે છંટકાવ કરો જેથી આખું પાંદડું સારી રીતે ભીનું થાય.

સાવચેતીઓ:
૧) રસોઈના વાસણોનો ઉપયોગ છંટકાવ દ્રાવણ તૈયાર કરવા માટે ન કરો. દ્રાવણ હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચા, આંખો અને કપડાંના સંપર્કથી બચો. ધૂમ્રપાન અને વરાળના શ્વાસ લેવાથી પણ બચો. ૨) ત્વચાના સંપર્કથી બચવા હાથમાં દસ્તાના પહેરો. ૩) ઉત્પાદનને હેન્ડલ કરતી વખતે રક્ષાત્મક કપડાં, માસ્ક, ચશ્મા અને બૂટ પહેરો. ઉત્પાદન હેન્ડલ કરતા કે છંટકાવ કરતા સમયે ખાવું, પીવું કે ધૂમ્રપાન ન કરો. ૪) કામ પૂરું થયા પછી સાબુ અને પૂરતા પાણીથી હાથ ધોવો અને કપડાં બદલો. સંક્રમિત કપડાં પણ ધોવો. ૫) હવા અને જળ સ્ત્રોતોને કીટનાશકથી પ્રદૂષિત થવાથી બચાવો.

વિષાક્તતાના લક્ષણો:
વિષાક્તતાના પ્રારંભિક લક્ષણોમાં આંખની પુતળીનું વિસ્તરણ, સ્નાયુઓનો અસંતુલન, ચાલવામાં અસ્થિરતા અને સ્નાયુઓમાં કંપારી જોવા મળી શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર:
૧) પ્રભાવિત વ્યક્તિને જોખમવાળા વિસ્તારમાંથી બહાર કાઢો અને હવાદાર જગ્યા કે ખુલ્લા હવામાં લઈ જાઓ અને ઠંડકથી બચાવો. સંક્રમિત કપડાં ઉતારો અને પ્રભાવિત ભાગને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવો. ૨) આંખોને થોડા મિનિટ સુધી સ્વચ્છ પાણીથી ધોવો. ૩) જો વ્યક્તિએ તેને ગળી લીધું હોય અને તે ગળી શકે તેવી સ્થિતિમાં હોય, તો તેને એક કે બે ગ્લાસ પાણી આપો. ઉલટી ન કરાવો. તરત જ ડૉક્ટરની સારવાર લો.

નોંધ:
ઉલટી ન કરાવો અને બેભાન વ્યક્તિને મોઢેથી કંઈ ન આપો.

વિષવિરુદ્ધ દવા:
કોઈ વિશિષ્ટ વિષવિરુદ્ધ દવા નથી. લક્ષણાનુસાર સારવાર કરો.

સાવચેતી:
ઉપર જણાવેલા પાક સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરો.

સંગ્રહ:
૧) કીટનાશક ધરાવતા પેકેટને મૂળ કન્ટેનરમાં જ અલગ રૂમ કે જગ્યાએ રાખો જ્યાં અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય સામગ્રી ન રાખવામાં આવી હોય અથવા તેને અલગ અલમારીમાં તાળા મારી રાખો. ૨) કીટનાશકના સંગ્રહ માટેના રૂમ સારી રીતે બાંધેલા, હવાદાર, પ્રકાશિત અને પૂરતા કદના હોવા જોઈએ જેથી વરાળથી પ્રદૂષણ ન થાય.

વપરાયેલા કન્ટેનરનો નિકાલ:
૧) પેકેટ, બાકી રહેલી સામગ્રી અથવા મશીનો અને કન્ટેનર ધોઈને નીકળેલા પાણીનો નિકાલ એવા રીતે કરો કે પર્યાવરણ કે જળ પ્રદૂષણ ન થાય. ૨) વપરાયેલા પેકેટોને બહાર ન છોડી દો જેથી તેનો પુનઃઉપયોગ ન થઈ શકે. ૩) પેકેટોને તોડી વસ્તીવાળા વિસ્તારથી દૂર જમીનમાં દાટી દો.

સાવચેતી :
આ લેબલ / પુસ્તિકામાં દર્શાવેલ પાક સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરો.

एमामेक्टिन बेंझोएट ५% एस.जी.

(कीटकनाशक)

इमामेक्टिन बेंझोएट ५% एस.जी. हे पाण्यात विरघळणारे दाणेदार फॉर्म्युलेशन आहे ज्यामध्ये ५% सक्रिय घटक असतो आणि ते कापूसवरील बॉलवर्म्स, भेंडीवरील फळ व खोड छेदक, कोबीवरील डी.बी.एम., मिरचीवरील फळ छेदक, थ्रिप्स, माइट्स, वांगीवरील फळ व खोड छेदक, तूरवरील शेंगा छेदक, हरभरा वरील शेंगा छेदक, द्राक्षावरील थ्रिप्स तसेच चहावरील टी लूपर यांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केले जाते. हे पोटाच्या क्रियेवर कार्य करणारे कीटकनाशक आहे, ज्याचे प्रभावी परिणाम मिळविण्यासाठी लार्वाने ते गिळणे आवश्यक असते. प्रभावित लार्वा लकवाग्रस्त होतात आणि इमामेक्टिन बेंझोएट ५% एस.जी.च्या संपर्कानंतर थोड्याच वेळात अन्न घेणे थांबवतात आणि त्यानंतर २–४ दिवसांत मरतात.

शिफारस :

पीक	कीटकांचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्यातील द्रावण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीनंतर काढणीपर्यंतची प्रतीक्षा अवधि (दिवसांमध्ये)
		सक्रिय घटक (ग्रॅ.)	फॉर्म्युलेशन (ग्रॅ.)		
वांगी	फळ व खोड छेदक	१०	२००	५००	३
कोबी	डायमंड बॅक पतंग	७.५–१०	१५०–२००	५००	३
चणा	फळी बोरर	११	२२०	५००	१४
हरभरा	शेंगा छेदक	११	२२०	५००	१४
मिरची	फळ छेदक, थ्रिप्स, माइट्स	१०	२००	५००	३
कापूस	बॉलवर्म्स	९.५–११.०	१९०–२२०	५००	१०
द्राक्षे	थ्रिप्स	११	२२०	५००–१०००	५
भेंडी	फळ व खोड छेदक	६.७५–८.५	१३५–१७०	५००	५
तूर	शेंगा छेदक	११	२२०	५००–७५०	१४
चहा	टी लूपर	१०	२००	५००	१

वापराची दिशा:
अळ्या दिसताच कीटकनाशकाचा वापर करा आणि आवश्यकतेनुसार पुन्हा वापर करा. कीटकनाशक पुरेशा प्रमाणात पाण्यात मिसळून पिकांच्या पानांवर समान रीतीने फवारणी करा, ज्यामुळे संपूर्ण पान व्यवस्थित ओलसर होईल.

सावधगिरी:
१) फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकघरातील भांडी वापरू नका. द्रावण ढवळण्यासाठी काठीचा वापर करा. त्वचा, डोळे आणि कपड्यांच्या संपर्कापासून दूर राहा. धूर आणि वाफेचे श्वसन टाळा. २) त्वचेच्या संपर्कापासून वाचण्यासाठी हातमोजे वापरा. ३) उत्पादन हाताळताना संरक्षणात्मक कपडे, मास्क, चष्मा आणि बूट वापरा. उत्पादन हाताळताना किंवा फवारणी करताना खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करू नका. ४) काम संपल्यानंतर साबण आणि पुरेशा पाण्याने हात धुवा आणि कपडे बदला. दूषित कपडे सुद्धा धुवा. ५) हवा आणि पाण्याचे स्त्रोत कीटकनाशकांमुळे दूषित होणार नाहीत याची काळजी घ्या.

विषबाधेची लक्षणे:
विषबाधेची सुरुवातीची लक्षणे म्हणजे डोळ्यांच्या बाहुल्यांचा प्रसार, स्नायूंचा असमतोल, चालण्यात अस्थिरता आणि स्नायूंमध्ये कंप सुटणे अशी असू शकतात.

प्राथमिक उपचार:
१) प्रभावित व्यक्तीला धोकादायक क्षेत्रातून काढून हवेशीर ठिकाणी किंवा मोकळ्या हवेत आणा आणि थंडीपासून वाचा. दूषित कपडे काढा आणि प्रभावित भाग साबण व पाण्याने नीट धुवा. २) डोळे काही मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा. ३) जर व्यक्तीने औषध गिळले असेल आणि तो गिळू शकत असेल तर त्याला एक किंवा दोन ग्लास पाणी द्या. उलटी करू नका. त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

नोंद:
उलटी करू नका आणि बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका.

प्रतिविष:
कोणतेही विशिष्ट प्रतिविष नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

सावधगिरी:
वरील नमूद केलेल्या पिकांखेरीज इतर कोणत्याही पिकावर वापर करू नका.

साठवण:
१) कीटकनाशक असलेले पॅकेट मूळ कंटेनरमध्येच स्वतंत्र खोलीत किंवा ठिकाणी ठेवा, जिथे इतर वस्तू, विशेषतः खाद्यपदार्थ ठेवलेले नसतील किंवा वेगळ्या कपाटात कुलूपबंद ठेवा. २) कीटकनाशक साठवण्यासाठीची खोली मजबूत, हवेशीर, प्रकाशमान आणि योग्य आकाराची असावी, जेणेकरून वाफेमुळे प्रदूषण होणार नाही.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट:
१) पॅकेट, उरलेली सामग्री किंवा यंत्रे व कंटेनर धुतल्यानंतर निघालेले पाणी पर्यावरण किंवा जलप्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने टाकावे. २) वापरलेले पॅकेट बाहेर सोडू नका, जेणेकरून त्यांचा पुनर्वापर होणार नाही. ३) पॅकेट तोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरावे.

सावधगिरी :
या लेबल / पुस्तिकेमध्ये नमूद केलेल्या पिकांखेरीज इतर कोणत्याही पिकावर वापर करू नका.

ایما میکٹین بینزوایٹ 5% ایس۔جی۔

(کیڑےمار دوا)

ایما میکٹین بینزوایٹ 5% ایس۔جی۔ ایک پانی میں حل پذیر دانے دار فارمولا ہے جس میں 5% فعال جزو شامل ہوتا ہے اور اسے کپاس پر پال ورم، بھنڈی پر پھل اور تنے کا چورا، چنے کا گوبھی پر ڈی۔بی۔ایم۔، مرچ پر پھل کا چورا، بینگن پر پھل اور تنے کا چورا، ارہر پر پھلی کا چورا، چنے پر پھلی کا چورا، انگور پر تھرپس اور چائے پر ٹی لوپر کے کنٹرول کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک معدہ کے عمل والا کیڑے مار دوا ہے جسے بہترین اثر کے لیے سنڈیوں کے ذریعے نگلنا ضروری ہوتا ہے۔ متاثرہ سنڈیاں مفلوج ہو جاتی ہیں اور ایما میکٹین بینزوایٹ 5% ایس۔جی۔ کے اثر میں آنے کے کچھ وقت بعد کھانا چھوڑ دیتی ہیں اور 2–4 دن کے اندر مر جاتی ہیں۔

سفارش :

فصل	کیڑوں کا عام نام	فی ایکڑ خوراک		پانی کا حجم (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ اور کٹائی کے درمیان انتظار کے دنوں میں)
		فعال جزو (گرام)	فارمولیشن (گرام)		
بینگن	پھل اور تنے کا چورا	10	200	500	3
بند گوبھی	ڈائمنڈ بیک موتھ	7.5–10	150–200	500	3
چنا	پھلی کا چورا	11	220	500	14
مرچ	پھل، تنے کا چورا، تھرپس، مائٹس	10	200	500	3
کپاس	بال ورم	9.5–11.0	190–220	500	10
انگور	تھرپس	11	220	500–1000	5
بھنڈی	پھل اور تنے کا چورا	6.75–8.5	135–170	500	5
ارہر	پھلی کا چورا	11	220	500–750	14
چائے	ٹی لوپر	10	200	500	1

استعمال کی ہدایت:
جب سنڈیاں سب سے پہلے نظر آئیں تو کیڑے مار دوا کا استعمال کریں اور ضرورت کے مطابق دوبارہ استعمال کریں۔ کیڑے مار دوا کو مناسب مقدار میں پانی میں ملا کر فصل کے پتوں پر یکساں طور پر چھڑکاؤ کریں تاکہ تمام پتے اچھی طرح تر ہو جائیں۔

احتیاطی تدابیر:
چھڑکاؤ کا محلول تیار کرنے کے لیے باورچی خانے کے برتن استعمال نہ کریں۔ محلول کو ہلانے کے لیے لکڑی کی چھڑی استعمال کریں۔ جلد، آنکھوں اور کپڑوں سے رابطہ کرنے سے گریز کریں۔ دھوئیں اور بخارات کو سانس میں لینے سے بھی پرہیز کریں۔
1) جلد سے رابطے سے بچنے کے لیے دستانے پہنیں۔
2) مصنوعات کو سنبھالتے وقت حفاظتی لباس، ماسک، چشمے اور جوتے پہنیں۔ مصنوعات کو سنبھالتے یا چھڑکتے وقت کھانا، پینا یا سگریٹ نوشی نہ کریں۔
3) کام مکمل ہونے کے بعد صابن اور وافر پانی سے ہاتھ دھوئیں اور کپڑے تبدیل کریں۔ آلودہ کپڑے بھی دھوئیں۔
4) ہوا اور پانی کے ذخائر کو کیڑے مار ادویات سے آلودہ ہونے سے بچائیں۔

زہر کی علامات:
زہر کی ابتدائی علامات میں آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا، پٹھوں میں عدم توازن، چلنے میں لڑکھڑاہٹ اور پٹھوں میں کپکپی شامل ہو سکتی ہیں۔

ابتدائی طبی امداد:
متاثرہ شخص کو خطرناک علاقے سے نکال کر ہوا دار جگہ یا کھلی ہوا میں لے جائیں اور سردی سے محفوظ رکھیں۔ آلودہ کپڑے اتاریں اور متاثرہ حصے کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
1) آنکھوں کو چند منٹ تک صاف پانی سے دھوئیں۔
2) اگر متاثرہ شخص نے زہر نگل لیا ہو اور نگلنے کے قابل ہو تو اسے ایک یا دو گلاس پانی پلائیں۔ قے نہ کرائیں۔ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

نوٹ:
قے نہ کرائیں اور بے ہوش شخص کو منہ سے کچھ نہ دیں۔

تریاق:
کوئی مخصوص تریاق نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

احتیاط:
اوپر بیان کردہ فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر استعمال نہ کیا جائے۔

ذخیرہ:
1) کیڑے مار دوا والے پیکٹ کو اصل کنٹینر میں الگ کمرے یا جگہ پر رکھیں جہاں دوسری اشیاء خاص طور پر خوراک سے دور رکھی ہوئی یا الگ الماری میں بند کر کے رکھیں۔
2) کیڑے مار دوا ذخیرہ کرنے کے لیے کمرہ مضبوط، ہوا دار، روشن اور مناسب سائز کا ہونا چاہیے تاکہ بخارات سے آلودگی نہ ہو۔

استعمال شدہ کنٹینر کی تلفی:
پیکٹ، بچی ہوئی دوا یا مشینوں اور برتنوں سے دھلا ہوا پانی ماحول یا پانی کو آلودہ کرنے سے بچنے کے لیے محفوظ طریقے سے ضائع کریں۔
1) استعمال شدہ پیکٹ باہر نہ چھوڑیں تاکہ ان کا دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔
2) پیکٹوں کو توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کریں۔

احتیاط :
اس لیبل / کتابچے میں درج فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر استعمال نہ کیا جائے۔

എമാമെക്റ്റിൻ ബെൻസോയേറ്റ് ൫% എസ്.ജി.
(കീടനാശിനി)

ഇമാമെക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് ൫% എസ്.ജി. എന്നത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ദാനാദാരമായ ഫോർമുലേഷനാണ്, ഇതിൽ ൫% സജീവ ഘടകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പരുത്തിയിൽ ബോൾവർം, വെണ്ടയിൽ ഫലം, തണ്ട് തുളച്ചുകടക്കുന്ന പുഴു, മുട്ടക്കോസിൽ ഡി.ബി.എം., മുളകിൽ ഫലം തുളയ്ക്കുന്നവ, ത്രിപ്സ്, മൈറ്റ്സ്, വൃത്താകയിൽ ഫലം, തണ്ട് തുളച്ചുകടക്കുന്നവ, തുവരയിൽ പൊട് ബോറർ, കടലയിൽ പൊട് ബോറർ, മുന്തിരിയിൽ ത്രിപ്സ്, ചായയിൽ ടി ലൂപ്പർ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് വയറ്റിലെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കീടനാശിനിയാണ്, ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാകാൻ ഇത് ലാർവകൾ വിഴുങ്ങണം. ബാധിതമായ ലാർവകൾ സ്തംഭിച്ചു പോകുകയും ഇമാമെക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് ൫% എസ്.ജി. യുടെ സമ്പർക്കത്തിന് ശേഷം ചെറിയ സമയംക്കുള്ളിൽ ഭക്ഷണം നിർത്തുകയും തുടർന്ന് ൨-൪ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശുപാർശ :

വിള	കീടങ്ങളുടെ സാധാരണ പേര്	ഹെക്ടറിന് പ്രതി അളവ്		വെള്ളത്തിൽ കലക്കേണ്ട അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേയും കൊയ്ത്തും തമ്മിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലം (ദിവസങ്ങൾ)
		സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം)		
വൃത്താക	പഴവും തണ്ടും തുളച്ചു കയറുന്ന കീടം	൧൦	൨൦൦	൫൦൦	൩
മുട്ടക്കോസ്	ഡയമണ്ട് ബാക്ക് മോത്ത്	൭.൫-൧൦	൧൫൦-൨൦൦	൫൦൦	൩
കടല	കൊട്ടു ഴഞ്ഞു കയറുന്ന കീടം	൧൧	൨൨൦	൫൦൦	൧൪
മുളക്	പഴം തുളയ്ക്കുന്നവ, ത്രിപ്സ്, മൈറ്റ്സ്	൧൦	൨൦൦	൫൦൦	൩
പരുത്തി	ബോൾവർംസ്	൯.൫-൧൧.൦	൧൯൦-൨൨൦	൫൦൦	൧൦
മുന്തിരി	ത്രിപ്സ്	൧൧	൨൨൦	൫൦൦-൧൦൦൦	൫
വെണ്ട	പഴവും തണ്ടും തുളച്ചു കയറുന്ന കീടം	൬.൭൫-൮.൫	൧൩൫-൧൭൦	൫൦൦	൫
തുവര	കൊട്ടു ഴഞ്ഞു കയറുന്ന കീടം	൧൧	൨൨൦	൫൦൦-൭൫൦	൧൪
ചായ	ടി ലൂപ്പർ	൧൦	൨൦൦	൫൦൦	൧

ഉപയോഗത്തിന്റെ ദിശ:
ഇള്ളികൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രയോഗിക്കുക. കീടനാശിനി ആവശ്യമായ അളവിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി വിളയുടെ ഇലകളിൽ സമമായി തളിക്കണം, അതിലൂടെ മുഴുവൻ ഇലയും നനയുന്നത് ഉറപ്പാക്കണം.

ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
൧) തളിക്കൽ ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കാൻ അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ദ്രാവകം കലക്കാൻ ഒരു ചൂലികൊണ്ട് കലക്കുക. ത്വക്ക്, കണ്ണ്, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. മൂടൽമഞ്ഞും വാതകങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ൨) ത്വക്കുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ കൈയ്യുറ ധരിക്കുക. ൩) ഉൽപ്പന്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ, മാസ്ക്, കണ്ണട, ബൂട്ട് എന്നിവ ധരിക്കുക. ഉൽപ്പന്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, കുടിക്കരുത്, പുകവലിക്കരുത്. ൪) ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം സോപ്പും ശുദ്ധജലവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം കഴുകുക. ൫) കീടനാശിനികൾ കൊണ്ട് വായുവും ജലാശയങ്ങളും മലിനമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:
വിഷബാധയുടെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ കണ്ണിലെ മാണിക്യങ്ങളുടെ വലുപ്പം കൂടുക, മാംസപേശികളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, നടയിൽ അസ്ഥിരത, മാംസപേശികളുടെ വിറയൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.

ആദ്യ ശുശ്രൂഷാ നടപടികൾ:
൧) ബാധിത വ്യക്തിയെ അപകട മേഖലയിൽ നിന്ന് വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കോ തുറസ്സായ വായുവിലേക്കോ മാറ്റി തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക. മലിന വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ച് ബാധിത ഭാഗം സോപ്പും വെള്ളവും കൊണ്ട് നന്നായി കഴുകുക. ൨) കണ്ണുകൾ കുറച്ച് മിനിറ്റ് ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകുക. ൩) വ്യക്തി കീടനാശിനി വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ വിഴുങ്ങാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കൂ. ഛർദ്ദി വരുത്തരുത്. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.

കുറിപ്പ്:
ഛർദ്ദി വരുത്തരുത്, ബോധം കെട്ട വ്യക്തിക്ക് വായിലൂടെ എന്തും നൽകരുത്.

പ്രതിവിഷം:
പ്രത്യേക പ്രതിവിഷമില്ല. ലക്ഷണാനുസൃതമായി ചികിത്സിക്കുക.

ജാഗ്രത:
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളകൾക്ക് പുറമേ മറ്റേതെങ്കിലും വിളയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

സംഭരണം:
൧) കീടനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കറ്റ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ മറ്റു സാധനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അലമാരയിൽ പൂട്ടി വയ്ക്കുക. ൨) കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി ദൃഢമായതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും മതിയായ പ്രകാശമുള്ളതും യഥാർത്ഥ വലിപ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം, വാതകങ്ങളാൽ മലിനമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നശീകരണം:
൧) പാക്കറ്റുകൾ, ശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, കണ്ടെയ്നറുകൾ മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ജലം മലിനമാക്കാത്ത വിധത്തിൽ നശിപ്പിക്കുക. ൨) ഉപയോഗിച്ച പാക്കറ്റുകൾ പുറത്തുവെക്കരുത്, അതുവഴി അവ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ൩) പാക്കറ്റുകൾ തകർത്തു ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള മണ്ണിനടിയിൽ അടക്കുക.

ജാഗ്രത :
ഈ ലേബലിൽ / പുസ്തികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിളകൾക്ക് പുറമെ മറ്റേതെങ്കിലും വിളയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

ఎమామెకిటిన్ బెంజోయేట్ ౫% ఎస్.జి.
(పురుగుమందు)

ఇమామెకిటిన్ బెంజోయేట్ ౫% ఎస్.జి. అనేది నీటిలో కరిగే సూతర్రూప గార్నుయ్లర్ తయారీగా ఉంటుంది, ఇందులో ౫% కిర్యాశీల పదారథ్ం ఉంటుంది. ఇది పతిత్లో బోల్ వర్మ్స్, బెండకాయలో పండు మరియు కొమమ్ తినే పురుగులు, కాయ్బేజీలో డీ.బీ.ఎం., మిరపలో పండు బోరర్, తిర్పస్, మైటస్, వంకాయలో పండు మరియు కొమమ్ తినే పురుగులు, తూరలో పాడ్ బోరర్, శనగలో పాడ్ బోరర్, దార్కష్లో తిర్పస్ మరియు చాయ్లో టీ లూపర్ నియంతర్ణ కోసం సిఫారుస్ చేయబడుతుంది. ఇది కడుపు చరయ్ దావ్రా పనిచేసే పురుగుమందు, ఇది పర్భావవంతంగా ఉండాలంటే లారావ్ దానిని తినాలి. పర్భావిత లారావ్లు సథ్ంభించి పోతాయి మరియు ఇమామెకిటిన్ బెంజోయేట్ ౫% ఎస్.జి.కు గురైన కొదిద్సమయం తరువాత తినడం ఆపేసాత్యి మరియు ఆ తరువాత ౨-౪ రోజులోల్ చనిపోతాయి.

సిఫారుస్ :

పంట	కీటకాలకు సాధారణ పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు		నీటిలో కలపవలసిన మోతాదు (లీటర్లు)	చివరి పిచికారీ మరియు కోత మధ్య వేచి ఉండవలసిన వ్యవధి (రోజులు)
		క్రియాశీల పదార్థం (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా)		
వంకాయ	పండు మరియు కొమ్మ దోమ	౧౦	౨౦౦	౫౦౦	౩
క్యాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ మోత్	౭.౫-౧౦	౧౫౦-౨౦౦	౫౦౦	౩
శనగ	పాడ్ బోరర్	౧౧	౨౨౦	౫౦౦	౧౪
మిర్చి	పండు బోరర్, త్రిప్స్, మైట్స్	౧౦	౨౦౦	౫౦౦	౩
పత్తి	బోల్ వర్మ్స్	౯.౫-౧౧.౦	౧౯౦-౨౨౦	౫౦౦	౧౦
ద్రాక్ష	త్రిప్స్	౧౧	౨౨౦	౫౦౦-౧౦౦౦	౫
బెండకాయ	పండు మరియు కొమ్మ దోమ	౬.౭౫-౮.౫	౧౩౫-౧౭౦	౫౦౦	౫
తూర	పాడ్ బోరర్	౧౧	౨౨౦	౫౦౦-౭౫౦	౧౪
చాయ్	టీ లూపర్	౧౦	౨౦౦	౫౦౦	౧

వినియోగ విధానం:
పురుగుల దెబబ్ మొదటగా కనిపించినపుప్డు కీటకనాశిని పిచికారీ చేయాలి మరియు అవసరమైతే మళీల్ పిచికారీ చేయాలి. కీటకనాశిని సరిపడా నీటిలో కలిపి పంట ఆకులపై సమానంగా పిచికారీ చేయాలి, తదావ్రా మొతత్ం ఆకు తడవాలి.

జాగర్తతల్లు:
౧) పిచికారీ దార్వణం తయారుచేయడానికి వంటగది పాతర్లను ఉపయోగించవదుద్. దార్వణం కలపడానికి కరర్ను ఉపయోగించాలి. చరమ్ం, కళళ్ మరియు దుసుత్లతో సంపరక్ం జరగకుండా చూడాలి. పొగ మరియు ఆవిరిని పీలచ్డం నివారించండి. ౨) చరమ్ం తగలకుండా ఉండేందుకు చేతి దసాత్నాలు ధరించాలి. ౩) ఉతప్తిత్ని చేతబటేట్టపుప్డు రకష్ణ దుసుత్లు, మాసక్, కళళ్జోడు మరియు బూటుల్ ధరించాలి. ఉతప్తిత్ని చేతబటేట్టపుప్డు లేదా పిచికారీ చేసుత్నన్పుప్డు తినకూడదు, తాగకూడదు, పొగ తార్గకూడదు.
౪) పని ముగిసిన తరావ్త చేతులను సబుబ్ మరియు ఎకుక్వ నీటితో కడిగి దుసుత్లు మారాచ్లి. మురికిగా ఉనన్ దుసుత్లను కూడా శుభర్పరచాలి. ౫) గాలి మరియు నీటి వనరులు కీటకనాశకాల వలన కాలుషాయ్నికి గురికాకుండా జాగర్తత్ వహించాలి.

విష పర్భావ లకష్ణాలు:
విష పర్భావం పార్రంభ లకష్ణాలలో కళళ్ బలల్ల విసత్రణ, కండరాల అసమతులయ్త, నడకలో అసిత్రతవ్ం మరియు కండరాల కంపనం ఉండవచుచ్.

పర్థమ చికితస్:
౧) బాధితుడిని పర్మాదకర పర్దేశం నుండి గాలి సరిగా వచేచ్ పర్దేశానికి లేదా బహిరంగ గాలికి తీసుకెళిల్ చలినుంచి రకిష్ంచాలి. కలుషితమైన దుసుత్లను తీసివేసి బాధిత భాగానిన్ సబుబ్ మరియు నీటితో బాగా కడగాలి. ౨) కళళ్ను కొనిన్ నిమిషాలు శుభర్మైన నీటితో కడగాలి. ౩) వయ్కిత్ విష పదారాథ్నిన్ మింగి ఉంటే మరియు అతను మింగగలిగితే ఒకటి లేదా రెండు గాల్సుల నీరు ఇవావ్లి. వాంతి చేయించకండి. వెంటనే వైదుయ్డిని సంపర్దించండి.

గమనిక:
వాంతి చేయించకండి మరియు అపసామ్రక సిథ్తిలో ఉనన్ వయ్కిత్కి నోటిదావ్రా ఏదీ ఇవవ్కండి.

విష నివారణ మందు:
పర్తేయ్కమైన నివారణ మందు లేదు. లకష్ణాలను బటిట్ చికితస్ చేయాలి.

జాగర్తత్:
పై పేరొక్నన్ పంటల కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకండి.

నిలవ్:
౧) కీటకనాశక పాయ్కెటల్ను వాటి అసలు కంటైనర్లలోనే ఉంచి ఇతర వసుత్వులు, ముఖయ్ంగా ఆహార పదారాథ్లు ఉనన్ గదుల నుండి వేరు చేసి లేదా తాళం వేసిన అలామ్రీలో భదర్పరచాలి. ౨) కీటకనాశక నిలవ్ గది బలంగా, గాలి సరిగా వచేచ్లా, వెలుతురు ఉనన్టుల్ మరియు సరైన పరిమాణంలో ఉండాలి, ఆవిరి వలల్ కలుషయ్ం కాకుండా జాగర్తత్ వహించాలి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ల నిరావ్హణ:
౧) పాయ్కెటుల్, మిగిలిన పదారాథ్లు లేదా యంతార్లు, కంటైనర్లు మొదలైన వాటి నుండి వచిచ్న నీటిని పరాయ్వరణం లేదా నీటి కాలుషయ్ం జరగకుండా సురకిష్తంగా పారవేయాలి. ౨) వాడిన పాయ్కెటల్ను బయట వదిలేయకండి, తదావ్రా వాటిని మళీల్ వాడే అవకాశం ఉండదు. ౩) పాయ్కెటల్ను పగులగొటిట్ జనావాస పార్ంతాల నుండి దూరంగా నేలలో పాతిపెటాట్లి.

జాగర్తత్ :
ఈ లేబుల్ / పుసిత్కలో పేరొక్నన్ పంటల కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకండి.

எமாமெக்டின் பென்சோயேட் ௫% எஸ்.ஜி.
(பூச்சிக்கொல்லி)

இமாமெக்டின் பென்சோயேட் ௫% எஸ்.ஜி. என்பது நீரில் கரையக்கூடிய துகள்முறையிலான வடிவமைப்பாகும், இதில் ௫% செயலில் உள்ள மூலப்பொருள் உள்ளது. இது பருத்தியில் பால் புழுக்கள், வெண்டையில் பழம் மற்றும் தண்டு துளைக்கும் பூச்சி, முட்டைகோசில் டி.பி.எம்., மிளகாயில் பழம் துளைக்கும் பூச்சி, த்ரிப்ஸ், மைட்ஸ், கத்தரிக்காயில் பழம் மற்றும் தண்டு துளைக்கும் பூச்சி, துவரத்தில் பாக் போரர், கொண்டைக்கடலை பாக் போரர், திராட்சையில் த்ரிப்ஸ் மற்றும் தேயிலையில் டீ லூப்பர் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது வயிற்றின் செயல்முறையால் செயல்படும் ஒரு பூச்சிக்கொல்லியாகும், இது சிறப்பாக செயல்பட லார்வா அதை விழுங்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட லார்வா உறைந்து, இமாமெக்டின் பென்சோயேட் ௫% எஸ்.ஜி.யுடன் தொடர்பு கொண்ட சில நேரத்தில் உணவுண்ணுவதை நிறுத்தி, பின்னர் ௨-௪ நாட்களில் இறக்கின்றன.

பரிந்துரை :

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப்பெயர்	ஹெக்டேருக்கு அளவு		நீரில் கலக்கும் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பும் அறுவடைக்கும் இடையிலான காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)
		செயலில் உள்ள மூலப் பொருள் (கிராம்)	வடிவமைப்பு (கிராம்)		
கத்தரிக்காய்	பழம் மற்றும் தண்டு துளைக்கும் பூச்சி	௰	௨௦௦	௫௦௦	௩
முட்டைகோஸ்	வைர பின்புறச் சிலந்தி (டைமண்ட் பேக் மொத்)	௭.௫-௰	௧௫௦-௨௦௦	௫௦௦	௩
கொண்டைக் கடலை	பாக் போரர்	௧௧	௨௨௦	௫௦௦	௧௪
மிளகாய்	பழம் துளைக்கும் பூச்சி, த்ரிப்ஸ், மைட்ஸ்	௰	௨௦௦	௫௦௦	௩
பருத்தி	பால் வார்ம்ஸ்	௯.௫-௧௧.௦	௧௯௦-௨௨௦	௫௦௦	௰
திராட்சை	த்ரிப்ஸ்	௧௧	௨௨௦	௫௦௦-௧௦௦௦	௫
வெண்டை	பழம் மற்றும் தண்டு துளைக்கும் பூச்சி	௬.௭௫-௮.௫	௧௩௫-௧௭௦	௫௦௦	௫
துவரம் பருப்பு	பாக் போரர்	௧௧	௨௨௦	௫௦௦-௭௫௦	௧௪
தேயிலை	டீ லூப்பர்	௰	௨௦௦	௫௦௦	௧

பயன்படுத்தும் வழிமுறை:
புழுக்கள் முதன்முதலில் தென்பட்டவுடன் பூச்சிக்கொல்லியை தெளிக்கவும் மற்றும் தேவையானபோது மீண்டும் தெளிக்கவும். பூச்சிக்கொல்லியை போதுமான அளவு தண்ணீரில் கலந்து பயிரின் இலைகளில் சமமாக தெளிக்கவும், இதனால் முழு இலை நனையும்.

எச்சரிக்கைகள்:
௧) தெளிப்பு திரவத்தை தயாரிக்க சமையலறை பாத்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம். கலவையை கலக்க குச்சியை பயன்படுத்தவும். தோல், கண்கள் மற்றும் உடையுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல் இருக்கவும். புகை மற்றும் ஆவியை சுவாசிப்பதை தவிர்க்கவும். ௨) தோலுடன் தொடர்பு ஏற்படாமல் இருக்க கையுறைகள் அணியவும். ௩) தயாரிப்பை கையாளும் போது பாதுகாப்பு ஆடை, முக கவசம், கண்ணாடி மற்றும் காலணி அணியவும். தயாரிப்பை கையாளும் அல்லது தெளிக்கும் போது உணவு உண்ணாதீர்கள், பானம் அருந்தாதீர்கள், புகை பிடிக்காதீர்கள். ௪) வேலை முடிந்ததும் சோப்பும் போதுமான நீரும் கொண்டு கைகளை கழுவி உடையை மாற்றவும். அழுக்கான உடைகளை நன்றாக சுத்தம் செய்யவும். ௫) காற்று மற்றும் நீர்நிலைகள் பூச்சிக்கொல்லிகளால் மாசுபடாமல் பாதுகாக்கவும்.

நஞ்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள்:
ஆரம்ப அறிகுறிகளில் கண் மண் விரிவடைதல், தசை சமநிலையின்மை, நடை தடுமாற்றம் மற்றும் தசைகளில் நடுக்கம் ஆகியவை இருக்கலாம்.

முதலுதவி:
௧) பாதிக்கப்பட்டவரை அபாயப்பகுதியிலிருந்து காற்றோட்டம் உள்ள இடத்திற்கு அல்லது திறந்தவெளிக்கு மாற்றி குளிரிலிருந்து பாதுகாக்கவும். பாதிக்கப்பட்ட உடைகளை அகற்றி பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சோப்பு மற்றும் நீரால் நன்றாக கழுவவும். ௨) கண்களை சில நிமிடங்கள் சுத்தமான நீரால் கழுவவும். ௩) நபர் நஞ்சை விழுங்கியிருந்தால், மற்றும் விழுங்கும் நிலைமையில் இருந்தால், ஒரு அல்லது இரண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க கொடுக்கவும். வாந்தி எடுக்கச் செய்ய வேண்டாம். உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.

குறிப்பு:
வாந்தி எடுக்கச் செய்ய வேண்டாம், மயக்க நிலையில் உள்ள நபருக்கு வாய்வழியாக எதையும் கொடுக்க வேண்டாம்.

பிரத்தியேக எதிர்நஞ்சு:
எதுவும் இல்லை. அறிகுறிகளின்படி சிகிச்சை அளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை:
மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர மற்ற எந்த பயிரிலும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

சேமிப்பு:
௧) பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொட்டலங்களை அசல் கொள்கலனில் தனி அறையிலோ இடத்திலோ வைக்கவும், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்படும் இடத்திலிருந்து தனியாக அல்லது பூட்டிய அலமாரியில் பாதுகாப்பாக வைக்கவும். ௨) பூச்சிக்கொல்லி சேமிக்கும் அறை நன்கு கட்டப்பட்டதும், காற்றோட்டம் உள்ளதும், வெளிச்சம் போதுமானதுமானதும், ஆவியால் மாசுபடாத வகையில் இருக்க வேண்டும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலன்களின் அகற்றம்:
௧) பாக்கெட்டுகள், மீதமுள்ள பொருட்கள் அல்லது இயந்திரங்கள், கொள்கலன்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் கழிவுநீரை சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாடு ஏற்படாதவாறு நீக்கவும். ௨) பயன்படுத்திய பாக்கெட்டுகளை வெளியில் விடாதீர்கள், மீண்டும் பயன்படுத்தப்படாமல் தடுக்கவும். ௩) பாக்கெட்டுகளை உடைத்து மக்கள் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து தூரத்தில் மண்ணில் புதைக்கவும்.

எச்சரிக்கை :
இந்த லேபிள் / புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர மற்ற எந்த பயிரிலும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

ಎಮಾಮೆಕಿಟ್ನ್ ಬೆನೊಜ್ಯೇಟ್ ೫% ಎಸ್.ಜಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇಮಾಮೆಕಿಟ್ನ್ ಬೆನೊಜ್ಯೇಟ್ ೫% ಎಸ್.ಜಿ. ಎಂಬುದು ನೀರಿನಲಿಲ್ ಕರಗುವ ಕಣದ ಆಧಾರಿತ ತಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲಿಲ್ ೫% ಸಕಿರ್ಯ ಘಟಕವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನುನ್ ಹತಿತ್ಯಲಿಲ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್ಗಳು, ಬೆಂಡೆಯಲಿಲ್ ಹಣುಣ್ ಮತುತ್ ತೊಡೆ ತಿವಿಯುವ ಹುಳುಗಳು, ಎಲೆಕೋಸಿನಲಿಲ್ ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ., ಮೆಣಸಿನಲಿಲ್ ಹಣುಣ್ ತಿವಿಯುವ ಹುಳುಗಳು, ತಿರ್ಪಸ್, ಮೈಟಸ್, ಬದನೇಕಾಯಿಯಲಿಲ್ ಹಣುಣ್ ಮತುತ್ ತೊಡೆ ತಿವಿಯುವ ಹುಳುಗಳು, ತೊಗರಿಯಲಿಲ್ ಪೊಡ್ ಬೋರರ್, ಕಡಲೆಯಲಿಲ್ ಪೊಡ್ ಬೋರರ್, ದಾರ್ಕಿಷ್ಯಲಿಲ್ ತಿರ್ಪಸ್ ಮತುತ್ ಚಹಾದಲಿಲ್ ಟೀ ಲೂಪರ್ ನಿಯಂತರ್ಣಕೆಕ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಟೆಟ್ಯ ಕಿರ್ಯೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದುದ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಲಾರ್ವಾಗಳು ಅದನುನ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇಮಾಮೆಕಿಟ್ನ್ ಬೆನೊಜ್ಯೇಟ್ ೫% ಎಸ್.ಜಿ.ಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದ ಬಳಿಕ ಪರ್ಭಾವಿತ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಸಥ್ಂಭನಗೊಂಡು, ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲಿಲ್ ತಿನುನ್ವುದನುನ್ ನಿಲಿಲ್ಸುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ನಂತರ ೨-೪ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಯುತತ್ವೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ)		
ಬದನೇಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೀಟ	೧೦	೨೦೦	೫೦೦	೩
ಎಲೆಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಥ್	೭.೫-೧೦	೧೫೦-೨೦೦	೫೦೦	೩
ಕಡಲೆ	ಪೊಡ್ ಬೋರರ್	೧೧	೨೨೦	೫೦೦	೧೪
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ಬೋರರ್, ತ್ರಿಪ್ಸ್, ಮೈಟ್ಸ್	೧೦	೨೦೦	೫೦೦	೩
ಹತ್ತಿ	ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್	೯.೫-೧೧.೦	೧೯೦-೨೨೦	೫೦೦	೧೦
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ತ್ರಿಪ್ಸ್	೧೧	೨೨೦	೫೦೦-೧೦೦೦	೫
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೀಟ	೬.೭೫-೮.೫	೧೩೫-೧೭೦	೫೦೦	೫
ತೊಗರಿ	ಪೊಡ್ ಬೋರರ್	೧೧	೨೨೦	೫೦೦-೭೫೦	೧೪
ಚಹಾ	ಟೀ ಲೂಪರ್	೧೦	೨೦೦	೫೦೦	೧

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ:
ಹುಳಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಕೀಟನಾಶಕವನುನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ವಿದದ್ರೆ ಪುನಃ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕವನುನ್ ತಕಕ್ ಪರ್ಮಾಣದ ನೀರಿನಲಿಲ್ ಕಲಸಿ ಬೆಳೆಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಎಲಲ್ ಎಲೆಗಳೂ ಚೆನಾನ್ಗಿ ತೇವವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿಳ್.

ಜಾಗರ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳು:
೧) ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ದಾರ್ವಣವನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತೆರ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಿಶರ್ಣವನುನ್ ಕಲಿಸಲು ಕಡಿಡ್ಯನುನ್ ಬಳಸಿ. ಚರ್ಮ, ಕಣುಣ್ ಮತುತ್ ಬಟೆಟ್ಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಿ. ಧೂಮ ಅಥವಾ ವಾಯುಗಳನುನ್ ಉಸಿರಾಟಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಡಿ. ೨) ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ. ೩) ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲಿಲ್ ಬಳಸುವಾಗ ರಕಷ್ಣೆ ಉಡುಪು, ಮಾಸಕ್, ಕಣಿಣ್ನ ಕನನ್ಡಿ ಮತುತ್ ಬೂಟು ಧರಿಸಿ. ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನನ್ಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ೪) ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನುನ್ ಸಾಬೂನು ಮತುತ್ ಸಾಕಷುಟ್ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಟೆಟ್ ಬದಲಿಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟೆಟ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಚೆನಾನ್ಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ೫) ಗಾಳಿ ಮತುತ್ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ರಕಿಷ್ಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕಷ್ಣಗಳು:
ಪಾರ್ರಂಭಿಕ ಲಕಷ್ಣಗಳಲಿಲ್ ಕಣುಣ್ಗಳ ಮಣಿಗಳ ವಿಸತ್ರಣೆ, ಸಾನ್ಯುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ನಡೆಯುವಲಿಲ್ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಮತುತ್ ಸಾನ್ಯುಗಳಲಿಲ್ ನಡುಕ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲ ಚಿಕಿತಾಸ್ ಕರ್ಮ:
೧) ಪೀಡಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಯನುನ್ ಅಪಾಯದ ಪರ್ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದೊಯುದ್ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಸಥ್ಳ ಅಥವಾ ಮುಕತ್ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ್ ಇರಿಸಿ ಮತುತ್ ಚಳಿಯಿಂದ ರಕಿಷ್ಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟೆಟ್ಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪೀಡಿತ ಭಾಗವನುನ್ ಸಾಬೂನು ಮತುತ್ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನಾನ್ಗಿ ತೊಳೆದುಹಾಕಿ. ೨) ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದಧ್ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ೩) ಪೀಡಿತ ವಯ್ಕಿತ್ ವಿಷವನುನ್ ನುಂಗಿದದ್ರೆ ಮತುತ್ ನುಂಗುವ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ದದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಾಲ್ಸ್ ನೀರನುನ್ ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ತಕಷ್ಣ ವೈದಯ್ರನುನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸೂಚನೆ:
ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ ಮತುತ್ ಬುದಿಧ್ಹೀನನಾದ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಏನನೂನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ.

ಪರ್ತಿವಿಷ:
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪರ್ತಿವಿಷ ಇಲಲ್. ಲಕಷ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತೆಸ್ ನೀಡಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ:
ಮೇಲಿನ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ರುವ ಬೆಳೆಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಸಂಗರ್ಹಣೆ:
೧) ಕೀಟನಾಶಕ ಪಾಯ್ಕೆಟ್ಗಳನುನ್ ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ಯಲಿಲ್ ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿಯಲಿಲ್ ಅಥವಾ ಸಥ್ಳದಲಿಲ್ ಇಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಸುತ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇರಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನುನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಲಮಾರಿಯಲಿಲ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿ ಇಡಿ. ೨) ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿ ಬಲವಾದ, ಗಾಳಿಯುಳಳ್, ಬೆಳಕಿನುಳಳ್ ಮತುತ್ ಸಮರ್ಪಕ ಗಾತರ್ದವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ವಾಯುಮಾಲಿನಯ್ ತಪಪ್ಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಪಾಯ್ಕೆಟ್ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:
೧) ಪಾಯ್ಕೆಟ್ಗಳು, ಉಳಿದಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಯಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪಾತೆರ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ ನೀರನುನ್ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. ೨) ಬಳಸಿದ ಪಾಯ್ಕೆಟ್ಗಳನುನ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನುನ್ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಿ. ೩) ಪಾಯ್ಕೆಟ್ಗಳನುನ್ ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗಳಿಂದ ದೂರದ ಭೂಮಿಯಲಿಲ್ ಹೂಳಿರಿ.

ಎಚಚ್ರಿಕೆ :
ಈ ಲೇಬಲ್ / ಲೀಫೆಲ್ಟ್ನಲಿಲ್ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ ੫% ਐਸ.ਜੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ ੫% ਐਸ.ਜੀ. ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ੫% ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਬਾਲਵਰਮ, ਭਿੰਡੀ 'ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀ ਛੇਦਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ 'ਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ., ਮਿਰਚ 'ਤੇ ਫਲ ਛੇਦਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ, ਥਿਰ੍ਪਸ, ਮਾਈਟਸ, ਬੈਂਗਨ 'ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀ ਛੇਦਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ, ਅਰਹਰ 'ਤੇ ਫਲੀ ਬੋਰਰ, ਚਣਾ 'ਤੇ ਪੋਡ ਬੋਰਰ, ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਤੇ ਥਿਰ੍ਪਸ ਅਤੇ ਚਾਹ 'ਤੇ ਟੀ ਲੂਪਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੀੜੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਰਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਭਾਵਿਤ ਲਾਰਵਾ ਅਸਹਾਇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ ੫% ਐਸ.ਜੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੨-੪ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ :

ਫਸਲ	ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮ)		
ਬੈਂਗਣ	ਫਲ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀ ਬੋਰਰ	੧੦	੨੦੦	੫੦੦	੩
ਬੰਦੀ ਗੋਭੀ	ਡਾਇਮੰਡ ਬੈਕ ਮੌਥ	੭.੫-੧੦	੧੫੦-੨੦੦	੫੦੦	੩
ਚਣਾ	ਫਲੀ ਬੋਰਰ	੧੧	੨੨੦	੫੦੦	੧੪
ਮਿਰਚ	ਫਲ ਬੋਰਰ, ਥ੍ਰਿਪਸ, ਮਾਈਟਸ	੧੦	੨੦੦	੫੦੦	੩
ਕਪਾਹ	ਬੋਲ ਵਰਮ	੯.੫-੧੧.੦	੧੯੦-੨੨੦	੫੦੦	੧੦
ਅੰਗੂਰ	ਥ੍ਰਿਪਸ	੧੧	੨੨੦	੫੦੦-੧੦੦੦	੫
ਭਿੰਡੀ	ਫਲ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀ ਬੋਰਰ	੬.੭੫-੮.੫	੧੩੫-੧੭੦	੫੦੦	੫
ਅਰਹਰ	ਫਲੀ ਬੋਰਰ	੧੧	੨੨੦	੫੦੦-੭੫੦	੧੪
ਚਾਹ	ਟੀ ਲੂਪਰ	੧੦	੨੦੦	੫੦੦	੧

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ:
ਜਦੋਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਣ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
੧) ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਛੜੀ ਵਰਤੋ। ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਬਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਓ। ੨) ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ। ੩) ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਪੜੇ, ਮਾਸਕ, ਐਨਕ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨੋ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜਾਂ ਛਿੜਕਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ੪) ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚੂਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ। ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਵੋ। ੫) ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ, ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਥਰਥਰਾਹਟ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ:
੧) ਪਰ੍ਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁੱਲਹ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਓ ਅਤੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ੨) ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ੩) ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨੋਟ:
ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ।

ਤਰਿਆਕ:
ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰਿਆਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਸਟੋਰੇਜ:
੧) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਜਗਹ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਲੇ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ।੨) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹਵਾਦਾਰ, ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਵੜੀ:
੧) ਪੈਕਟਾਂ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵਾੜੋ। ੨) ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ੩) ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੋ।

ਚੇਤਾਵਨੀ :
ਇਸ ਲੇਬਲ / ਲੀਫ਼ਲੈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

এমামেকটিন বেঞ্জোয়েট ৫% এস.জি.
(কীটনাশক)

ইমামেকটিন বেনজোয়েট ৫% এস.জি. একটি পানিতে দর্বণীয় দানাদার ফমুর্লেশন, যাতে ৫% সকির্য় উপাদান থাকে। এটি তুলায় বলওয়ামর্, ঢেঁড়সের ফল ও কাণ্ড ছিদর্কারী পোকা, বাঁধাকপিতে ডি.বি.এম., মরিচে ফল ছিদর্কারী পোকা, থির্পস, মাইটস, বেগুনে ফল ও কাণ্ড ছিদর্কারী পোকা, আরহরে পড বোরার, ছোলায় পড বোরার, আঙুরে থির্পস এবং চায়ে টি লুপার নিয়ন্তর্ণের জনয্ সুপারিশ করা হয়। এটি একটি পাকস্থলীর কির্য়ার মাধয্মে কাজ করা কীটনাশক, যা সবচেয়ে কাযর্কর হতে হলে লাভর্া দব্ারা খাওয়া পর্য়োজন। আকর্ান্ত লাভর্া পক্ষাঘাতগর্স্ত হয়ে যায় এবং ইমামেকটিন বেনজোয়েট ৫% এস.জি.-এর সংস্পশের্ আসার কিছুক্ষণের মধেয্ই খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পরবতর্ীতে ২-৪ দিনের মধেয্ মারা যায়।

সুপারিশ :

ফসল	পোকামাকড়ের সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টরে প্রয়োগের পরিমাণ		পানিতে মেশানোর পরিমাণ (লিটার)	শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মধ্যে অপেক্ষার সময় (দিনে)
		সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (গ্রাম)		
বেগুন	ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা	১০	২০০	৫০০	৩
বাঁধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাক মথ	৭.৫-১০	১৫০-২০০	৫০০	৩
ছোলা	ফলি ছিদ্রকারী পোকা	১১	২২০	৫০০	১৪
মরিচ	ফল ছিদ্রকারী পোকা, থ্রিপস, মাইটস	১০	২০০	৫০০	৩
তুলা	বলওয়ার্মস	৯.৫-১১.০	১৯০-২২০	৫০০	১০
আঙুর	থ্রিপস	১১	২২০	৫০০-১০০০	৫
ঢেঁড়স	ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা	৬.৭৫-৮.৫	১৩৫-১৭০	৫০০	৫
অড়হর	ফলি ছিদ্রকারী পোকা	১১	২২০	৫০০-৭৫০	১৪
চা	টি লুপার	১০	২০০	৫০০	১

বয্বহারের নিদের্শ:
যখন শুঁয়োপোকার আকর্মণ পর্থম দেখা যায় তখনই কীটনাশক পর্য়োগ করুন এবং পর্য়োজনে পুনরায় পর্য়োগ করুন। কীটনাশককে পযর্াপ্ত পরিমাণে পানির সঙ্গে মিশিয়ে ফসলের পাতায় সমানভাবে স্পের্ করুন যাতে সমস্ত পাতা ভিজে যায়।

সতকর্তামূলক বয্বস্থা:
১) স্পের্ দর্বণ তৈরি করতে রান্নার বাসন বয্বহার করবেন না। দর্বণ মেশানোর জনয্ কাঠির বয্বহার করুন। তব্ক, চোখ এবং পোশাকের সঙ্গে সংস্পশর্ এড়িয়ে চলুন। ধোঁয়া ও বাষ্প শব্াসের মাধয্মে গর্হণ করবেন না। ২) তব্কের সংস্পশর্ থেকে বাঁচতে দস্তানা পরুন। ৩) পণয্ বয্বহারের সময় সুরক্ষামূলক পোশাক, মাস্ক, চশমা ও জুতা পরুন। পণয্ বয্বহার বা স্পের্ করার সময় খাওয়া, পান করা বা ধূমপান করবেন না। ৪) কাজ শেষ হওয়ার পর সাবান ও পযর্াপ্ত জল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন এবং পোশাক পরিবতর্ন করুন। নোংরা পোশাকও ধুয়ে ফেলুন। ৫) বাতাস ও জলাশয়কে কীটনাশকের দব্ারা দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

বিষকির্য়ার লক্ষণ:
পর্াথমিক লক্ষণগুলির মধেয্ চোখের মণি বড় হয়ে যাওয়া, পেশির ভারসাময্হীনতা, হাঁটার সময় টলমল করা এবং পেশিতে কাঁপুনি অন্তভুর্ক্ত থাকতে পারে।

পর্াথমিক চিকিৎসা:
১) আকর্ান্ত বয্ক্তিকে বিপজ্জনক স্থান থেকে সরিয়ে বায়ু চলাচলকারী স্থানে বা খোলা জায়গায় নিয়ে যান এবং ঠান্ডা থেকে সুরক্ষা দিন। দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন এবং আকর্ান্ত অংশটি সাবান ও জলে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। ২) চোখ কয়েক মিনিট ধরে পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলুন। ৩) যদি আকর্ান্ত বয্ক্তি বিষ গিলে ফেলেন এবং গিলতে সক্ষম হন, তবে তাকে এক বা দুই গ্লাস পানি পান করান। বমি করাবেন না। অবিলমেব্ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দর্ষ্টবয্:
বমি করাবেন না এবং অচেতন বয্ক্তিকে মুখে কিছু দেবেন না।

পর্তিকার:
কোনো নিদির্ষ্ট পর্তিকার নেই। উপসগর্ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

সতকর্তা:
উপরে উল্লিখিত ফসল বয্তীত অনয্ কোনো ফসলে বয্বহার করবেন না।

সংরক্ষণ:
১) কীটনাশকযুক্ত পয্াকেটগুলি মূল কন্টেইনারে আলাদা কক্ষ বা স্থানে রাখুন, বিশেষ করে যেখানে অনয্ানয্ জিনিস, বিশেষত খাবার, রাখা হয় না অথবা তালাবদ্ধ আলমারিতে সংরক্ষণ করুন। ২) কীটনাশক সংরক্ষণের ঘরটি মজবুত, বায়ু চলাচলকারী, আলোপূণর্ এবং যথাযথ আকারের হতে হবে যাতে ধোঁয়া বা বাষ্পের কারণে দূষণ না হয়।

বয্বহৃত পয্াকেটের নিষ্পত্তি:
১) পয্াকেট, অবশিষ্ট কীটনাশক বা যন্তর্পাতি ও পাতর্ ধোয়া জলের বজর্য্ পরিবেশ বা জল দূষিত না করে ফেলে দিন। ২) বয্বহৃত পয্াকেট বাইরে ফেলে রাখবেন না যাতে পুনরায় বয্বহার করা না যায়। ৩) পয্াকেটগুলো ভেঙে বসতিপূণর্ এলাকা থেকে দূরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন।

সতকর্তা :
এই লেবেল / লিফলেটে উল্লিখিত ফসল বয্তীত অনয্ কোনো ফসলে বয্বহার করবেন না।