AgroStar®

AGRONEB

Propineb 70% WP

(Contact Fungicide)

एग्रोनेब

प्रॉपिनेब 70 प्रतिशत घुलनशील पाउडर

(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

For Agricultural Use Only

केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS

READ THE LEAFLET BEFORE USE

सूचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by

ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED

Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Propineb 70% WP
(Contact Fungicide)

Propineb 70% WP is a contact fungicide based on Propineb Technical containing 70% w/w Propineb as active ingredient and balance auxillaries as insert material. Propineb is used as a foliar spray for the control of fungal diseases in different crops. Caution : - Proudct is very toxic to aquatic invertebrates and thus product containing the molecules may be avoided near aquaculture. * Caution Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Disease	Dosage/HA			Waiting Period between last spray to harvest	Re-entry after each Application (in Hours)
		AI (gm or %)	Formulation (gm or %)	Dilution in Water (Ltr.)		
Apple	Scab	0.21% or 2100 gram/100 Lt. water	0.30% or 300gram/100 Lt. water	As required*	30	-
Chilli	Dieback	210 gram/100 lt. water	300 gram/100 lt. water	depending upon size of the tree and equipment used	30	-
		0.35% or 350 gram/100 Lt. water	0.50% or 500gram/100 Lt. water	As required*	10	-
		350 gram/100 lt. water	500 gram/100 lt. water	depending upon size of the tree and equipment used	10	-
Cotton	Alternaria leaf spot	875-1050	1250-1500	500 liter/hectare	27	-
Grapes	Downy Mildew	0.21% or 2100 gram/100 Lt. water	0.30% or 300gram/100 Lt. water	As required*	40	-
		210 gram/100 lt. water	300 gram/100 lt. water	depending upon size of the tree and equipment used	40	-
Pomegranate	Leaf and fruit spots	0.21% or 2100 gram/100 Lt. water	0.30% or 300gram/100 Lt. water	As required*	10	-
		210 gram/100 lt. water	300 gram/100 lt. water	depending upon size of the tree and equipment used	10	-
Potato	Early & late blight	0.21% or 2100 gram/100 Lt. water	0.30% or 300gram/100 Lt. water	As required*	15	-
		210 gram/100 lt. water	300 gram/100 lt. water	depending upon crop stage and plant protection equipment used	15	-
Rice	Brown leaf spot (Helminthosporium oryzae) Narrow leaf spot (Cercospora oryzae)	1050-1400	500 ltrs./ha.	1500-2000	-	-
	Brown leaf spot (Helminthosporium oryzae) Narrow leaf spot (Cercospora oryzae)	1050-1400	1500-2000	500 Ltr/ha	-	-
Tomato	Buck eye rot	0.21 % or 210 gram/100 lt. water	-do-	0.30 % or 300 gram/100 lt. water	10	-
	Buck eye rot	0.21 % or 210 gram/100 lt. water		0.30 % or 300 gram/100 lt. water	As required*	10	-

Direction Of Use

Propineb 70 WP whould be applied as protectant fungicide with Knapsack,sprayer. *Dilution in water as required depending upon size of the tree and plant protection equipment.

Time of Application: Refer to CIB Guidelines

Precautions

keep away from food stuff, empty food stuff containers and animal feed. Do not eat, drink or somke during application. Avoid contact with eyes and skin. Avoid inhalation of the spray mist. Wear protective clothing like long slieeved shirt, long pents, hand, gloves shoes and goggles while handling. Thoroughly wash contaminated clothes parts of body.

Symptoms Of Poisoning

Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrohea, if swallowed. When inhaled as fine dust, irritation to bronchial tube and lungs tissues, Sedation, reduction in general well being, salivation, anorexia, dysponea, muscle weakness.

First Aid

Induce vomiting by administering a spoonful common salt in a glass of water or insert finger into the throat. Continue till vomit fluid is clear. Call physician.

Phytotoxicity: Refer to CIB Guidelines

Antidote

No specific antidote is known. treat symptomatically.

Disposal Of Used Container

Empty containers should be broken and buried away from habitation. To prevent re-use, empty containers should not be left outside. Package or surplus materail and washings should be dispose off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions

1. Packages containng the product should be stored in separate, rooms or premises, away from the rooms or premises used fro storing other article or should be kept in separate alimirahs under and key. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, well lit, dry, well ventated and of sufficient dimension to avoid contamination with water and vapour.

Chemical Composition

S No.	Ingredient	Description	Weight
1	Propineb Tech.		87.50 % w/w
2	Precipitated Silica		8.75 % w/w
3	Kaolin		QS % w/w
		Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

English

प्रॉपिनेब 70 प्रतिशत घुलनशील पाउडर
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

प्रॉपिनेब 70 डब्ल्यू.पी. ये एक स्पर्शीय फफूंदनाशक है जिसके 70 प्रतिशत भार/भार प्रॉपिनेब नामक सक्रिय तत्व है। बाकी निष्क्रिय और सहयोगी पदार्थ हैं। इसका प्रयोग विभिन्न फसलों में फफूंद जन्य व्याधियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। सावधान : - यह उत्पाद जलजीवोंके लिये जीवों के लिए अति विषाक्त है। इस प्रकार के अणुओं वाले उत्पाद को जलीय कृषि में और इसके आसपास उपयोग नहीं करना चाहिए। सावधान : जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

उपयोग

फसल	कीट/रोग का सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़कावऔर फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (प्रतिशत या ग्राम)	संरचना (प्रतिशत या ग्राम)			
सेब	पपड़ी	0.21 प्रतिशत अथवा 210 ग्राम/100 लीटर पानी	0.30 प्रतिशत अथवा 300 ग्रा/100 लीटर पानी	आवश्यकता अनुसार*	30	-
मिर्च	डाइबैक	0.35 प्रतिशत अथवा 350 ग्राम/100 लीटर पानी	0.50% अथवा 500 ग्रा/100 लीटर पानी	आवश्यकता अनुसार*	10	-
कपास	अल्टरनारिया पत्ते धब्बा	875 से 1050	1250 से 1500	500 लीटर/हेक्टेयर	27	-
अंगूर	मृदुरोमिल असिता	0.21 प्रतिशत अथवा 210 ग्राम/100 लीटर पानी	0.30 प्रतिशत अथवा 300 ग्रा/100 लीटर पानी	आवश्यकता अनुसार*	40	-
अनार	पत्तियों एंव फलों के धब्बे	0.21 प्रतिशत अथवा 210 ग्राम/100 लीटर पानी	0.30 प्रतिशत अथवा 300 ग्रा/100 लीटर पानी	आवश्यकता अनुसार*	10	-
आलू	अगली एंव पछेती अंगमारी	0.21 प्रतिशत अथवा 210 ग्राम/100 लीटर पानी	0.30 प्रतिशत अथवा 300 ग्रा/100 लीटर पानी	आवश्यकता अनुसार*	15	-
धान	भूरे पत्तों का रोग तथा पत्रकोचपत्र धब्बों का रोग	1050-1400	1500-2000	500 ली./हे.	-	-
टमाटर	अर्ली ब्लाइटल	0.21 प्रतिशत अथवा 210 ग्राम/100 लीटर	0.30 प्रतिशत अथवा 300 ग्रा/100 लीटर पानी	आवश्यकता अनुसार*	10	-

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

प्रॉपिनेब 70 डब्ल्यू.पी. का प्रयोग रोग की रोकथाम हेतु रोग के प्रथम लक्षण आने पर पीठ पर लादकर हस्त चालित छिड़काव यंत्र द्वारा करना चाहिए।
पानी की मात्रा आवश्यकतानुसार, पेड़ के आकार एवं पौध सुरक्षा यंत्र के अनुसार।

प्रयोग का समय: सीआईबी के दिशानिर्देशों का पालन करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां

फफूंदनाशक को खाद्य पदार्थ के स्थान एवं बच्चों की पहुँच से दूर रखें। प्रयोग करते समय खाद्य पदार्थ का सेवन या धूम्रपान न करें। त्वचा एवं आँखों को फफूंदनाशक के संपर्क में न आने दें। फफूंदनाशक की फुहार को नाक या मुँह में न जाने दें। दूषित कपड़ों एवं त्वचा को साबुन और पानी से धो डालें। प्रॉपिनेब के संपर्क में आने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक लिबास जैसे लम्बी आस्तीन की कमीज, पतलून, दस्ताने, जूते एवं चश्मा पहनना आवश्यक है।

विष के लक्षण

यदि फफूंदनाशक पेट में गई हो तो वमन की लालसा, उदर शूल एवं अतिसार जैसे लक्षण दिखाई देंगे। यदि श्वसन द्वारा फफूंदनाशक अंदर गई हो तो फेफड़ों एवं श्वसन नलिकाओं में जलन हो सकती है। नींद आना, स्वास्थ्य में गिरावट, लार टपकना, भूख न लगना, कष्ट श्वास, कमजोर मांसपेशियाँ।

प्राथमिक चिकित्सा

(1) एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर मिलाएँ या गले में उंगली डालकर वमन कराएँ। यह प्रक्रिया वमन द्रव स्वच्छ निकलने तक करें। चिकित्सक को बुलाएँ।

(2) दूषित चमड़ी को पानी से धोएँ। यदि आँखें प्रभावित हुई हों तो लगभग 15 मिनट तक पानी से धोएँ एवं चिकित्सक की सलाह लें।

पौधविषाक्तता: सीआईबी के दिशानिर्देशों का पालन करें।

विष नाशक

कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा

खाली डिब्बों को तोड़कर बस्ती से दूर किसी स्थान पर गाड़ देना चाहिए। खाली डिब्बों को बाहर का छोड़ें ताकि उनको दुबारा काम में न लिया जा सके। डिब्बों में बचा हुआ माल एवं धुलाई का पानी सुरक्षित तरीके से फेंके ताकि वातावरण व पानी प्रदूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें

(1) फफूंदनाशक को ऐसे कमरे या जगह में रखें जो अन्य वस्तुओं के भण्डारण के कमरे या जगह से दूर हो तथा ताला बंद अलमारी में रखें।
(2) यह कमरा या स्थान जहाँ यह फफूंदनाशक रखना है, ठीक से बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार एवं बड़े आकार का हो ताकि वातावरण प्रदूषित न हो

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	विवरण	वज़न
1	प्रौपिनेब सक्रिय तत्व		87.50 % भार/भार
2	प्रसिपिटेटेड सिलिका		8.75 % भार/भार
3	कोओलिन		पर्याप्त मात्रा % भार/भार
		कुल	100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

प्रॉपिनेब 70 टक्के विद्राव्य पावडर
(स्पर्शीय बुरशीनाशक)

प्रॉपिनेब 70 डब्ल्यू.पी. हे एक स्पर्शीय बुरशीनाशक आहे ज्यामध्ये 70 टक्के भार/भार प्रॉपिनेब लावाचा सक्रिय घटक आहे. उर्वरित निष्क्रिय व सहयोगी पदार्थ आहेत. याचा वापर विविध पिकांमध्ये बुरशीजन्य रोगांच्या प्रतिबंधासाठी केला जातो। सावधान : - हे उत्पादन अक्वेरीलकी जलचर जीवांसाठी अत्यंत विषारी आहे. अशा प्रकारच्या रेणूंयुक्त उत्पादनाचा वापर मत्स्यपालनात व त्याच्या आसपास करू नये। सावधान : जलचर जीवांसाठी विषारी आहे म्हणून जलाशय, मत्स्यपालन क्षेत्राजवळ वापर करू नये

शिफारस

पीक	रोगाचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	सेवनाच्या कालावधी व काढणीच्या अंतर	पुन: प्रवेश कालावधीनंतर हुडपवीन करावयाची (तास)
		क्रीयेत तत्व (टक्के किंवा ग्रॅम)	फॉर्म्युलेशन (टक्के किंवा ग्रॅम)			
डाळिंब	तेलकट डाग	0.21% किंवा 210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	0.30% किंवा 300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	आवश्यकतेनुसार*	30	-
द्राक्षे	केवडा	210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	द्राक्षाच्या आकार आणि फवारणीनुसार	30	-
मिरची	डायबैक	0.35% किंवा 350 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	0.50% अधिक 500 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	आवश्यकतेनुसार*	10	-
कापूस	अल्टरनारिया पानांवरील डाग	875 ते 1050	1250 ते 1500	500 लिटर/हेक्टेयर	27	-
द्राक्षे	डाऊनी मिल्ड्यू	0.21% किंवा 210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	0.30% किंवा 300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	आवश्यकतेनुसार*	40	-
		210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	द्राक्षाच्या आकार आणि फवारणीनुसार	40	-
डाळिंब	पान व फळावरील ठिपके	0.21% किंवा 210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	0.30% किंवा 300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	आवश्यकतेनुसार*	10	-
		210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	आवश्यकतेनुसार*	10	-
बटाटा	अर्ली व लेट ब्लाइट	0.21% किंवा 210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	0.30% किंवा 300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	आवश्यकतेनुसार*	15	-
		210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	पिकाच्या अवस्थेनुसार व फवारणी यंत्राचे तंत्रानुसार	15	-
भात	तपकिरी ठिपके (हेलमिन्थोस्पोरियम ऑरायझी), अरुंद पाने ठिपके (सरकोस्पोरा ऑरायझी)	1050-1400	1500-2000	500 लिटर/हेक्टेयर	-	-
	अरुंद - पान ठिपके	1050-1400	1500-2000	500 लिटर/हेक्टेयर	-	-
टोमॅटो	बकआय रॉट	0.21 टक्के किंवा 210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	-तसेच-	0.30 टक्के किंवा 300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	10	-
	बकआय रॉट	0.21% किंवा 210 ग्रॅम/100 लिटर पाणी		0.30% किंवा 300 ग्रॅम/100 लिटर पाणी	As required*	10	-

वापरासाठी दिशा-निर्देश

प्रॉपिनेब 70 डब्ल्यू.पी. चा वापर रोगाच्या प्रतिबंधात्मक रोगाची प्रथम लक्षणे दिसून आल्यावर पाठीवर वाहून नेण्याच्या हस्तचलित फवारणी यंत्राद्वारे करावा।
पाण्याचे प्रमाण आवश्यकतेनुसार, झाडाच्या आकारानुसार व वनस्पती संरक्षण यंत्रानुसार।

वापरण्याची वेळ : सीआयबीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे।

वापरासाठी दिशा-निर्देश

प्रॉपिनेब 70 डब्ल्यू.पी. चा वापर रोगाच्या प्रतिबंधात्मक रोगाची प्रथम लक्षणे दिसून आल्यावर पाठीवर वाहून नेण्याच्या हस्तचलित फवारणी यंत्राद्वारे करावा।
पाण्याचे प्रमाण आवश्यकतेनुसार, झाडाच्या आकारानुसार व वनस्पती संरक्षण यंत्रानुसार।

वापरण्याची वेळ : सीआयबीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे।

वापरकर्त्यांसाठी सावधगिरी

बुरशीनाशक अन्नपदार्थांच्या ठिकाणापासून व मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवावे। वापरताना अन्नपदार्थांचे सेवन किंवा धूम्रपान करू नये। त्वचा व डोळे बुरशीनाशकाच्या संपर्कात येऊ देऊ नयेत। बुरशीनाशकाची फवारणी नाक किंवा तोंडात जाऊ देऊ नये। दूषित कपडे व त्वचा साबण व पाण्याने धुवावीत। प्रॉपिनेबच्या संपर्कात येणाऱ्या कामगारांनी संरक्षणात्मक पोशाख जसे लांब बाहांचा शर्ट, पँन्ट, हातमोजे, बूट व चष्मा वापरणे आवश्यक आहे।

विषबाधेची लक्षणे

जर बुरशीनाशक पोटात गेले असेल तर उलटीची भावना, पोटदुखी व जुलाब यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात। जर श्वसनाद्वारे बुरशीनाशक आत गेले असेल तर फुफ्फुसे व श्वसन नलिकांमध्ये जळजळ होऊ शकते। झोप येणे, आरोग्य खालावणे, लाळ गळणे, भूक न लागणे, श्वास घेण्यास त्रास, स्नायू कमकुवत होणे।

प्राथमिक उपचार

(1) एका ग्लास पाण्यात एक चमचा मीठ मिसळून द्यावे किंवा घशात बोट घालून उलटी करवावी। उलटीतील द्रव स्वच्छ येईपर्यंत ही प्रक्रिया करावी। डॉक्टरांना बोलवावे।
(2) दूषित त्वचा पाण्याने धुवावी। डोळे प्रभावित झाले असल्यास सुमारे 15 मिनिटे पाण्याने धुवावेत व डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा।

वनस्पती विषाक्तता : सीआयबीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे।

विषनाशक

विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नाही। लक्षणानुसार उपचार करावेत।

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट

रिकामे डबे फोडून वस्तीपासून दूर ठिकाणी पुरून टाकावेत। रिकामे डबे बाहेर टाकू नयेत जेणेकरून त्यांचा पुन्हा वापर होणार नाही। डब्यांमध्ये उरलेले पदार्थ व धुतलेले पाणी सुरक्षित पद्धतीने टाकावे जेणेकरून पर्यावरण व पाणी प्रदूषित होणार नाही।

साठवणुकीच्या अटी

(1) बुरशीनाशक अशा खोलीत किंवा ठिकाणी ठेवावे जे इतर वस्तूंच्या साठवणुकीच्या जागेपासून दूर असेल व कुलूपबंद कपाटात ठेवावे।
(2) ज्या खोलीत किंवा ठिकाणी हे बुरशीनाशक ठेवायचे आहे ते व्यवस्थित बांधलेले, कोरडे, प्रकाशमान, हवेशीर व मोठ्या आकाराचे असावे जेणेकरून पर्यावरण प्रदूषित होणार नाही।

रासायनिक संघटन

अ.क्र.	घटक	वर्णन	वजन
1	प्रोपिनेब सक्रिय घटक		87.50 % वजन/वजन
2	प्रेसिपिटेटेड सिलिका	-	8.75 % वजन/वजन
3	काओलिन	-	पुरेशा प्रमाणात % वजन/वजन
		एकूण	100 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

પ્રોપિનેબ 70 ટકા દ્રાવ્ય પાઉડર
(સ્પર્શીય ફુગનાશક)

પ્રોપિનેબ 70 ડબ્લ્યુપી. એક સ્પર્શીય ફુગનાશક છે જેમાં 70 ટકા ભાર/ભાર પ્રોપિનેબ નામનું સક્રિય તત્વ છે બાકીના નિષ્ક્રિય અને સહાયક પદાર્થો છે. તેનો ઉપયોગ વિવિધ પાકોમાં ફુગજન્ય રોગોના પ્રતિબંધાત્મક માટે કરવામાં આવે છે।
સાવધાન : - આ ઉત્પાદન અકવેરીકી જળચર જીવ માટે અત્યંત ઝેરી છે। આ પ્રકારના અણુ ધરાવતા ઉત્પાદનનો ઉપયોગ જળકૃષિમાં અને તેની આસપાસ ન કરવો જોઇએ।સાવધાન : જળચર જીવો માટે ઝેરી છે તેથી જળાશયો અને જળકૃષિ નજીક તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ।

ભલામણ

પાક	જીવાણુનાશકનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીનું પ્રમાણ (લિટર)	છેલ્લો છંટકાવ અને કાપણી વચ્ચેનો સમયગાળો (દિવસ)	ફરીથી સારવાર માટે પ્રવેશવાનો સમયગાળો (કલાક)
		સક્રિય ઘટક (ટકા કે ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (ટકા અથવા ગ્રામ)			
કેળ	સિગાટોકા પર્ણ ધબ્બા	0.21% અથવા 210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	0.30% અથવા 300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	જરૂર મુજબ	30	-
	સિગાટોકા પર્ણ ધબ્બા	210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	1000 લિટર/હેક્ટર	30	-
મરચી	ડાયબેક	0.35% અથવા 350 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	0.50% અથવા 500 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	જરૂર મુજબ	10	-
		350 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	500 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	1000 લિટર/હેક્ટર	10	-
કપાસ	આલ્ટરનારિયા પર્ણ ધબ્બા	875-1050	1250-1500	500 લિટર/હેક્ટર	27	-
દ્રાક્ષ	ડાઉની મિલ્ડ્યુ	0.21% અથવા 210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	0.30% અથવા 300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	જરૂર મુજબ	40	-
		210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	1000 લિટર/હેક્ટર	40	-
દાડમ	પાન અને ફળ પરના ડાઘ	0.21% અથવા 210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	0.30% અથવા 300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	જરૂર મુજબ	10	-
બટાટા	અર્લી અને લેટ બ્લાઇટ	0.21% અથવા 210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	0.30% અથવા 300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	જરૂર મુજબ	15	-
		210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	પાકની અવસ્થા અને છંટકાવના સાધન મુજબ	15	-
ભાત	બ્રાઉન લીફ સ્પોટ (હેલમિન્થોસ્પોરિયમ ઓરાયઝી), નેરો લીફ સ્પોટ (સરકોસ્પોરા ઓરાયઝી)	1050-1400	1500-2000	500 લિટર/હેક્ટર	-	-
	બ્રાઉન લીફ સ્પોટ (હેલમિન્થોસ્પોરિયમ ઓરાયઝી) નેરો લીફ સ્પોટ (સરકોસ્પોરા ઓરાયઝી)	1050-1400	1500-2000	500 લિટર/હેક્ટર	-	-
ટામેટા	બકઆય રોટ	0.21 % અથવા 210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	-તેમજ-	0.30 % અથવા 300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	10	-
	બકઆય રોટ	0.21% અથવા 210 ગ્રામ/100 લિટર પાણી		0.30% અથવા 300 ગ્રામ/100 લિટર પાણી	As required*	10	-

ઉપયોગ માટે દિશા-નિર્દેશ

પ્રોપિનેબ 70 ડબ્લ્યુપી. નો ઉપયોગ રોગની રોકથામ માટે રોગના પ્રથમ લક્ષણો દેખાય ત્યારે પીઠ પર ધારણ કરી શકાય તેવા હાથચાલિત છંટકાવ યંત્ર દ્વારા કરવો જોઇએ।
પાણીની માત્રા જરૂરિયાત મુજબ, વૃક્ષના કદ અને છોડ સુરક્ષા સાધન મુજબ રાખવી।

ઉપયોગનો સમય : સી.આઈ.બી. ના માર્ગદર્શનોનું પાલન કરવું

ઉપયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતીઓ

ફુગનાશકને ખાદ્ય પદાર્થોથી અને બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખવું। ઉપયોગ દરમિયાન ખાદ્ય પદાર્થોનું સેવન અથવા ધુમ્રપાન ન કરવું। ત્વચા અને આંખોને ફુગનાશકના સંપર્કમાં આવવા ન દેવું। ફુગનાશકની છાંટ નાક અથવા મોઢામાં જવા ન દેવી। દૂષિત કપડાં અને ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાખવા। પ્રોપિનેબના સંપર્કમાં આવનારા કામદારો માટે રક્ષણાત્મક વસ્ત્રો જેમ કે લાંબી બાંયની કમીઝ, પેન્ટ, હાથમોજાં, બૂટ અને ચશ્માં પહેરવા જરૂરી છે।

વિષના લક્ષણો

જો ફુગનાશક પેટમાં ગયું હોય તો ઉલ્ટીની લાગણી, પેટમાં દુખાવો અને અતિસાર જેવા લક્ષણો દેખાઈ શકે છે। જો શ્વાસ દ્વારા ફુગનાશક અંદર ગયું હોય તો ફેફસાં અને શ્વાસ નળીઓમાં બળતરા થઈ શકે છે। ઊંઘ આવવી, આરોગ્યમાં ઘટાડો, લાળ ટપકવી, ભૂખ ન લાગવી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, નબળી માંસપેશીઓ।

પ્રાથમિક સારવાર

(1) એક ગ્લાસ પાણીમાં એક ચમચી મીઠું મિક્સ કરીને આપવું અથવા ગળામાં આંગળી નાખીને ઉલ્ટી કરાવવી ઉલ્ટીનું પ્રવાહી સ્વચ્છ નીકળે ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા કરવી। ડોક્ટરને બોલાવવો।
(2) દૂષિત ત્વચાને પાણીથી ધોવી। જો આંખો પ્રભાવિત થઈ હોય તો લગભગ 15 મિનિટ સુધી પાણીથી ધોવી અને ડોક્ટરની સલાહ લેવી।
વનસ્પતિ વિષાક્તતા : સી.આઈ.બી. ના માર્ગદર્શનોનું પાલન કરવું

વિષનાશક

કોઇ વિશિષ્ટ વિષનાશક ઉપલબ્ધ નથી। લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરવી।
ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ
ખાલી ડબ્બાઓને તોડી વસાહતથી દૂર કોઇ સ્થળે દાટી દેવા જોઇએ।ખાલી ડબ્બાઓને બહાર ન છોડવા જેથી તેનો ફરી ઉપયોગ ન થઈ શકે। ડબ્બાઓમાં રહેલો બચેલ માલ અને ધોવાનું પાણી સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો જેથી પર્યાવરણ અને પાણી પ્રદૂષિત ન થાય।

સંગ્રહની શરતો

(1) ફુગનાશકને એવી જગ્યાએ અથવા રૂમમાં રાખવું જે અન્ય વસ્તુઓના સંગ્રહસ્થાનથી દૂર હોય અને તેને તાળાબંધ કબાટમાં રાખવું।
(2) જ્યાં આ ફુગનાશક રાખવાનું હોય તે રૂમ અથવા સ્થળ મજબૂત બનાવેલું, સૂકું, પ્રકાશયુક્ત, હવાદાર અને મોટા કદનું હોવું જોઇએ જેથી પર્યાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય।

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	વર્ણન	વજન
1	પ્રોપિનેબ સક્રિય ઘટક		87.50 % વજન/વજન
2	પ્રેસિપિટેટેડ સિલિકા	-	8.75 % વજન/વજન
3	કેઓલિન	-	પૂરતી માત્રા % વજન/વજન
		કુલ	100 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઇ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਪ੍ਰੋਪਿਨੇਬ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪਾਊਡਰ
(ਸਪਰਸ਼ੀ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ)

ਪ੍ਰੋਪਿਨੇਬ 70 ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ੀ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ/ਭਾਰ ਪ੍ਰੋਪਿਨੇਬ ਨਾਮਕ ਸਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਫੂੰਦ ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ : - ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਅਕਸ਼ੇਰੁਕੀ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਰਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਵਧਾਨ : ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਰਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਲਾਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਕੀੜੇ/ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ		ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ	ਹਰ ਛਿੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਘੰਟੇ)
		ਸ. ਤੱਤ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ)			
ਸੇਬ	ਖੁਰਕ	0.21% ਜਾਂ 210 ਗ੍ਰਾਮ/100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ	0.30% ਜਾਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ/100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ	30	-
ਮਿਰਚ	ਡਾਇਬੈਕ	0.35% ਜਾਂ 350 ਗ੍ਰਾਮ/100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ	0.50% ਜਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ/100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ	ਰੁੱਖ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਉਪਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ	10	-
ਕਪਾਹ	ਅਲਟਰਨਾਰੀਆ ਪੱਤਾ ਧੱਬਾ	875 ਤੋਂ 1050	1250 ਤੋਂ 1500	500 ਲਿਟਰ/ਹੈਕਟੇਅਰ	27	-
ਅੰਗੂਰ	ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡ

প্রোপিনেব 70 শতাংশ দ্রবণীয় পাউডার
(স্পর্শীয় ছত্রাকনাশক)

প্রোপিনেব 70 ডব্লিউ.পি. একটি স্পর্শীয় ছত্রাকনাশক যাতে 70 শতাংশ ওজন/ওজন প্রোপিনেব নামক সক্রিয় উপাদান রয়েছে। বাকি অংশ নিষ্ক্রিয় ও সহযোগী পদার্থ। এটি বিভিন্ন ফসলে ছত্রাকজনিত রোগ প্রতিরোধে জন্য ব্যবহার করা হয়। সতর্কতা : - এই পণ্যটি অমেরুদণ্ডী জলজ প্রাণীর জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। এই ধরনের অপৃষ্ঠস্থ পণ্যের ব্যবহার জলচাষে এবং তার আশেপাশে করা উচিত নয়। সতর্কতা : জলজ প্রাণীর জন্য বিষাক্ত, তাই জলাশয় এবং জলচাষের নিকটে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সুপারিশ

ফসল	পোকামাকড়ের সমস্যার নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা: এ জাতী (প্রতি লি/ কে)	মাত্রা(গ্রাম/লি বা কে)	প্রয়োগের সময়	প্রতীক্ষার সময়কাল (দিনে)
ধান	ব্লাস্ট	0.25% থ 250 মিলি/100 লিটার পানি	2.50% থ 250 গ্রাম/100 লিটার পানি	সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর	30
	খোল পোড়া	250-300 মিলি/100 লিটার পানি	250-300 গ্রাম/100 লিটার পানি	সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর	30
মরিচ	ব্লাইটরোগ	0.25% থ 250 মিলি/100 লিটার পানি	2.50% থ 250 গ্রাম/100 লিটার পানি	রোগ দেখা দেয়ার পর	10
		250-300 মিলি/100 লিটার পানি	250-300 গ্রাম/100 লিটার পানি	রোগ দেখা দেয়ার পর	10
চুল	অ্যান্থ্রাকনোজ টিস্য পচা	0.75-1000	1250-1500	১০ দিন ব্যবধানে	27
আঙুর	এনথ্রাকনোজ	0.25% থ 250 মিলি/100 লিটার পানি	2.50% থ 250 গ্রাম/100 লিটার পানি	রোগ দেখা দেয়ার পর	40
		250-300 মিলি/100 লিটার পানি	250-300 গ্রাম/100 লিটার পানি	রোগ দেখা দেয়ার পর	40
গ্রেপস	পাতা ও ফলের দাগ রোগ	0.25% থ 250 মিলি/100 লিটার পানি	2.50% থ 250 গ্রাম/100 লিটার পানি	রোগ দেখা দেয়ার পর	10
		250-300 মিলি/100 লিটার পানি	250-300 গ্রাম/100 লিটার পানি	সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর	10
আম	আগত ও মেরি ডমপ	0.25% থ 250 মিলি/100 লিটার পানি	2.50% থ 250 গ্রাম/100 লিটার পানি	সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর	15
		250-300 মিলি/100 লিটার পানি	250-300 গ্রাম/100 লিটার পানি	সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর	15
কলা	কুইক ব্লিচ পচা (ক্লোস্ট্রিডিয়াম থাইবো এসিটোবিউটাইলিকাম), ক্রাউন পচা (ফুসারিয়াম প্রজাতি)	1000-1400	1000-1200	১০ দিন ব্যবধানে	-
তিলধান	রোগ ব্লাস্ট এর	0.25% থ 250 মিলি/100 লিটার পানি	2.50% থ 250 গ্রাম/100 লিটার পানি	সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর	10

ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী
প্রোপিনেব 70 ডব্লিউ.পি. রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলে পিঠে বহনযোগ্য হাতচালিত স্প্রে যন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে।
পানির পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী, গাছের আকার এবং উদ্ভিদ সুরক্ষা যন্ত্রের উপর নির্ভর করবে।

ব্যবহারের সময় : সিআইবি-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা
ছত্রাকনাশক খাদ্যদ্রব্য এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। ব্যবহার করার সময় খাদ্য গ্রহণ বা ধূমপান করবেন না। ত্বক এবং চোখকে ছত্রাকনাশকের সংস্পর্শে আসতে দেবেন না। ছত্রাকনাশকের ফোয়ারা নাক বা মুখে প্রবেশ করতে দেবেন না। দূষিত কাপড় এবং ত্বক সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। প্রোপিনেবের সংস্পর্শে আসা শ্রমিকদের সুরক্ষামূলক পোশাক যেমন লম্বা হাতাওয়ালা শার্ট, প্যান্ট, দস্তানা, জুতা এবং চশমা পরা আবশ্যক।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
যদি ছত্রাকনাশক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তবে বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা এবং ডায়রিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যদি শ্বাসের মাধ্যমে ছত্রাকনাশক শরীরে প্রবেশ করে তবে ফুসফুস এবং শ্বাসনালীতে জ্বালা হতে পারে। ঘুম ঘুম ভাব, স্বাস্থ্যের অবনতি, লালা পড়া, ক্ষুধামন্দা, শ্বাসকষ্ট, দুর্বল পেশী।

প্রাথমিক চিকিৎসা
(1) এক গ্লাস পানিতে এক চামচ লবণ মিশিয়ে খাওয়ান অথবা গলায় আঙুল দিয়ে বমি করান। বমির তরল পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যান। চিকিৎসককে ডাকুন।
(2) দূষিত ত্বক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। যদি চোখ আক্রান্ত হয় তবে প্রায় 15 মিনিট পানি দিয়ে ধুয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

উদ্ভিদ বিষাক্ততা : সিআইবি-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

বিষনাশক
কোনও নির্দিষ্ট বিষনাশক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন ।

খালি পাত্রের নিষ্পত্তি
খালি পাত্র ভেঙে বসতি থেকে দূরে কোনও স্থানে পুঁতে ফেলতে হবে। খালি পাত্র বাইরে ফেলে রাখবেন না যাতে সেগুলি পুনরায় ব্যবহার করা না যায়। পাত্রে অবশিষ্ট পদার্থ এবং ধোয়ার পানি নিরাপদ উপায়ে ফেলুন যাতে পরিবেশ এবং পানি দূষিত না হয়।

সংরক্ষণের শর্তাবলী
(1) ছত্রাকনাশক এমন ঘর বা স্থানে রাখুন যা অন্যান্য সামগ্রীর সংরক্ষণস্থল থেকে দূরে এবং তালাবদ্ধ আলমারিতে সংরক্ষিত থাকে।
(2) যে ঘর বা স্থানে এই ছত্রাকনাশক সংরক্ষণ করা হবে তা সঠিকভাবে নির্মিত, শুষ্ক, আলোকিত, বায়ুচলাচলযুক্ত এবং বড় আকারের হওয়া উচিত যাতে পরিবেশ দূষিত না হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	বিবরণ	ওজন
1	প্রোপিনেব সক্রিয় উপাদান		87.50 % ওজন/ওজন
2	ট্রিসিপিটেটেড সিলিকা	-	8.75 % ওজন/ওজন
3	কাওলিন	-	পর্যাপ্ত পরিমাণ % ওজন/ওজন
		মোট	100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

புரோபினெப் 70 சதவீத கரையக்கூடிய தூள்
(தொடர்பு பூஞ்சைக்கொல்லி)

புரோபினெப் 70 டபிள்யூ.பி. என்பது ஒரு தொடர்பு பூஞ்சைக்கொல்லியாகும். இதில் 70 சதவீத எடை/எடையாக புரோபினெப் என்ற செயலில் உள்ள மூலப்பொருள் உள்ளது. மீதமுள்ளவை செயலற்ற மற்றும் துணைப் பொருட்களாகும். இது பல்வேறு பயிர்களில் பூஞ்சை நோய்களை திறம்பட கட்டுப்படுத்துகிறது. எச்சரிக்கை :- இந்த தயாரிப்பு முதுகெலும்பில்லா நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. இத்தகைய மூலக்கூறுகள் கொண்ட தயாரிப்புகளை நீர்வள வளர்ப்பிலும் அதன் அருகிலும் பயன்படுத்தக் கூடாது.
எச்சரிக்கை : நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. ஆகையால் நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர்வள வளர்ப்பு பகுதிகளின் அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

பரிந்துரை

பயிர்	பூச்சி/நோய்/களை பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கான அளவு		நீர்க்க காலத்தின் அளவு (நாட்களில்)	கவனிக்க வேண்டியவை
		கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவை தண்ணீரில் கலக்க வேண்டிய அளவு	கலக்கப்படாத அளவு		
ஆப்பிள்	சொரப்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	30	-
	சாம்பல் நோய்	0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	30	-
பேரி	பேரி சொரப்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	30	-
	சாம்பல் நோய்	0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	30	-
திராட்சை	பழுப்பு அழுகல்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	40	-
	சாம்பல் நோய்	0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	40	-
தக்காளி	முன்கூட்டிய கருகல் நோய்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
	தாமதமான கருகல் நோய்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
உருளைக்கிழங்கு	ஆரம்ப மற்றும் பின்னான கருகல் நோய்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
		0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
நெல்	குலை நோய்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
	இலை கருகல் மற்றும் இலை உறை அழுகல் நோய்	0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
வெங்காயம்	ஊதா வெங்காய இலை கருகல் நோய்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
		0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
கத்தரிக்காய்	பழுப்பு இலை புள்ளி நோய்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
		0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
	கூர்மை மற்றும் பின்னான கருகல் நோய்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
		0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
	பழுப்பு புள்ளி நோய்	0.20% அல்லது 200 கிராம்/100 லிட்டர் தண்ணீர்	2.00% அல்லது 2 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
		0.15% அல்லது 150 மிலி/100 லிட்டர் தண்ணீர்	1.50% அல்லது 1.5 கிலோ/100 லிட்டர் தண்ணீர்	14	-
	பாக்டீரியல் இலை புள்ளி நோய் (சூடோமோனாஸ் சிரிஞ்சே பாத்தோவர் மாலிகோலா)