

INSTRUCTIONS



AJAX

Azoxystrobin 23% SC for Indigenous Manufacture
Systemic Fungicide

Chemical Composition:

Azoxystrobin a.i.	23.00 % w/w
Dispersant agents:Napthalene sulfonate sodium salt condensed with formaldehyde	1.53 % w/w
Stabilizing agents: Hetero polysaccharide	0.27 % w/w
Bentonite-type clay	2.75 % w/w
Antifoaming agent: Dimethyl siloxane	0.23 % w/w
Preservative: 1-2-benzisothiazole-3 (2H)-one, sodium salt	0.16 % w/w
Anti-Freeze: 1,2-propylene glycol	11.00 % w/w
Diluent Water	Q.S. %
Total	100.000 % w/w



Manufactured & Marketed by Address
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED.

Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra
Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The, Sangner, Bagru, Jaipur - 303007,	ML/JDPP/2025-26/221

In case of any customer complaint, please reach out to our Marketing Manager at the above address and you can also contact us on our E-mail : info@agrostar.in or at our toll-free number : 9503095030

Azoxystrobin 23% SC Systemic Fungicide
Azoxystrobin 23% SC is a broadspectrum systemic fungicide recommended for the control of diseases infecting Grapes, Chilli, Mango, Tomato and Potato crops as under . It contains 23% SC of active ingredient, which is equivalent to 250 g/litre of the product. Caution: Product is highly toxic to fish aquatic organism and thus the product containing the molecules may be avoided near aquaculture.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosages / Ha		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (gms)	Formulation(ml)		
Grape	Downy mildew, Powdery mildew	125	500	500-700	7
Pomegranate	Leaf & fruit spot	0.023%	0.1%	500 L/ha (or depending on size of tree)	5
Mango	Anthracoese, Powdery mildew	0.025%	0.1%	100ml/100Ltr. (depending upon size of tree)	5
Potato	Late blight	0.025% (125)	0.1%	500	12
Cucumber	Downy mildew Powdery mildew	125	500	500	5
Cumin	Blight & Powdery mildew	115	500	500	28
Tomato	Early and Late blight	125	500	500	3
Chilli	Fruit rot, Powdery mildew	125	500	500-700	5

Direction of Use: PLANT PROTECTION EQUIPMENT: Knapsack sprayer, Compression knapsack sprayer, Battery operated power sprayer and Tractor mounted sprayer.

Precaution: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots, while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide. Also wash the contaminated clothes.

Symptoms of Poisoning: If, ingested, the early symptoms may be a combination of nausea, vomiting, diarrhoea and abdominal pain.

First Aid: Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. IN CASE OF INGESTION: Give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately. NOTE: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal Of Used Container: 1. Packages or surplus material and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

एजोक्सिस्ट्रोबिन 23 % एस सी (अंतर्पवाही फफूंदनाशक)
एजोक्सिस्ट्रोबिन २३% एस सी एक ब्रूडस्पेक्ट्रम सिस्टमिक फफूंदनाशक है जिसको अंगूर, मिर्च, आम, टमाटर व आलू को विभिन्न रोगों को रोकथाम के लिए एफिफारिफ को जाती है। इसमें २३% एजोक्सिस्ट्रोबिन सक्रिय तत्व के रूप में मौजूद है और यह एक उच्चतम पारदर्श में २५० ग्राम के बरतबर होता है। सावधान: यह जलवायु प्रदूषण और जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। इस लिए इस प्रकार के अनुषंगों से युक्त उत्पाद को जलीय कृषि के पास उपयोग न करें।

उपयोग

फसल	बीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		घाती की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तक काल (दिन)
		स. तत्व (ग्र.)	संरचना (मिली)		
अंगूर	मूडुरोमिल फफूंदी, चुर्ण फफूंदी	125	500	500-700	7
अनार	पत्ता तथा फल धब्बा	0.023%	0.1%	500-700 (बीट के अस्थायी के आधार पर)	5
आम	रूख रोग, चुर्ण फफूंदी	0.025%	0.1%	100ml/100ली. प्रति हेक्टर (बीट के अस्थायी अनुसार)	5
आलू	फंछता अंगमारी	0.025% (125)	0.1%	500	12
खीरा	मूडुरोमिल फफूंदी, चुर्ण फफूंदी	125	500	500	5
जीरा	अंगमारी, चुर्ण फफूंदी	115	500	500	28
टमाटर	अंगमारी व फंछता अंगमारी	125	500	500	3
मिर्च	फल विगलन रोग, चुर्ण फफूंदी	125	500	500-700	5

उपयोग के लिये निर्देश :

कृषि सुरक्षा यंत्र: नैपसेक स्प्रेयर, फुटस्प्रेयर, कम्प्रेसन नैपसेक स्प्रेयर, पावर नैपसेक स्प्रेयर।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :

स्त्रे तैयार करने के लिए खाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्त्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, मुँह और आँखों के सम्पर्क से बचायें। प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र, दस्ताने, नकाब, जूते पहनना चाहिए। छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना नहीं चाहिए। प्रतिदिन प्रयोग के बाद, कौटनशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धोएं।

विष के लक्षण :

प्राथमिक लक्षण है जी मचलना, जाल्टी आना, जुकाम और पेट में दर्द।

प्राथमिक चिकित्सा :

रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें तथा अधिक ठंडा पडने से बचायें। त्वचा में लगने पर दूषित कपड़े उतार दें। और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में साफ पानी से धोएं। यदि फिगल जायें तो रोगी को पानी पिलायें। उल्टी न करायें। और तुरंत डॉक्टर को बुलायें। सूचना - यदि मरीज बेहोश हो तो मुँह से कुछ न दें। उल्टी न करायें।

विषनाशक :

कोई विशिष्ट औषधोपचार नहीं है। लक्षण के अनुसार उपचार करें तथा सम्पर्क उपचार दें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

१. खाली डिब्बों को तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें। २. खाली डिब्बों का पुनःप्रयोग रोकने के लिए उन्हें बाहर मत छोड़ें। ३. खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान, डिब्बों तथा मशीनों के धोवन का सावधानीपूर्वक निपटारा करें जिससे जल व पर्यावरण दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें :

१. कौटनशी के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर, अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण व बचाव से दूर किया जाना चाहिए अथवा कौटनशीक को मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलग तरीके में ताला चाबी लगाकर करें। २. कौटनशीक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, शुष्क, हवादार तथा पर्याप्त लंबाई जिसमें बाह्य द्वार प्रदूषण न हो।

