AgroStar®

DAZMIR GLO

Carbendazim 25 % + Flusilazole 12.5% SE
Systemic Fungicide

डैजमिर ग्लो
कार्बेन्डाजिम 25%+ फल्युसिलाजोल 12.5% तरल मिश्रण
अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक



For Agricultural Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

INSTRUCTIONS
READ LEAFLET BEFORE USE.

सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

MARKETED BY:ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Regd. Office Nos 001 and 002, Ground Floor, Wing A,And Nos 003 and 004, Ground Floor Wing B,Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune, Maharashtra- 411014

यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर 001 और 002, ग्राउंडफ्लोर, विंग, A और नंबर 003 और 004, ग्राउंडफ्लोर विंग B, न्याति टेकपार्क, वडगांव शेरी, पुणे, महाराष्ट्र– 411014, भारत।

Manufactured by: Parijat Industries (India) Limited
Factory: Unit 2 (B): Village Khera Gani, Near Village - Fatehgarh, Raipur Rani Road, Distt -Ambala, Haryana-134201, India.
Unit 3 (C): 1043, 1042, 1040, 1011, 1009 & 1008, GIDC, Waghodia – 391760, Vadodara, Gujarat.

निर्माता: पारिजात इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड,
फैक्ट्री: यूनिट 2 (बी): ग्राम खेरा गनी, नियर ग्राम फतेहगढ, रायपुर रानी रोड, जिला – अम्बाला, हरियाणा 134201, इंडिया।
यूनिट 3 (सी): 1043, 1042, 1040, 1011, 1009 और 1008, जीआईडीसी, वाघोडिया – 391760, वडोदरा, गुजरात।

Destroy container after use as directed on leaflet
पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात डिब्बों को नष्ट करें।
वापरल्यानंतर रिकामे डबे, निर्देशपत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे.
ઉત્પાદનનો છંટકાવ કરી લીધા પછી કન્ટેનરનો નાશ લિફ્લેટમાં સૂચવેલ નિર્દેશો મુજબ કરો.
ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।
লিফলেটে নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহারের পর পাত্রটি ধ্বংস করে দিন।
ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଖାଲି ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁସ୍ତିକାରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
பயன்படுத்திய பிறகு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டபடி பெட்டியை சிதைத்து விடவும்.
కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా ఉపయోగించిన తరువాత కంటైనర్ని నాశనం చేయాలి.
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾಶಪಡಿಸಿ.
ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കണം.
ہدایت کی پرچی پر دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کے بعد دوا کے خالی ڈبوں کو تلف کردیں

Warranty: Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan	Scan to download the AgroStar app	For **customer feedback** contact us: **info@agrostar.in** **9503095030** or **customer service team** at the above address

FRONT

Carbendazim 25% + Flusilazole 12.5% SE
(Systemic Fungicide)

Carbendazim 25 %+ Flusilazole 12.5 % SE is a systemic fungicide used for the control of sheath blight disease in paddy; Stem rot *(sclerotium rolfsii)*, Early leaf spot *(Cercospora arachidicola)*, Late leaf spot *(Phaeoisariopsis personata)* in Groundnut; Powdery mildew *(Leveillula taurica),* Fruit rot *(Alternaria solani)*, Die back *(Colletotrichum capsici)* in Chilli; Alternaria blotch *(Alternaria mali)* and Premature leaf fall *(Marssoma coronaria)* in Apple.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (Litre)	Waiting period from last spray to harvest (in days)
		A.I. (%)	Formu-lation (ml)		
Apple	Alternaria blotch (*Alternaria mali*) and Premature leaf fall (*Marssoma coronaria*	0.03%	0.08%	650-1000	9
Chilli	Powdery mildew *(Leveillula taurica)* Fruit rot *(Alternaria solani)* Die back *(Colletotrichum capsici)*	375	1000	375-500	5
Groundnut	Stem rot *(sclerotium rolfsii)* Early leaf spot *(Cercospora arachidicola)* Late leaf spot *(Phaeoisariopsis personata)*	240 - 300	640 - 800	500	72
Paddy	Sheath blight	300-360	800-960	500	54

Direction of Use: It is recommended for use as foliar spray using high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, rocking sprayer, rocking sprayer, food sprayer etc. It is compatible with commonly used insecticides, fungicides and fertilizers.
Time of application: The product should be sprayed immediately on appearance of disease symptoms
Safety Precautions: Pregnant women should avoid contact with carbendazim formulations. Use gloves, goggles, face mask and protective clothing while handling avoid working in spray mist.
Symptoms of poisoning: Eye contact may initially include eye irritation with discomfort tearing or blurring of vision can cause eye damage. Skin contact may initially include skin irritation with discomfort or rash. Inhalation may initially include irritation of the upper respiratory passages.
First aid measures: Wash the contaminated skin with soap and water flush eye for about 15 minutes. If inhaled remove from exposure to provide fresh air. Give artificial respiration. Induce vomiting, if the operator has ingested the fungicide. Call physician immediately. If swallowed give 1 to 2 glasses and induce vomiting but not when the patent is unconscious. Call for physician.
Phytotoxicity: It is not phytotoxic at recommended dosage.
Antidote: If ingested prepare activated charcoal slurry suspend 50 gm. activated charcoal 400 ml water in plastic bottler and shake well. Administer 5 ml/kg or 350 ml for an average adult. Treat symptomatically.
Good Practices relating to pesticide application techniques:
Dosage/Area (Per Hectare): As mentioned on table.
Weather Condition (in general): Spray when the wind is steady and ideal. Avoid spraying in temperature above 30°C.
Soil & Water (Wherever applicable): Only used as foliar application.
Application Techniques: Spray by using high volume sprayer viz. Knapsack sprayer.
Application Timings: Avoid application in afternoon hours. Ideal timing for application is morning and evening hours.
Crop Stage For Application: Application shall be done at vegetative growth stage of the crop as soon as there is an incidence of disease appearance.
Equipment type: Knapsack sprayer.
Nozzle Type: Hollow cone nozzle.
Re-entry period: 24 hrs.
Pre- Harvest Interval (Days): As mentioned on table.
Frequency Including max Number of Sprays: 2 to 3 sprays based on disease incidence.
Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Not to be applied during crop maturity and just before crop harvest.
Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: As bees and other pollinators forage during the day, spray is recommended in early morning or late evening to reduce the risk of exposure.
Purpose: For Agricultural Use Only.
Disposal of Used Container: Empty containers should be mutilated and buried 1/2 meter deep in soil away from habitation and left in the open to prevent its reuse.
Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from food stuff and other articles in separate almirahs under lock and key away from the reach of children and livestock. 2. The rooms meant for storing shall be well- built, dry, Cool, Well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water vapour. 3. The packages shall be stored/ transported in such a manner that they do not come in contact with food stuff or animal feeds. **Being inflammable they shall be away from sparks fire and open flame.**
"DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS."
Chemical Composition: Dispersants: Ethoxylated Poly Aryl Phenol 2.433% w/w, Ethanolamine Polyacrylate 0.320% w/w, Ammonium Salt of Poly Aryl Phenol Ether Sulphate 1.038% w/w, Ethoxylated Tristyryl Phenol 3.163% w/w, Carbemdazim a.i. 25.00% w/w, Flusilazole a.i. 12.50% w/w, Surfactant: Octyl phenol Ethoxylate 9.367% w/w, Anti Freezing Agent: Glycol 2.260% w/w, Anti Foaming Agent: Silicon Antifoam Emulsion 0.177% w/w, Suspension Aids: Magnesium Aluminium Silicate 0.450% w/w, Ppt. Silica 0.450% w/w, Anti Microbial Agent: Bromo Nitro Propane Diol 0.0913% w/w, pH Adjusters: Potassium Dihydrogen Phosphate 0.060% w/w, Sodium Hydroxide 0.010% w/w, Thickner: Xanthan Gum 0.035% w/w, Diluent: food / pharmaceutical / Quantity / Deioned Water QS % w/w, **Total: 100 % w/w.**
Cautionary Statements: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed to label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. .

ENGLISH

कार्बेन्डाजिम 25% + फल्युसिलाजोल 12.5% तरल मिश्रण
(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

कार्बेन्डाजिम 25% + फल्युसिलाजोल 12.5 % तरल मिश्रण एक अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक है जो धान की फसल में लगने वाली आच्छद अंगमारी, मूंगफली की फसल में लगने वाली तना सड़न (सक्लेरोसियम रोल्फ़साइ), अगेती पर्ण धब्बा (सरकोस्पोरा अरेचीडिकोला), पछेती पर्ण धब्बा (फेसरीओपासिस परसोनाटा); मिर्च की फसल में लगने वाली चुर्णी फफूंदी (लेवीलुला तोरिका), फल विलग्न (आल्टरनेरिया सोलानी), डाई बेक (कोलेटोट्रिकम केपसीसी); सेब की फसल में लगने वाली आल्टरनेरिया बलोच (आल्टरनेरिया माली), समय पूर्व पत्ती का गिरना (मर्सोनिया कोरोनारिया) पर प्रभावकारी है।

उपयोग:

फ़सल	कीट के नाम	प्रति हैक्टर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
		स. तत्व (प्रतिशत)	संरचना (मि .ली.)		
सेब	आल्टरनेरिया बलोच (आल्टरनेरिया माली), समय पूर्व पत्ती का गिरना (मर्सोनिया	0.03%	0.08%	650-1000	9
मिर्च	चुर्णी फफूंदी (लेवीलुला तोरिका), फल विलग्न (आल्टरनेरिया सोलानी),डाई बेक (कोलेटोट्रिकम केपसीसी)	375	1000	375-500	5
मूंगफली	तना सड़न (सक्लेरोसियम रोल्फ़साइ), अगेती पर्ण धब्बा (सरकोस्पोरा अरेचीडिकोला), पछेती पर्ण धब्बा (फेसरीओपासिस परसोनाटा)	240-300	640-800	500	72
धान	आच्छद अंगमारी	300-360	800-960	500	54

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इसका प्रयोग आयतन छिड़काव यंत्र जैसे पीठ पर लादकर चलाने वाला छिड़काव यंत्र, दोलन छिड़काव यंत्र, पैर चलित छिड़काव यंत्र आदि से धान की फसल पर पर्णीय छिड़काव करें। इसका प्रयोग साधारणतया फफूंदनाशक, कीटनाशक और उर्वरक के साथ उपयुक्त है।
प्रयोग का समय: इस फफूंदीनाशक का प्रयोग रोग के लक्षण दिखने पर तुरन्त छिड़काव करें।
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: गर्भवती महिलाओं को कार्बनडाजिम उत्पाद के सम्पर्क से बचना चाहिए। प्रयोग करते समय दस्ताने चेहरे का मुखौटा एंव सुरक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करें। इसकी धुंध व वाष्प में काम न करें। फफूंदीनाशक को हवा की दशा में ही छिड़काव करें और इसकी फुहार में न जायें।
विष के लक्षण: आँखों के संपर्क में आने पर जलन आँसू और धुधंला दिखाई दे सकता है, आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। त्वचा के सम्पर्क में आने पर त्वचा में जलन हो सकती है। सूंघनें पर ऊपरी श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है।
प्राथमिक चिकित्सा: दूषित त्वचा को साबुन और पानी से साफ करें। आँखों को ठण्डे पानी से भली-भांति 15 मिनट तक अच्छी तरह धोयें। रोगी को खुली हवा में ले जायें। यदि सांस नही आ रही हो तो कृत्रिम सांस दें। निगल लेने पर पानी पिलाकर उल्टी करायें। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। तुरंत चिकित्सक को बुलायें।
पौध विषाक्तता: इसका यदि सिफारिश की गई मात्रा में डाला जाएं तो यह फ़सल में पादप विषाक्तता उत्पन्न नहीं करता है।
विषनाशक: निगलने पर चारकोल का सक्रिवित गारा बनायें। 50 ग्राम चारकोल को 400 मिली पानी में अच्छी तरह मिलाकर प्लास्टिक की बोतल में रखें एक सामान्य व्यस्क को 5 मिली. प्रति किलोग्राम या 350 मिली. मात्रा दें। लक्षण अनुसार चिकित्सा करें।
कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास:
मात्रा/क्षेत्र (प्रति हेक्टेयर) : तालिका पर दिए अनुसार।
मौसम की स्थिति (सामान्य रूप से): जब हवा स्थिर और आदर्श हो तब स्प्रे करें। 30° से० से अधिक तापमान में छिड़काव से बचें।
मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो): केवल फोलिअर एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है।
छिडकाव तकनीक: पीठ पर लादने वाले छिड़काव कारक यन्त्र तथा उच्च आयतन वाले छिड़काव यन्त्र का प्रयोग करें।
छिड़काव समय: दोपहर के घंटों में छिड़काव से बचें। छिड़काव के लिए आदर्श समय सुबह और शाम का समय है।
छिड़काव के लिए फसल की अवस्था: रोग की उपस्थिति की घटना होते ही फसल की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था पर छिड़काव किया जाना चाहिए।
उपकरण प्रकार: नैपसैक स्प्रेयर।
नोजल प्रकार: खोखला शंकु नोजल।
पुनः प्रवेश का समय: 24 घंटे।
अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन): तालिका पर दिए अनुसार।
आवृत्ति सहित अधिकतम संख्या में स्प्रेः रोग की घटनाओं के आधार पर 2 से 3 स्प्रे।
चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए: फसल परिपक्वता के दौरान और फसल कटाई से ठीक पहले नहीं लगाया जाना चाहिए।
मधुमक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लाभकारी कीड़ों को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: चूंकि मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता दिन के दौरान भोजन करते हैं, इसलिए जोखिम को कम करने के लिए सुबह जल्दी या देर शाम को स्प्रे करने की सलाह दी जाती है।
उद्देश्य: केवल कृषि उपयोग के लिए।
खाली डिब्बों का निपटारा: खाली डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर 1/2 मीटर गहरे गड्ढे में दफना दें। खुली जगह में दोबारा प्रयोग के लिए न छोडें।
संग्रहण की शर्तें: 1. संरचना को इसके मूल पेकिंग में, बच्चों तथा पशुओं की पहुँच से दूर, उन कमरों या गोदामों से अलग रखें जिनमें खाद्यान तथा अन्य पदार्थ रखें जाने हो अथवा अलमारी में ताला लगाकर बंद रखें। 2. जिन कमरों या गोदामों में इसे रखा जायें वह अच्छी तरह बने हुए शुष्क, ठंडें, प्रकाशमय तथा हवादार हो और उचित आयाम के हों जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हों। 3. डिब्बों का भंडारण तथा वहन इस प्रकार करें कि खाद्य प्रदार्थों या पशु आहार के सम्पर्क में न आयें। **चूंकि यह ज्वलनशील है इसलिए चिंगारी, आग या ज्वाला से दूर रखें।**
"खाली कंटेनरों का पुन: उपयोग करना खतरनाक है।"
रासायनिक संघटन : डिस्परसैन्टस: ईथोक्सीलेटिड पोली एरायल फिनोल 2.433 % भार/भार, ट्राईएथानोलएमाइन पोलीएक्रीलेट 0.320% भार/भार, अमोनियम सॉल्ट ऑफ पोली एराइल फिनोल ईथर सल्फेट 1.038% भार/भार, ईथोक्सीलेटिड ट्राईस्टाइरल फिनोल 3.163% भार/भार, कार्बेन्डाजिम सक्रिय तत्व 25.00% भार/भार, फल्युसिलाजोल सक्रिय तत्व 12.50 % भार/भार, सरफेक्टैन्ट ओक्टाइल इनोल ईथोक्सीलेट 9.367% भार/भार, एंटी फ्रीजिङ्ग एजेन्ट : ग्लाइकोल 2.260 % भार/भार, एंटी फोमिंग एजेन्ट: सिलिकान ऐन्टिफोम ईमलसन 0.177% भार/भार, सस्पेन्सन एड्स: मैग्निशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट 0.450% भार/भार, पी. पी. टी. सिलिका 0.450% भार/भार, एंटी माइक्रोबाइल एंजेट : ब्रोमो नाइट्रो प्रोपेन डायोल 0.0913% भार/भार, पी. एच. एडजेस्टरसः पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट 0.060% भार/भार, सोडियम हाईड्रोक्साइड 0.010 % भार/भार, थिकनर जैन्थम गम 0.035% भार/भार, डाइल्यूऐन्ट : खाद्य/दवा ग्रेड/डीआईयोनाइजड वाटर पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **कुलः 100% भार/भार।**
सावधानियां कथन: 1. पत्रिका व लेबल में दिए हुए फसलों व कीटों के अलावा अन्य के लिये उपयोगी नहीं है। 2. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें।

HINDI

कार्बेन्डाझिम 25% + फ्लुसिलाझोल 12.5% एस ई
(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

कार्बेन्डाझिम 25%+ फ्लुसिलाझोल 12.5% एस ई हे भातातील शीथ ब्लाइट , खोड कुजणे (स्क्लेरोटियम रोल्फसी), पूर्व पानांचे ठिपके (सेर्कोस्पोरा ॲराचिडिकोला), भुईमुगातील पश्च पानांचे ठिपके (फेओइसारिओप्सिस पर्सोनाटा); पावडर बुरशी (लेव्हेल्युला टॉरिका), फळ कुजणे (अल्टरनेरिया सोलानी), मिरचीवरील डाय बॅक (कोलेटोट्रिचम कॅप्सिसी); सफरचंदावरील अल्टरनेरिया ब्लॉच (अल्टरनेरिया माली) आणि अकाली पानांचे गळणे (मार्सोमा कोरोनारिया)या रोगांच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाणारे एक आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे;

शिफारसः

पिक(के)	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्यात द्रावण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
		ए. आय. (%)	मिश्रण (मिली)		
सफरचंद	अल्टरनेरिया ब्लॉच (अल्टरनेरिया माली) आणि अकाली पाने गळणे (मार्सोमा कोरोनरिया)	0.03%	0.08%	650-1000	9
मिरची	पावडर बुरशी (लेव्हिलुला टॉरिका) फळ कुजवा (अल्टरनेरिया सोलानी) मरवा (कोलेटोट्रिचम कॅप्सिसी)	375	1000	375-500	5
भुईमूग	खोड कुजवा (स्क्लेरोटियम रोल्फसी) लवकर पानांवर येणारे ठिपके (सेर्कोस्पोरा ॲराचिडिकोला) उशिरा पानांवर येणारे ठिपके (फेओइसारिओप्सिस पर्सनाटा)	240-300	640-800	500	72
भात	शीथ ब्लाइट	300-360	800-960	500	54

वापराची दिशा: नॅपसॅक स्प्रेअर, रॉकिंग स्प्रेअर, रॉकिंग स्प्रेअर, फूड स्प्रेअर इत्यादी मोठ्या प्रमाणात फवारणी उपकरणे वापरून फोलियर स्प्रे म्हणून वापरण्याची शिफारस केली जाते. हे सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि खतांशी सुसंगत आहे.
वापरण्याची वेळ: रोगाची लक्षणे दिसू लागताच उत्पादनाची ताबडतोब फवारणी करावी.
सुरक्षा खबरदारी: गर्भवती महिलांनी कार्बेडाझिम फॉर्म्युलेशनशी संपर्क टाळावा. उत्पादन हाताळताना हातमोजे, गॉगल्स, फेस मास्क आणि संरक्षक कपडे वापरा. तसेच फवारणीचे धुके टाळा.
विषबाधेची लक्षणे: डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास सुरुवातीला डोळ्यांची जळजळ आणि अस्वस्थता यांचा समावेश असू शकतो. दृष्टी फाटणे किंवा अंधुक होणे यामुळे डोळ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्वचेच्या संपर्कात आल्यास सुरुवातीला त्वचेची जळजळ, अस्वस्थता किंवा पुरळ यांचा समावेश असू शकतो. सुरुवातीला श्वासोश्वासामध्ये वरच्या श्वसनमार्गाची जळजळ असू शकते.
प्रथमोपचार उपाय: दूषित त्वचा साबण आणि पाण्याने स्वच्छ धुवा. आणि डोळे सुमारे 15 मिनिटे धुवा. जर श्वासातून आत गेल्यास ताजी हवा मिळण्यासाठी .ताज्या हवेत न्या. कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या. जर ऑपरेटरने बुरशीनाशक घेतले असेल तर उलट्या करा. लगेच डॉक्टरांना बोलवा. जर गिळले तर 1 ते 2 ग्लास पाणी द्या आणि उलट्या करा पण पेटंट बेशुद्ध असताना नाही. डॉक्टरांना फोन करा.
वनस्पतींवरील दुष्परिणाम: शिफारस केलेल्या प्रमाणात वापरल्यास पिकांसाठी हानिकारक नाही.
विषरोधक: जर सेवन केले तर सक्रिय चारकोल स्लरी तयार करा, प्लास्टिकच्या बाटलीत 50 ग्रॅम सक्रिय चारकोल 400 मिली पाणी मिसळा आणि चांगले हलवा. सरासरी प्रौढ व्यक्तीसाठी 5 मिली/किलो किंवा 350 मिली द्या. लक्षणांनुसार उपचार करा
कीटकनाशकांच्या वापराच्या तंत्रांशी संबंधित चांगल्या पद्धती:
प्रमाण/क्षेत्र (प्रती हेक्टर): लेबलवर निर्देशित केल्याप्रमाणे.
हवामान स्थिती(सामान्यपणे) : जेव्हा वारे शांत व स्थिर असेल तेव्हा फवारणी करा. 30°C च्या वर तापमान असल्यास फवारणी टाळा.
माती व पाणी (जे लागू असेल ते): पानांवरील फवारणीसाठीच फक्त वापरा.
उपयोगाचे तंत्र: नॅपसॅक स्प्रेयर सारख्या उच्च दर्जाचा स्प्रेयर वापरुन फवारणी करा. नॅपसॅक स्प्रेयर.
वापरण्याचा कालावधीः दुपारच्या वेळी वापरणे टाळा. वापरण्यासाठी आदर्श वेळ सकाळ आणि संध्याकाळ आहे.
वापरण्यासाठी पिकाची स्थितीः रोगाचा प्रादुर्भाव होताच पिकाच्या वाढीच्या टप्प्यावरच वापर करावा.
उपकरण प्रकारः नॅपसॅक स्प्रेयर.
नोजल प्रकारः हॉलो कोन नोझल.
पुनर्प्रवेश कालावधीः २४ तास.
कापणीपूर्व अंतराल(दिवसांमध्ये): टेबल मध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे.
फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारिता: रोगाच्या प्रादुर्भावानुसार २ ते ३ वेळा फवारणी करावी.
कोणत्याही पिकावर ज्या स्थितीत तणनाशक वापरू नये अशी स्थितीः पीक परिपक्वतेच्या वेळी किंवा कापणीच्या अगदी आधी वापरू नये.
मधमाशी आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू असणाऱ्या कीटकांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी: मधमाशी व इतर परागकर्ता दिवसा चारा शोधत असल्याने संसर्गाची जोखीम टाळण्यासाठी सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा फवारणी करण्याची शिफारस केलेली आहे.
उद्देश: फक्त शेतीसाठी.
वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: रिकाम्या कंटेनरचे तुकडे करून ते वस्तीपासून १/२ मीटर खोल मातीत गाडावेत आणि त्यांचा पुनर्वापर रोखण्यासाठी उघड्यावर सोडू नयेत.
साठवणुकीच्या अटीः १. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस खाद्यपदार्थ आणि इतर वस्तूंपासून दूर, वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात, मुलांच्या आणि पशुधनाच्या आवाक्याबाहेर, कुलूपबंद आणि स्वतंत्र कपाटात साठवली पाहिजेत. २. साठवणुकीसाठी असलेल्या खोल्या चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, चांगल्या प्रकाशाच्या आणि हवेशीर असाव्यात आणि पाण्याच्या वाफेने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराच्या असाव्यात. ३. पॅकेजेस अशा प्रकारे साठवले पाहिजेत/वाहतूक केले पाहिजेत की ते खाद्यपदार्थांच्या किंवा पशुखाद्याच्या संपर्कात येणार नाहीत. **ज्वलनशील असल्याने ते ठिणग्या, आग आणि ज्वालापासून दूर असले पाहिजेत.**
"रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."
रासायनिक संरचनाः डिस्पर्सट्स: इथॉक्सिलेटेड पॉली एरिल फेनॉल २.४३३% भार/भार, इथेनोलामाइन पॉलीॲक्रिलेट ०.३२०% भार/भार, पॉली एरिल फेनॉल इथर सल्फेटचे अमोनियम मीठ १.०३८% भार/भार, इथॉक्सिलेटेड ट्रिस्टायरिल फेनॉल ३.१६३% भार/भार, कार्बेमडाझिम ए.आय. २५.००% भार/भार, फ्लुसिलाझोल ए.आय. १२.५०% भार/भार, सर्फॅक्टंट: ऑक्टाइल फिनॉल इथॉक्सिलेट ९.३६७% भार/भार, अँटी फ्रीझिंग एजंट: ग्लायकोल २.२६०% भार/भार, अँटी फोमिंग एजंट: सिलिकॉन अँटीफोम इमल्शन ०.१७७% भार/भार, सस्पेंशन एड्स: मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकेट ०.४५०% भार/भार, पृष्ठ. सिलिका ०.४५०% भार/भार, अँटीमायक्रोबियल एजंट: ब्रोमो नायट्रो प्रोपेन डायोल ०.०९१३% भार/भार, पीएच समायोजक: पोटॅशियम डायहाइड्रोजन फॉस्फेट ०.०६०% भार/भार, सोडियम हायड्रॉक्साइड ०.०१०% भार/भार, जाड: झेंथन गम ०.०३५% भार/भार, डायल्युएंट: अन्न/औषध/प्रमाण/डीआयोन केलेले पाणी QS% भार/भार, **एकूण: १००% भार/भार.**
सावधानतेचे विधान: १. लेबल आणि पत्रकांवर नमूद केलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरले जाऊ नये. 2. पत्रकात सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

MARATHI

કાર્બેન્ડાઝિમ 25% + ફ્લુસિલાઝોલ 12.5% SE
(પ્રણાલીગત ફૂગનાશક)

કાર્બેન્ડાઝિમ 25% + ફ્લુસિલાઝોલ 12.5% SE એ ડાંગરમાં શીથ બ્લાઈટ રોગ; મગફળીમાં થડનો સડો (સ્ક્લેરોટિયમ રોલ્ફસી), આગોતરા પાંદડાના ટપકાં (સેરકોસ્પોરા એરાચિડીકોલા), પાછોતરા પાંદડાના ટપકાં (ફેઓઇસેરિઓપ્સિસ પર્સોનાટા); મરચામાં પાવડરી માઇલ્ડ્યુ (લેવેઇલ્યુલા ટૌરિકા), ડાઇ બેક (કોલેટોટ્રિચમ કેપ્સીસી), ફળનો સડો (અલ્ટરનેરિયા સોલાની) સફરજનમાં અલ્ટરનેરિયા બ્લોચ (અલ્ટરનેરિયા માલી) અને અકાળે પાંદડા ખરવા (માર્સોમા કોરોનારિયા) રોગના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતું પ્રણાલીગત ફૂગનાશક છે.

ભલામણ:

પાક(ઓ)	જંતુઓનું સામાન્ય નામ	ડોઝ / હે.		પાણીમાં ઓગાળવુ (લીટર)	અંતિમ છંટકાવ અને લણણી વચ્ચેનો પ્રતીક્ષાનો સમયગાળો (દિવસોમાં)
		એ.આઇ. (%)	ફોર્મ્યુલેશન (મિલી)		
સફરજન	અલ્ટરનેરિયા બ્લોચ (અલટરનેરિયા માલી) અને અકાળે પાંદડા ખરવા (માર્સોમા કોરોનારિયા)	0.03%	0.08%	650-1000	9
મરચાં	પાવડરી માઇલ્ડ્યુ (લેવેઇલ્યુલા ટૌરિકા) ફળનો સડો (અલ્ટરનેરિયા સોલાની) ડાઇ બેક (કોલેટોટ્રિચમ કેપ્સીસી)	375	1000	375-500	5
મગફળી	થડનો સડો (સ્ક્લેરોટિયમ રોલ્ફસી), આગોતરા પાંદડાના ટપકાં (સેરકોસ્પોરા એરાચિડીકોલા), પાછોતરા પાંદડાના ટપકાં (ફેઓઇસેરિઓપ્સિસ પર્સોનાટા)	240-300	640-800	500	72
ડાંગર	શીથ બ્લાઇટ	300-360	800-960	500	54

ઉપયોગ માટે દિશાસૂચન: નૅપસેક સ્પ્રેયર, રોકિંગ સ્પ્રેયર, રોકિંગ સ્પ્રેયર, ફૂડ સ્પ્રેયર વગેરે જેવા ઉચ્ચ વોલ્યુમ છંટકાવ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને પાંદડા પર છંટકાવ માટે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશકો, ફૂગનાશકો અને ખાતરો સાથે સુસંગત છે.
ઉપયોગનો સમય : રોગના લક્ષણો દેખાય કે તરત જ ઉત્પાદનનો છંટકાવ કરવો જોઇએ.
સુરક્ષા સાવચેતીઓ : સગર્ભા સ્ત્રીઓએ કાર્બેન્ડાઝિમ ફોર્મ્યુલેશનના સંપર્કથી બચવું જોઇએ. સ્પ્રે મિસ્ટમાં કામ કરતી વખતે એવિઓડનો ઉપયોગ કરતી વખતે મોજા, ગોગલ્સ, ફેસ માસ્ક અને રક્ષણાત્મક કપડાંનો ઉપયોગ કરો.
ઝેરના લક્ષણો : આંખના સંપર્કમાં આવવા પર શરૂઆતમાં આંખોમાં બળતરા, અગવડતા, આંસુ આવવા અથવા ધૂંધળી દ્રષ્ટિનો સમાવેશ થઈ શકે છે, જેનાથી આંખને નુકસાન થઈ શકે છે. ત્વચાના સંપર્કમાં શરૂઆતમાં ત્વચામાં બળતરા, અગવડતા અથવા ફોલ્લીઓ શામેલ હોઈ શકે છે. શ્વાસમાં લેવાથી શરૂઆતમાં ઉપલા શ્વસન માર્ગમાં બળતરા શામેલ હોઈ શકે છે.
પ્રાથમિક સારવારના પગલાં : દૂષિત ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો, લગભગ 15 મિનિટ સુધી આંખ વીંછળો. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો તાજી હવા પૂરી પાડવા માટે સંપર્કમાંથી દૂર ખસેડો. કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપો. જો ઓપરેટરે ફૂગનાશક પીધું હોય તો ઉલટી કરાવો. તરત જ ડૉક્ટરને બોલાવો. જો ગળી જવામાં આવેલ હોય તો 1 થી 2 ગ્લાસ પાણી આપો અને ઉલટી કરાવો પણ દર્દી બેભાન હોય ત્યારે નહીં. ડૉક્ટરને બોલાવો.
ફાયટોટોક્સિસિટી: ભલામણ કરેલ ડોઝ પર ફાયટોટોક્સિક નથી.
મારણ: જો પીવામાં આવે તો સક્રિય ચારકોલ સ્લરી તૈયાર કરો, પ્લાસ્ટિક બોટલમાં 50 ગ્રામ સક્રિય ચારકોલ 400 મિલી પાણી નાખીને સારી રીતે હલાવો. સરેરાશ પુખ્ત વયના લોકો માટે 5 મિલી/કિ.ગ્રા. અથવા 350 મિલી આપો. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.
જંતુનાશકોના ઉપયોગની તકનીકોને લગતી સારી પદ્ધતિઓ:
માત્રા/વિસ્તાર (હેક્ટર દીઠ) : કોષ્ટકમાં જણાવ્યા મુજબ.
હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે): જ્યારે પવન સ્થિર અને આદર્શ હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. 30° સે. થી ઉપરના તાપમાને છંટકાવ કરવાનું ટાળો.
જમીન અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ પડતું હોય ત્યાં): ફક્ત પાંદડાં પર છંટકાવ માટે વપરાય છે.
ઉપયોગની તકનીકો : ઉચ્ચ વોલ્યુમ સ્પ્રેયર જેમ કે નૅપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરો.
અમલમાં લાવવાની રીત અને સમય: બપોરના સમયે અમલમાં લાવવાનું ટાળો. અરજી કરવાનો આદર્શ સમય સવાર અને સાંજનો છે.
ઉપયોગ માટેનો પાકનો તબક્કોઃ રોગનો હુમલો હુમલો થયો હોવાનું દેખાય કે તરત જ પાકના વનસ્પતિ વિકાસના તબક્કે ઉપયોગ કરવો જોઇએ.
ઉપકરણનો પ્રકારઃ નેપસેક સ્પ્રેયર.
નોઝલનો પ્રકારઃ હોલો કોન નોઝલ.
પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો : 24 કલાક.
લણણી પહેલાંનો અંતરાલ (દિવસો) : કોષ્ટકમાં જણાવ્યા મુજબ.
છંટાકવની અધિકતમ સંખ્યા સહિત ફ્રિક્વન્સીઃ બીમારીની ઘટનાને આધારે ૨થી ૩ છંટકાવ.
તબક્કા કે જે દરમ્યાન કોઇપણ પાક પર જંતુનાશકોનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ: પાકની પરિપક્વતા દરમ્યાન અથવા લણણી પહેલા અમલ ન કરવો જોઇએ.
મધમાખીઓ અને જંતુઓના કુદરતી દુશ્મનો જેવા ફાયદાકારક જંતુઓને નુકસાન ન થાય તે માટે લેવાતી સાવચેતીઓ: દિવસ દરમ્યાન મધમાખીઓ અને અન્ય પરાગ રજકો ચારો લેતા હોવાથી, સંપર્કના જોખમને ઘટાડવા માટે વહેલી સવારે અથવા મોડી સાંજે છંટકાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
હેતુ : માત્ર કૃષિ હેતુ માટે.
વપરાયેલા કન્ટેનરનો નિકાલ: ખાલી કન્ટેનરને તોડી નાખવા જોઇએ અને તેને વસાહતથી દૂર જમીનમાં 1/2 મીટર ઊંડે દાટી દેવા જોઇએ અને તેનો ફરીથી ઉપયોગ અટકાવવા માટે તેમને ખુલ્લામાં છોડી દેવા ન જોઇએ.
સંગ્રહ માટેની શરતો : 1. જંતુનાશકો ધરાવતા પેકેજોને ખાધ પદાર્થો અને અન્ય વસ્તુઓથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા પરિસરમાં બાળકો અને પશુધનની પહોંચથી દૂર તાળું વાસીને અલગ કબાટમાં સંગ્રહિત કરવા જોઇએ. 2. જંતુનાશક સંગ્રહ કરવા માટેના ઓરડા અથવા જગ્યાઓ સારી રીતે ચણવામાં આવેલી, સૂકી, સુપ્રકાશિત અને હવાની અવરજવરવાળી હોવી જોઇએ અને જંતુનાશકની બાષ્પથી પર્યાવરણીય દૂષણ અટકાવવા માટે પૂરતા પરિમાણની હોવી જોઇએ. પેકેજો એવી રીતે સંગ્રહિત/પરિવહન કરવા જોઇએ કે તે ખાધ પદાર્થો અથવા પશુ આહારના સંપર્કમાં ન આવે. **જ્વલનશીલ હોવાથી, તેઓ તણખા, આગ અને ખુલ્લી જ્વાળાઓથી દૂર હોવા જોઇએ.**
"ખાલી કન્ટેનરનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે."
રાસાયણિક સંરચના : વિઘટકો : ઇથોક્સીલેટેડ પોલી એરીલ ફેનોલ 2.433% ભા/ભા, ઇથેનોલામાઇન પોલીએક્રીલેટ 0.320% ભા/ભા, પોલી એરીલ ફેનોલ ઈથર સલ્ફેટનું એમોનિયમ સૉલ્ટ 1.038% ભા/ભા, ઇથોક્સીલેટેડ ટ્રિસ્ટાયરિલ ફેનોલ 3.163% ભા/ભા, કાર્બેમડાઝિમ સ.ત. 25.00% ભા/ભા, ફ્લુસિલાઝોલ સ.ત. 12.50% ભા/ભા, સર્ફેક્ટન્ટ : ઓક્ટીલ ફિનોલ ઇથોક્સીલેટ 9.367% ભા/ભા, એન્ટિ-ફ્રીઝિંગ એજન્ટ : ગ્લાયકોલ 2.260% ભા/ભા, એન્ટિ-ફોમિંગ એજન્ટ : સિલિકોન એન્ટિફોમ ઇમલ્શન 0.177% ભા/ભા, સસ્પેન્શન એડ્સ : મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ 0.450% ભા/ભા, પીપીટી. સિલિકા 0.450% ભા/ભા, એન્ટી માઇક્રોબાયલ એજન્ટ : બ્રોમો નાઇટ્રો પ્રોપેન ડાયોલ 0.0913% ભા/ભા, પીએચ એડજસ્ટર્સ: પોટેશિયમ ડાયહાઇડ્રોજન ફોસ્ફેટ 0.060% ભા/ભા, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ 0.010% ભા/ભા, ઘટ્ટ કરનાર : ઝેન્થન ગમ 0.035% ભા/ભા, પાતળું કરનાર: ખોરાક/ઔષધીય/જથ્થો/ડીયોનેટેડ પાણી Q S % ભા/ભા, **કુલ:100% ભા/ભા.**
સાવચેતીભર્યું નિવેદન : 1. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સબસ્ક્રાઇબ કરેલા હેતુઓ સિવાય અન્ય કોઇ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. 2. પત્રિકાના નિર્દેશન મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરના નાશ કરો.

GUJARATI

ਕਾਰਬੇਂਡਾਜ਼ਿਮ 25% + ਫਲੂਸੀਲਾਜ਼ੋਲ 12.5% ਐਸਈ
(ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ)

ਕਾਰਬੇਂਡਾਜ਼ਿਮ 25% + ਫਲੂਸੀਲਾਜ਼ੋਲ 12.5% ਐਸਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਇਟ ਬਿਮਾਰੀ; ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਦੀ ਸੜਨ (ਸਕਲੇਰੋਟੀਅਮਰੋਲਫਸੀ), ਅਰਲੀ ਲੀਫ ਸਪਾਟ (ਸਰਕੋਸਪੋਰਾਰਾਚੀਡੀਕੋਲਾ), ਲੇਟ ਲੀਫ ਸਪਾਟ (ਫਾਈਓਇਸਾਰੀਓਪਸਿਸਪਰਸੋਨਾਟਾ); ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਉਡਰਰੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ (ਲੇਵੇਇਲੂਲਾਟੌਰਿਕਾ), ਫਲਾਂ ਦੀ ਸੜਨ (ਅਲਟਰਨੇਰੀਆਸੋਲਾਨੀ), ਡਾਈ ਬੈਕ (ਕੋਲੇਟੋਟ੍ਰੀਚੁਮਕੈਪਸੀਸੀ); ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਬਲੌਚ (ਅਲਟਰਨੇਰੀਆਮਾਲੀ) ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੜਨਾ (ਮਾਰਸੋਮਾਕੋਰੋਨਾਰੀਆ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਿਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ / ਹੈਕ		ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨਾਂ)
		ਏ.ਆਈ. (%)	ਫਾਰਮੂਲਾ (ਮਿਲੀ)		
ਸੇਬ	ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਬਲੌਚ (ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਮਾਲੀ) ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੜਨਾ (ਮਾਰਸੋਮਾਕੋ ਰੋਨਾਰੀਆ)	0.03%	0.08%	650-1000	9
ਮਿਰਚ	ਪਾਉਡਰਰੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ (ਲੇਵੇਇਲੂਲਾ ਟੌਰਿਕਾ), ਫਲਾਂ ਦੀ ਸੜਨ (ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਸੋਲਾਨੀ), ਡਾਈ ਬੈਕ (ਕੋਲੇਟੋਟ੍ਰੀਚੁਮ ਕੈਪਸੀਸੀ)	375	1000	375-500	5
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਤਣੇ ਦੀ ਸੜਨ (ਸਕਲੇਰੋਟੀਅਮ ਰੋਲਫਸੀ), ਅਰਲੀ ਲੀਫ ਸਪਾਟ (ਸਰਕੋਸਪੋਰਾ ਰਾਚੀਡੀਕੋਲਾ), ਲੇਟ ਲੀਫ ਸਪਾਟ (ਫਾਈਓਇਸਾਰੀਓਪਸਿਸ ਪਰਸੋਨਾਟਾ)	240-300	640-800	500	72
ਝੋਨਾ	ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਇਟ	300-360	800-960	500	54

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਬੈਕਪੈਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਅਤੇ ਰੌਕਿੰਗ ਸਪਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਲੀਆਰ ਸਪਰੇਅਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, , ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਪਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਵੀਓਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ, ਚਸ਼ਮੇ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਟਣਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ। ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਗਲਾਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਂਟੀਡੋਟ: ਜੇਕਰ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਚਾਰਕੋਲ ਸਲਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸੱਸਪੈਂਡ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ 400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਚਾਰਕੋਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਔਸਤ ਬਾਲਗ ਲਈ 5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਿਓ। ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ:
ਮਾਤਰਾ/ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ): ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ): ਹਵਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। 30°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ: ਹਾਈ ਵਾਲਿਊਮ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਫਸਲ ਪੜਾਅ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ।
ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ।
ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 24 ਘੰਟੇ।
ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ (ਦਿਨ): ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੇਅ ਸਮੇਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ : ਕੀਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਅਧਾਰਤ 2 ਤੋਂ 3 ਛਿੜਕਾਅ।
ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ: ਫਸਲ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਗਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦੇਸ਼: ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ।
ਵਰਤੇ ਕੀਟੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ: ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 1/2 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ : 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ-ਚਾਬੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ, ਠੰਢੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 3. ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। **ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।**
"ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।"
ਕੈਮੀਕਲ ਰਚਨਾ: ਡਿਸਪਰਸੈਂਟਸ: ਈਥੋਕਸੀਲੇਟਿਡ ਪੋਲੀ ਅਰਾਇਲ ਫੀਨੋਲ 2.433% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਈਥਾਨੋਲਾਮਾਈਨ ਪੋਲੀਐਕ੍ਰੀਲੇਟ 0.320% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਪੋਲੀ ਅਰਾਇਲ ਫੀਨੋਲ ਈਥਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ 1.038% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਈਥੋਕਸਾਈਲੇਟਿਡ ਟ੍ਰਿਸਟਾਇਰਿਲ ਫੀਨੋਲ 3.163% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ੀਮਾ.ਆਈ. 25.00% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਫਲੂਸੀਲਾਜ਼ੋਲੀਆ.ਆਈ. 12.50% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ: ਔਕਟਾਈਲ ਫਿਨੋਲ ਈਥੋਕਸੀਲੇਟ 9.367% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਐਂਟੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ: ਗਲਾਈਕੋਲ 2.260% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਐਂਟੀ ਫੋਮਿੰਗ ਏਜੰਟ: ਸਿਲੀਕਾਨ ਐਂਟੀਫੋਮ ਇਮਲਸ਼ਨ 0.177% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਸੱਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਹਿੱਕ ਤੱਤ: ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਲਿਊਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ 0.450% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਪੀਪੀਟੀ ਸਿਲਿਕਾ 0.450% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਐਂਟੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਏਜੰਟ: ਬ੍ਰੋਮੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਡਾਈਓਲ 0.0913% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, pH ਐਡਜਸਟਰ: ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੇਟ 0.060% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ 0.010% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ: ਜ਼ੈਂਥਨ ਗਮ 0.035% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਪਤਲਾ: ਭੋਜਨ/ਦਵਾਈਆਂ/ਮਾਤਰਾ/ਡੀਓਨਡ ਪਾਣੀ QS % ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, **ਕੁੱਲ: 100% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ।**
ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ: 1. ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਲੀਫ਼ਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

PUNJABI

445.00 mm

Size : 445 mm X 320 mm
Date : 11.12.2025

କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 25 % + ଫ୍ଲୁସିଲାଜୋଲ୍ 12.5% SE
(ଅନ୍ତର୍ଭେଦି ଫିମ୍ପିନାଶକ)

କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 25 % + ଫ୍ଲୁସିଲାଜୋଲ୍ 12.5% SE ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭେଦି ଫିମ୍ପିନାଶକ ଯାହା ଧାନରେ ସିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଗ, କାଣ୍ଡପଚା (ସ୍କେଲେରୋଟିୟମ୍ ରୋଲ୍ଫସି), ସଅଳ ପତ୍ର ଦାଗ (ସେରକୋସ୍ପୋରା ଆରାଚିଡିକୋଲା), ଚିନାବାଦାମରେ ଉଛୁର ପତ୍ର ଦାଗ (ଫାୟୋଇସାରିଓପ୍ସିସ୍ ପର୍ସୋନାଟା); ପାଉଡରୀ ମିଲଡିଉ (ଲେଭିଲୁଲା ଟୌରିକା), ଫଳ ପଚା (ଅଲଟରନାରିଆ ସୋଲାନି), ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଡାଏ ବ୍ୟାକ୍ (କୋଲେଟୋଟ୍ରିଚମ୍ କ୍ୟାପସିସି); ସେଓ ପାଇଁ ଅଲଟରନାରିଆ ବ୍ଲଚ୍ (ଅଲଟରନାରିଆ ମାଲି) ଏବଂ ଅକାଳ ପତ୍ର ଝଡା (ମାର୍ସୋମା କୋରୋନାରିଆ) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସୁପାରିଶକରଣ :

ଫସଲ(ଗୁଡ଼ିକ)	ଶତ୍ରୁ ର ସାଧାରଣ ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି		ସିଞ୍ଚନ ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲିଟର)	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ (ଦିନରେ)
		ଏ.ଆଇ. (%)	ପ୍ରସ୍ତୁତି (ମିଲି)		
ସେଓ	ଅଲଟର୍‌ନାରିଆ ବ୍ଲଚ୍ (ଅଲଟରନାରିଆ ମାଲି) ଏବଂ ଅକାଳ ପତ୍ର ଝଡା (ମାର୍ସୋମା କୋରୋନାରିଆ)	0.03%	0.08%	650-1000	9
ଲଙ୍କା	ପାଉଡରୀ ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ (ଲେଭିଲୁଲା ଟୌରିକା) ଫଳ ପଚା (ଅଲଟରନାରିଆ ସୋଲାନି) ଡାଏ ବ୍ୟାକ୍ (କୋଲେଟୋଟ୍ରିଚମ୍ କ୍ୟାପସିସି)	375	1000	375-500	5
ଚୀନା ବାଦାମ	କାଣ୍ଡ ପଚା (ସ୍କେଲେରୋଟିୟମ୍ ରୋଲ୍ଫସି) ସଅଳ ପତ୍ର ଦାଗ (ସେରକୋସ୍ପୋରା ଆରାଚିଡିକୋଲା) ଉଛୁର ପତ୍ର ଦାଗ (ଫାଏଓଇସାରିଓପ୍ସିସ୍ ପର୍ସୋନାଟା)	240-300	640-800	500	72
ଧାନ	ସିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍	300-360	800-960	500	54

ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ : ଏହାକୁ ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, ରକିଂ ସ୍ପ୍ରେୟର, ଫୁଡ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍‌ଯୁକ୍ତ ସ୍ପ୍ରେୟର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ପତ୍ର ସ୍ପ୍ରେ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କୀଟନାଶକ, ଫିମ୍ପିନାଶକ ଏବଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ।

ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସମୟ: ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟି ତୁରନ୍ତ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା : ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ କରିବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ହାତରେ ଧରିବା ସମୟରେ ଗ୍ଲୋଭସ୍, ଚଷମା, ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସ୍ପ୍ରେ ମିଷ୍ଟରେ କାମ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ପୋଡିବା ସହ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିପାରେ । ଲୁହ ବାହାରିବା କିମ୍ବା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ଦାଗ ହେବା ସହ ତ୍ୱଚା କୁଣ୍ଡାଇ ମଧ ହୋଇପାରେ । ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉପର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନଳୀରେ ମଧ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା : ଦୂଷିତ ତ୍ୱଚାକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧୋଇ ଆଖି ଫ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଖୋଲା ପବନ ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିମ୍ପିନାଶକ ଗିଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ବାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ କରାନ୍ତୁ । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ । ଯଦି ଗିଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ 1 ରୁ 2 ଗ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ।

ଫାଇଟୋଟକ୍ସିସିଟି: ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ମାତ୍ରାରେ ଏହା ଫାଇଟୋଟକ୍ସିକ୍ ନୁହେଁ।

ପ୍ରତିଷେଧକ : ଯଦି ଏହା ଗିଳିହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସକ୍ରିୟ ଚାରକୋଲ୍ ସ୍ଲରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ 50 ଗ୍ରାମ ସକ୍ରିୟ ଚାରକୋଲ୍‌ରେ 400 ମିଲି ପାଣି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାନ୍ତୁ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମିଲି/କେଜି କିମ୍ବା 350 ମିଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ :

ମାତ୍ରା/କ୍ଷେତ୍ର (ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର): ଟେବୁଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି।

ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା (ସାଧାରଣ ଭାବରେ): ଯେତେବେଳେ ପବନ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। 30°C ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା (ସାଧାରଣ ଭାବରେ): କେବଳ ପତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ: ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍‌ଯୁକ୍ତ ସ୍ପ୍ରେୟର ଯଥା ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ।

ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ : ପତ୍ର ବଢିବା ପରେ ପରେ ରୋଗ ଦେଖାଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ।

ଉପକରଣ ପ୍ରକାର: ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ।

ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର: ହୋଲୋ କୋନ୍ ନୋଜଲ୍।

ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ଅବଧି: 24 ଘଣ୍ଟା ।

ଅମଳ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ): ଟେବୁଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ।

ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ବାରମ୍ବାରତା : ରୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଆଧାର କରି 2 ରୁ 3 ଟି ସ୍ପ୍ରେ।

କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଫସଲରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ: ଫସଲ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ମହୁମାଛି ପରି ଉପକାରୀ କୀଟ ଏବଂ ଅପକାରୀ କୀଟଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ : ଯେହେତୁ ଦିନରେ ମହୁମାଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରାଗସଂଗମ କରୁଥିବା କୀଟମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍।

ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: କେବଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।

ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେନରର ବ୍ୟାଜାପ୍ତକରଣ : ଖାଲି କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଘରଠାରୁ 1/2 ମିଟର ଦୂରରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି : 1. କୀଟନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଲଗା କୋଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସରରେ ପିଲା ଏବଂ ପଶୁପାଳନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଦୂରରେ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ଥିବା ଅଲଗା ଆଲମିରାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । 2. ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଶୁଷ୍କ, ଥଣ୍ଡା, ସୁଆଲୋକିତ ଏବଂ ବାୟୁଚଳାଚଳଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। 3. ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ/ପରିବହନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚକ୍‌ମକ୍ କରୁଥିବା ନିଆଁ ଏବଂ ଖୋଲା ଝାସରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

"ଖାଲି ଡବାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। "

ରାସାୟନିକ ଗଠନ: ଡିସ୍ପର୍‌ସାଣ୍ଟ : ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ପୋଲି ଆରିଲ୍ ଫେନୋଲ୍ 2.433 % w/w, ଇଥାନୋଲାମାଇନ୍ ପଲିଆକ୍ରିଲେଟ୍ 0.320 % w/w, ପଲି ଆରିଲ୍ ଫେନୋଲ୍ ଇଥର ସଲଫେଟର ଆମୋନିୟମ୍ ଲୁଣ 1.038 % w/w, ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରିଷ୍ଟାଇରିଲ୍ ଫେନୋଲ୍ 3.163 % w/w, କାର୍ବେମଡାଜିମ୍ a.i. 25.00 % w/w, ଫ୍ଲୁସିଲାଜୋଲ୍ a.i. 12.50 % w/w, ସର୍ଫ୍ୟାକଣ୍ଟାଣ୍ଟ : ଅକ୍ଟାଇଲ୍ ଫିନୋଲ୍ ଇଥୋକ୍ସିଲେଟ୍ 9.367 % w/w, ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରିଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ: ଗ୍ଲାଇକଲ୍ 2.260 % w/w, ଆଣ୍ଟି ଫୋମିଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ: ସିଲିକନ୍ ଆଣ୍ଟିଫୋମ୍ ଏମଲ୍ସନ୍ 0.177 % w/w, ସସପେନ୍‌ସନ୍ ଏଡ୍‌ସ୍: ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲିକେଟ୍ 0.450 % w/w, ପିପିଟି. ସିଲିକା 0.450 % w/w, ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାଏଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ: ବ୍ରୋମୋ ନାଇଟ୍ରୋ ପ୍ରୋପେନ୍ ଡାୟୋଲ୍ 0.0913 % w/w, ପିଏଚ୍ ଆଡଜଷ୍ଟର: ପୋଟାସିୟମ୍ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫସଫେଟ୍ 0.060 % w/w, ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ 0.010 % w/w, ଘନତା: ଝାନ୍ଥାନ୍ ଗମ୍ 0.035 % w/w, ଡିଲ୍ୟୁଏଣ୍ଟ : ଖାଦ୍ୟ/ଔଷଧ/ମାତ୍ରା / ଡିଆୟୋନାଇଜଡ୍ ଜଳ QS % w/w, **ମୋଟ: 100% w/w. ସତର୍କତା ସୂଚନା:** 1. ଲେବଲ୍/ ପୁସ୍ତିକାରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଚିତ୍। 2. ଲିଫଲେଟ୍ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ କଣ୍ଟେନରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

Oriya

கார்பென்டாசிம் 25 % + ஃப்ளூசிலாசோல் 12.5% SE
(ஊடுருவும் பூஞ்சைக்கொல்லி)

கார்பென்டாசிம் 25 % + ஃப்ளூசிலாசோல் 12.5% S E என்பது நெல்லில் இலையுறை கருகல் நோய்; நிலக்கடலையில் தண்டு அழுகல் (ஸ்க்லெரோட்டியம்ரோல்ஃப்சி), ஆரம்ப இலைப்புள்ளி (செர்கோஸ்போராஅராச்சிடிகோலா), தாமதமான இலைப்புள்ளி (பயோசாரியோப்சிஸ்பர்சோனாட்டா); மிளகாயில் நுண்துகள் பூஞ்சை காளான் (லெவில்லுலடாரிகா), பழ அழுகல் (அல்டர்நேரியாசோலானி), நுனிக்கருகல் (கோலெட்டோட்ரிச்சம்காப்சிசி); ஆப்பிளில் ஆல்டர்னேரியா பிளாட்ச் (ஆல்டர்னேரியாமாலி) மற்றும் முன்கூட்டிய இலை உதிர்வு (மார்சோமகோரோனாரியா) ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஊடுருவும் பூஞ்சைக்கொல்லியாகும்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சிகளின் பொதுவான பெயர்	மருந்தளவு/ ஹெக்டேர்		தண்ணீரில் நீர்த்தல் (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையிலான காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்)
		A.I. (%)	கலவைத்-திட்டம் (மிலி)		
ஆப்பிள்	ஆல்டர்னேரியா பிளாட்ச் (ஆல்டர்னேரியாமாலி) மற்றும் முன்கூட்டிய இலை உதிர்வு (மார்சோமகோ-ரோனாரியா)	0.03%	0.08%	650-1000	9
மிளகாய்	தண்டு அழுகல் (ஸ்க்லெரோட்டியம் ரோல்ஃப்சி), ஆரம்ப இலைப்புள்ளி (செர்கோஸ்போரா அராச்சிடிகோலா), தாமதமான இலைப்புள்ளி (பயோசாரியோப்சி ஸ்பர்சோனாட்டா)	375	1000	375-500	5
நிலக்கடலை	தண்டு அழுகல் (ஸ்க்லெரோட்டியம் ரோல்ஃப்சி), ஆரம்ப இலைப்புள்ளி (செர்கோஸ்போரா அராச்சிடிகோலா), தாமதமான இலைப்புள்ளி (பயோசாரியோப்சிஸ்பர் சோனாட்டா)	240-300	640-800	500	72
நெல்	இலையுறை கருகல்	300-360	800-960	500	54

பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறை: முதுகுப்பை தெளிப்பான், ராக்கிங் தெளிப்பான், ராக்கிங் தெளிப்பான், உணவு தெளிப்பான் போன்ற அதிக அளவு தெளிக்கும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி இலைவழி தெளிப்பாகப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பூச்சிக்கொல்லிகள், பூஞ்சைக் கொல்லிகள் மற்றும் உரங்களுடன் இணக்கமானது.

பயன்பாட்டு நேரம்: நோய் அறிகுறிகள் தோன்றியவுடன் உடனடியாக தயாரிப்பை தெளிக்க வேண்டும்.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கார்பென்டாசிம் கலவையுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்க வேண்டும். கையாளும் போது கையுறைகள், கண்ணாடிகள், முகமூடி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆடைகளைப் பயன்படுத்தவும் தெளிப்பு தூவான்களில் பணிப்புரிவதைத் தவிர்க்கவும்.

விஷமேறியதறகான அறிகுறிகள்: கண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் ஆரம்பத்தில் கண் எரிச்சலுடன் கூடிய அசௌகரியம் கண்ணீர் வழிதல் அல்லது மங்கலான பார்வையுடன் கண் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். சருமத்துடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் ஆரம்பத்தில் அசௌகரியம் அல்லது சொறியுடன் கூடிய சரும எரிச்சல் ஏற்படலாம். உள்ளிழுத்தல் ஆரம்பத்தில் மேல் சுவாசப் பாதைகளில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தலாம்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்: மாசுபட்ட சருமத்தை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவி சுமார் 15 நிமிடங்களுக்கு கண்களைக் கழுவவும். சுவாசித்தால் வெளிப்பாட்டிலிருந்து நீக்கி புதிய காற்று இருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லவும். செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும். ஆபரேட் செய்பவர் பூஞ்சைக்கொல்லியை உட்கொண்டால் வாந்தியைத் தூண்டவும். உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். விழுங்கினால் 1 முதல் 2 கிளாஸ் வரை கொடுத்து வாந்தியைத் தூண்டவும் ஆனால் நோயாளி மயக்க நிலையில் இருக்கும்போது வேண்டாம். மருத்துவரை அழைக்கவும்.

தாவர நச்சுத்தன்மை: இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் தாவர நச்சுத்தன்மையற்றது.

மாற்று மருந்து: உட்கொண்டால், 50 கிராம் செயல்படுத்தப்பட்ட கரி குழம்பு கரைசல் தயாரிக்கவும். செயல்படுத்தப்பட்ட கரியை 400 மில்லி தண்ணீரில் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் ஊற்றி நன்கு குலுக்கவும். சராசரி வயது வந்தவருக்கு 5 மிலி/கிலோ அல்லது 350 மிலி கொடுக்கவும். அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சையளிக்கவும்..

பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாட்டு நுட்பங்கள் தொடர்பான நல்ல நடைமுறைகள்:

மருந்தளவு/பரப்பளவு (ஒரு ஹெக்டேருக்கு): அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி.

வானிலை சூழல் (பொதுவாக): காற்று சீராகவும் ஏதுவான அளவிலும் இருக்கும்போது தெளிக்கவும். 30°C க்கும் அதிகமான வெப்பநிலையில் தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

மண் மற்றும் நீர் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்): இலைவழி பயன்பாடாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பயன்பாட்டு நுட்பங்கள்: அதிக அளவு தெளிப்பான் அதாவது முதுகுப்பை தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்கவும்.

பயன்படுத்தும் நேரங்கள்: பிற்பகல் நேரங்களில் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நேரம் காலை மற்றும் மாலை நேரங்கள்.

பயன்பாட்டிற்கான பயிர் நிலை: பயிரின் தாவர வளர்ச்சி நிலையில் நோய் தோன்றியவுடன் உடனடியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

உபகரண வகை: நாப்சாக் தெளிப்பான்.

முனை வகை: வெற்று கூம்பு முனை.

மறு நுழைவு காலம்: 24 மணி நேரம்.

அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி (நாட்கள்): அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி.

அதிகபட்ச தெளிப்புகளின் எண்ணிக்கை உட்பட தெளிப்பதற்கான கால வழக்கம்: நோயின் அறிகுறியின் அடிப்படையில் 2 இலிருந்து 3 தெளிப்புகள்.

எந்தப் பயிரிலும் பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாத நிலைகள்: பயிர் முதிர்ச்சியடையும் போது மற்றும் பயிர் அறுவடைக்கு சற்று முன்பு பயன்படுத்தக்கூடாது.

தேனீக்கள் மற்றும் பூச்சிகளின் இயற்கையான எதிரிகள் போன்ற பயனளிக்கும் பூச்சிகளுக்கு கெடுதல் விளைவிக்காமல் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள்: தேனீக்கள் மற்றும் பிற மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்கள் பகலில் உணவு தேடுவதால், வெளிப்பாட்டின் ஆபத்தைக் குறைக்க அதிகாலை அல்லது மாலையில் தெளிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

நோக்கம்: விவசாய நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே.

பயன்படுத்திய கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல்: காலியான கொள்கலன்களை சிதைத்து, வாழ்விடங்களிலிருந்து தள்ளி 1/2 மீட்டர் ஆழத்தில் மண்ணில் புதைக்க வேண்டும் மேலும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க திறந்த வெளியில் விடக் கூடாது.

சேமிப்பு நிலைமைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லிகள் இருக்கும் பேக்கேஜ்களைத் தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பிற பொருட்களிலிருந்து தள்ளி தனித்தனி அலமாரிகளில், குழந்தைகள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு எட்டாதவாறு பூட்டி வைக்க வேண்டும் 2. சேமிப்பிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், குளிராகவும், நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டமாகவும், நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான பரிமாணங்களுடன் இருக்க வேண்டும். 3. உணவுப் பொருட்கள் அல்லது விலங்குத் தீவனங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளாத வகையில் பேக்கேஜ்கள் சேமிக்கப்பட வேண்டும்/ கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும். எளிதில் தீப்பிடிக்கும் தன்மை கொண்டவை என்பதால், **அவை தீப்பொறிகள் மற்றும் திறந்த சுடரிலிருந்து தள்ளி இருக்க வேண்டும். காலியான கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது.**

ரசாயணக் கலவை: பரவச் செய்யும் பொருட்கள்: எத்தாக்சிலேட்டட் பாலி ஆரில் பீனால் 2.433 % w/w, எத்தனோலமைன் பாலிஅக்ரிலேட் 0.320 % w/w, பாலி ஆரில் பீனால் ஈதர் சல்பேட்டின் அம்மோனியம் உப்பு 1.038 % w/w, எத்தாக்சிலேட்டட் டிரிஸ்டைரில் பீனால் 3.163 % w/w, கார்பெம்டாசிம் a.i. 25.00 % w/w, ஃப்ளூசிலாசோல் ஏ.ஐ. 12.50 % w/w, சர்பாக்டான்ட்: ஆக்டைல் பீனால் எத்தாக்சிலேட் 9.367 % w/w, உறை எதிர்ப்பு பொருள்: கிளைக்கால் 2.260 % w/w, நுரை எதிர்ப்பு பொருள்: சிலிக்கான் நுரை எதிர்ப்பு குழம்பு 0.177% w/w, கரைசலுக்கு உதவும் பொருட்கள்: மெக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கேட் 0.450% w / w , துரிதப்படுத்தப்பட்ட சிலிக்கா 0.450% w / w , நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பொருள்: புரோமோ நைட்ரோ புரோபேன் டையோல் 0.0913 % w/w,pH சரிப்படுத்திகள்: பொட்டாசியம் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் 0.060 % w/w, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு 0.010% w/w, கெட்டிப்பாக்கி: சாந்தன் கம் 0.035 % w/w,நீர்க்கச் செய்யும் பொருள்: உணவு/மருந்து/அளவு/கனிமம் நீக்கப்பட்ட நீர் QS % w/w, **மொத்தம்: 100 % w/w.**

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பயன்படுத்திய பிறகு கொள்கலனை அழிக்கவும்.

TAMIL

ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 25% + ಫ್ಲುಸಿಲಾಜೋಲ್ 12.5% ಎಸ್‌ಇ
(ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 25 %+ ಫ್ಲುಸಿಲಾಜೋಲ್ 12.5 % SE ಎಂಬುದು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡೆ ಕೊಳೆರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ; ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ (ಸ್ಕ್ಲೆರೋಟಿಯಮ್ ರೋಲ್ಫ್ಸಿ), ಆರಂಭಿಕ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ (ಸೆರ್ಕೋಸ್ಪೊರಾ ಅರಾಚಿಡಿಕೋಲಾ), ಅಂತ್ಯ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ (ಫಿಯೋಸಾರಿಯೊಪ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಟಾ); ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿರೋಗ (ಲೆವಿಲುಲಾ ಟೌರಿಕಾ), ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಳೆತ (ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಸೋಲಾನಿ), ಕೊಂಬೆ ಸಾಯುವಿಕೆ (ಕೊಲೆಟೋಟ್ರಿಚಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಸಿ); ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಬ್ಲಾಚ್ (ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಮಾಲಿ) ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ (ಮಾರ್ಸೋಮಾ ಕೊರೊನಾರಿಯಾ).

(ಶಿಫಾರಸು):

ಬೆಳೆಗಳು	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರ್		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಎ.ಐ. (%)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲೀ)		
ಸೇಬು	ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಬ್ಲಾಚ್ (ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಮಾಲಿ) ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ (ಮಾಸೋರ್ಮಾ ಕೊರೊನಾರಿಯಾ)	0.03%	0.08%	650-1000	9
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಬೂದಿರೋಗ (ಲವ್‌ಲುಲಾ ಟೌರಿಕಾ) ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತ (ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಸೊಲಾನಿ) ಕೊಂಬೆ ಸಾಯುವಿಕೆ (ಕೊಲೆಟೊಟ್ರಿಚಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಸಿ)	375	1000	375-500	5
ನೆಲಗಡಲೆ	ಕಾಂಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ (ಸ್ಕ್ಲೆರೋಟಿಯಮ್ ರೋಲ್ಫ್ಸಿ) ಆರಂಭಿಕ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ (ಸೆರ್ಕೊಸ್ಪೊರಾ ಅರಾಚಿಡಿಕೋಲಾ) ಅಂತ್ಯ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ (ಫೇವಾಸೇರಿಯೊಪ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಸನೇಟಾ)	240-300	640-800	500	72
ಭತ್ತ	ಭತ್ತದ ಬಡ್ಡೆ ಕೊಳೆರೋಗ	300-360	800-960	500	54

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯ: ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಕಣ್ಣೀರು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸೇಂದ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಬೇಕು. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರೆ, ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನುಂಗಿದರೆ 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀಡಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇದ್ದಿಲು ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, 50 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ರಿಯ ಇದ್ದಿಲನ್ನು 400 ಮಿಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 5 ಮಿಲೀ/ಕಿಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 350 ಮಿಲೀ ನೀಡಬೇಕು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು:

ಪ್ರಮಾಣ/ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ): ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ): ಗಾಳಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 30°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡೆ): ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ.

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಬೆಳೆಗಳ ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.

ಸಲಕರಣೆಯ ವಿಧ: ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಂತ್ರ.

ನಳಿಕೆಯ ವಿಧ: ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಜಲ್.

ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳು.

ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಮಧ್ಯಂತರ (ದಿನಗಳು): ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆವರ್ತನ: ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 2 ರಿಂದ 3 ಸಿಂಪರಣೆಗಳು.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಾರದ ಹಂತಗಳು: ಬೆಳೆ ಮಾಗುವಿಕೆಯ ಹಂತ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ, ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶ: ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ, ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ 1/2 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮೇರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಹಾಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 2. ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು, ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 3. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡೆ): ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಪಶು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು/ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಅವು ಉರಿಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು.

"ಖಾಲಿ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ."

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಪ್ರಸರಣಕಾರಕಗಳು: ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿ ಆರಿಲ್ ಫಿನಾಲ್ 2.433% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಎಥೆನೊಲಮೈನ್ ಪಾಲಿಯಾಕ್ರಿಲೇಟ್ 0.320% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಪಾಲಿ ಆರಿಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಈಥರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ನ ಅಮೋನಿಯಂ ಉಪ್ಪು 1.038% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈಸ್ಟೈರಿಲ್ ಫೀನಾಲ್ 3.163% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಕಾರ್ಬೆಮ್ಡಾಜಿಮ್ ಎ.ಐ. 25.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಫ್ಲುಸಿಲಾಜೋಲ್ ಎ.ಐ. 12.50 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್: ಆಕ್ಟೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ 9.367 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಘನೀಕರಣ ನಿರೋಧಕ ಏಜೆಂಟ್: ಗ್ಲೈಕಾಲ್ 2.260% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಫೋಮಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಏಜೆಂಟ್: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಂಟಿಫೋಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ 0.177% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏಡ್ಸ್: ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ 0.450% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಪಿಪಿಟಿ. ಸಿಲಿಕಾ 0.450% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಿರೋಧಕ ಏಜೆಂಟ್: ಬ್ರೋಮೋ ನೈಟ್ರೋ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಡಯೋಲ್ 0.0913% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಪಿಎಚ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದಾರರು: ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 0.060% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ 0.010 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ದಪ್ಪಕಾರಿ: ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್ 0.035 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ದ್ರಾವಕ: ಆಹಾರ/ಔಷಧ/ಪ್ರಮಾಣ / ಅಯೋನೀಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಕ್ಯೂಎಸ್ % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, **ಒಟ್ಟು: 100% w/w. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ:** 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಧಾರಕವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ.

Kannada

কার্বেনডাজিম ২৫% + ফ্লুসিলাজল ১২.৫% এসই
(পদ্ধতিগত ছত্রাকনাশক)

কার্বেনডাজিম ২৫%+ ফ্লুসিলাজল ১২.৫% এসই হল একটি পদ্ধতিগত ছত্রাকনাশক যা ধানে শিথ ব্লাইট (খোলা পচা) রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়; চীনাবাদামের ডাঁটা পচা (স্ক্লেরোটিয়াম রল্ফসি),পাতার আগাম দাগ (সেরকোস্পোরা রাচিডিকোলা), পাতার দেরিতে দাগ (ফাইওইসারিওপসিস পারসোনাটা); লঙ্কার পাউডারি মিলডিউ (লেভিলুলা টাউরিকা), ফলের পচা (অল্টারনারিয়া সোলানি),ডাই ব্যাক (কোলেটোট্রিচাম ক্যাপসিসি); আপেলের অল্টারনারিয়া ব্লচ (অল্টারনারিয়া মালি) এবং অকাল পাতা ঝরে পড়া (মার্সোমা কোরোনারিয়া)।

সুপারিশ

ফসল (গুলি)	কীটের সাধারন নাম	মাত্রা/হেক্টর		জলের দ্রবণীয় (লিটার)	সর্বশেষ ছিটিয়ে প্রয়োগ এবং ফসল সংগ্রহের মধ্যকার সময়কাল (দিন হিসাবে)
		সক্রিয় উপকরণ (%)	ফর্মুলেশন (মিলি)		
আপেল	অল্টারনারিয়া ব্লচ (অল্টারনারিয়া মালি) এবং অকাল পাতা ঝরে পড়া (মার্সোমা কোরোনারিয়া)	0.03%	0.08%	650-1000	9
লঙ্কা	পাউডারি মিলডিউ (লেভিলুলা টাউরিকা) ফল পচা (অল্টারনারিয়া সোলানি) ডাই ব্যাক (কোলেটোট্রিকুম ক্যাপসিসি)	375	1000	375-500	5
চীনাবাদাম	ডাঁটা পচা (স্ক্লেরোটিয়াম রল্ফসি) পাতার আগাম দাগ (সেরকোস্পোরা রাচিডিকোলা) পাতার দেরিতে দাগ (ফাইওইসারিওপসিস পারসোনাটা)	240-300	640-800	500	72
ধান	খোলা পচা	300-360	800-960	500	54

ব্যবহারের দিকনির্দেশনা: এটি হাই ভলিউম স্প্রে করার সরঞ্জাম, যেমন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, রকিং স্প্রেয়ার, রকিং স্প্রেয়ার, ফুড স্প্রেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে পাতার স্প্রে হিসাবে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়। এটি সাধারণত ব্যবহৃত কীটনাশক, ছত্রাকনাশক এবং সারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রয়োগের সময়: রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে পণ্যটি স্প্রে করা উচিত।

নিরাপত্তা সতর্কতা: গর্ভবতী মহিলাদের কার্বেনডাজিম ফর্মুলেশনের সংস্পর্শ এড়ানো উচিত। স্প্রে মিস্ট নিয়ে পরিচালনা করার সময় গ্লাভস, গগলস, ফেস মাস্ক এবং প্রতিরক্ষামূলক পোশাক ব্যবহার করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: চোখের সংস্পর্শে আসলে প্রথমে অস্বস্তি হওয়ার সাথে তারপরে চোখের জ্বালা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। চোখ থেকে জল পড়া বা দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া থেকে চোখের ক্ষতি হতে পারে। ত্বকের সংস্পর্শে প্রাথমিকভাবে ত্বকের জ্বালা, অস্বস্তি বা ফুসকুড়ি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ঢুকে গেলে প্রাথমিকভাবে উপরের শ্বাসনালীতে জ্বালা হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা: দূষিত ত্বক সাবান এবং জল দিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে ধুয়ে ফেলুন। যদি শ্বাসের মাধ্যমে নাকে ঢুকে যায়, তাহলে তাজা বাতাসের সংস্পর্শে নিয়ে যাবার জন্য সরিয়ে নিয়ে যান। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস দিন। যদি অপারেটর ছত্রাকনাশক খেয়ে থাকে, তাহলে তাকে বমি করান। অবিলম্বে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। গিলে ফেলা হলে ১ থেকে ২ গ্লাস জল দিন এবং বমি করান, কিন্তু রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে নয়। ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

ফাইটোটক্সিসিটি: প্রস্তাবিত মাত্রায় এটি ফাইটোটক্সিক নয়।

প্রতিষেধক: যদি খাওয়া হয়, তাহলে অ্যাক্টিভেটেড চারকোলের ঘোল তৈরি করুন, ৫০ গ্রাম অ্যাক্টিভেটেড চারকোল নিয়ে প্লাস্টিকের বোতলে ৪০০ মিলি জলে মিশিয়ে ভালো করে ঝাঁকান। একজন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য গড়ে ৫ মিলি/কেজি অথবা ৩৫০ মিলি মাত্রায় প্রয়োগ করুন। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিত্সা করুন ।

কীটনাশক প্রয়োগের কৌশল সম্পর্কিত সুঅভ্যাস:

প্রয়োগ মাত্রা/এলাকা (প্রতি হেক্টর): টেবিলে থাকা উল্লেখ অনুসারে।

আবহাওয়ার পরিস্থিতি (সাধারণভাবে): হাওয়া স্থির এবং আদর্শ থাকলে স্প্রে করুন। ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় স্প্রে করা এড়িয়ে যান।

মাটি এবং জল (যেখানে প্রযোজ্য): শুধুমাত্র পাতায় ব্যবহার করা হবে।

প্রয়োগের কৌশল: হাই ভলিউম স্প্রেয়ার যেমন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে স্প্রে করুন।

প্রয়োগের সময়: বিকেলের সময় প্রয়োগ এড়িয়ে চলুন। প্রয়োগের আদর্শ সময় হল সকাল এবং সন্ধ্যা।

প্রয়োগের জন্য ফসলের পর্যায়: রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ফসলের চারা বৃদ্ধির পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে।

সরঞ্জামের প্রকার: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার।

নজলের প্রকার: ফাঁপা কোণ নজল।

পুনঃপ্রবেশের সময়কাল: ২৪ ঘন্টা।

ফসল কাটার আগে ব্যবধান (দিন): টেবিলে উল্লেখিত।

ফ্রিকোয়েন্সি সহ সর্বাধিক সংখ্যক স্প্রে: রোগের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ২-৩টি স্প্রে করুন।

যে পর্যায়ে কোন ফসলে কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ নয়: ফসলের পরিপক্কতার সময় বা ফসল কাটার ঠিক পূর্বে প্রয়োগ করা যাবে না।

মৌমাছি এবং কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক শত্রুর মতো উপকারী পোকামাকড়ের ক্ষতি এড়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা: দিনের বেলা মৌমাছি এবং অন্যান্য পরাগায়নকারী কীটপতঙ্গের জন্য, ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমাতে ভোরে বা সন্ধ্যায় স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

উদ্দেশ্য: শুধুমাত্র কৃষিজ ব্যবহারের জন্য।

ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি: খালি পাত্রগুলি নষ্ট করে বসতি থেকে দূরে মাটিতে ১/২ মিটার গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে এবং পুনর্ব্যবহার রোধ করার জন্য খোলা জায়গায় ফেলে রাখা যাবে না।

সংরক্ষণের শর্তাবলী: ১. কীটনাশকযুক্ত প্যাকেজগুলি খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্র থেকে দূরে আলাদা ঘরে বা প্রাঙ্গনে আলাদা আলমারিতে তালাবদ্ধ করে শিশু এবং গবাদি পশুর নাগালের বাইরে সংরক্ষণ করতে হবে। ২. সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত ঘরগুলি সুগঠিত, শুকনো, ঠান্ডা, আলোকিত এবং বায়ুচলাচলের উপযুক্ত এবং জলীয় বাষ্পের দূষণ এড়াতে পর্যাপ্ত আয়তনের হতে হবে। ৩. প্যাকেজগুলি এমনভাবে সংরক্ষণ/পরিবহন করতে হবে যাতে খাদ্যদ্রব্য বা পশুখাদ্যের সংস্পর্শে না আসে। দাহ্য হওয়ার কারণে এগুলো স্ফুলিঙ্গ, আগুন এবং খোলা শিখা থেকে দূরে রাখতে হবে।

"খালি পাত্রে পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক।"

রাসায়নিক গঠন: ডিসপারসেন্ট: ইথোক্সিলেটেড পলি অ্যারিল ফেনল ২.৪৩৩% ডব্লু/ডব্লু, ইথানোলামাইন পলিঅ্যাক্রিলেট ০.৩২০% ডব্লু/ডব্লু, পলি অ্যারিল ফেনল ইথার সালফেটের অ্যামোনিয়াম সল্ট ১.০৩৮% ডব্লু/ডব্লু, ইথোক্সিলেটেড ট্রিস্টাইরিল ফেনল ৩.১৬৩% ডব্লু/ডব্লু, কার্বেমডাজিমা. আই. ২৫% ডব্লু/ডব্লু, ফ্লুসিলোজোল. আই. ১২.৫০% ডব্লু/ডব্লু, সারফ্যাক্ট্যান্ট: অক্টাইল ফেনল ইথক্সিলেট ৯.৩৬৭% ডব্লু/ডব্লু, অ্যান্টি ফ্রিজিং এজেন্ট: গ্লাইকল ২.২৬০% ডব্লু/ডব্লু, অ্যান্টি ফোমিং এজেন্ট: সিলিকন অ্যান্টিফোম ইমালসন ০.১৭৭% ডব্লু/ডব্লু, সাসপেনশন এইডস: ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ০.৪৫০% ডব্লু/ডব্লু, পিপিটি. সিলিকা ০.৪৫০% ডব্লু/ডব্লু, অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট: ব্রোমো নাইট্রো প্রোপেন ডায়োল ০.০৯১৩% ডব্লু/ডব্লু, pH(পিএইচ) অ্যাডজাস্টার: পটাসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট ০.০৬০% ডব্লু/ডব্লু, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ০.০১০% ডব্লু/ডব্লু, ঘন: জ্যান্থান গাম ০.০৩৫% ডব্লু/ডব্লু, পাতলা: খাদ্য / ঔষধ/ পরিমাণ/ ডিওনযুক্ত জল কিউএস% ডব্লু/ডব্লু, **মোট: ১০০ ডব্লু/ডব্ল**।

সাবধানতামূলক বিবৃতি: 1. বোতলের গায়ে/পুস্তিকায় নির্দিষ্ট থাকা উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করবেন না। 2. লিফলেটগুলোতে নির্দেশিত ব্যবহারের পরে পাত্রটি ধ্বংস করুন।

Bengali

కార్బెండాజిమ్ 25% + ఫ్లూసిలాజోల్ 12.5% SE
(సిస్టమిక్ ఫంగిసైడ్)

కార్బెండాజిమ్ 25% + ఫ్లూసిలాజోల్ 12.5% SE అనేది సిస్టమిక్ ఫంగిసైడ్. దీనిని వరిలో పాముపొడ, వేరు శనగలో కాండం కుళ్ళు (స్క్లెరోటియం రోల్ఫ్సి), ప్రారంభ ఆకు మచ్చ (సెర్కోస్పోరా అరాచిడికోలా), ఆకు మచ్చ తెగులు (ఫియోసారియోప్సిస్ పెర్సొనాటా); మిర్చిలో బూజు తెగులు (లెవీలులా టౌరికా), కాయ కుళ్ళు (ఆల్టర్నేరియా సోలాని), కొమ్మ కుళ్ళు తెగులు (కొలెటోట్రిచం కాప్సిసి); ఆపిల్‌లో అల్టర్నేరియా బ్లాచ్ (ఆల్టర్నేరియా మాలి) మరియు ముందస్తుగా ఆకులు రాలడం (మార్సోమా కొరోనారియా) నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తారు.

సిఫార్సులు:

పంట(లు)	కీటకాల సాధారణ పేరు	మోతాదు /HA		వాడవలసిన నీటి మోతాదు (లీ)	మునుపటి పిచికారీ మరియు కోత మధ్య వేచి ఉండాల్సిన సమయం (రోజులలో)
		A.I. (%)	ఫార్ములేషన్ (మిలీ)		
ఆపిల్	అల్టర్నేరియా బ్లాచ్ (ఆల్టర్నేరియా మాలి) మరియు ముందస్తుగా ఆకులు రాలడం (మార్స్సోమా కొరోనారియా)	0.03%	0.08%	650-1000	9
మిరప	బూజు తెగులు (లెవీలులా టౌరికా), కాయ కుళ్ళు (ఆల్టర్నేరియా సోలాని), కొమ్మ కుళ్ళు తెగులు (కొలెటోట్రిచం కాప్సిసి)	375	1000	375-500	5
వేరు శెనగ	కాండం కుళ్ళు (స్క్లెరోటియం రోల్ఫ్సీ), ప్రారంభ ఆకు మచ్చ (సెర్కోస్పోరా అరాచిడికోలా), ఆకు మచ్చ తెగులు (ఫియోసారియోప్సిస్ పెర్సొనాటా)	240-300	640-800	500	72
వరి	పాము పొడ తెగులు	300-360	800-960	500	54

ఉపయోగించడానికి సూచన: న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, ఫుడ్ స్ప్రేయర్ మొదలైన అధిక పరిమాణం పిచికారీ పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఫోలియర్ స్ప్రే చేయాలని సిఫార్సు చేయబడుతోంది. సాధారణంగా ఉపయోగించే కీటకనాశిని, శిలీంధ్రనాశిని మరియు ఎరువులతో ఇది అనుకూలతను కలిగి ఉంటుంది.

ఉపయోగించవలసిన సమయం: వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే ఉత్పత్తిని పిచికారీ చేయాలి.

భద్రత ముందు జాగ్రత్తలు: గర్భిణీ స్త్రీలు కార్బెండాజిమ్ ఫార్ములేషన్‌లతో సంపర్కాన్ని నివారించాలి. ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు చేతి తొడుగులు, కళ్ళద్దాలు, ఫేస్ మాస్క్ మరియు రక్షణ దుస్తులను ఉపయోగించాలి. పిచికారీ బిందువులలో పని చేయడాన్ని నివారించాలి.

విషప్రభావ లక్షణాలు: కళ్ళలో పడితే, ప్రారంభంలో కంటిలో చికాకు, అసౌకర్యంతో నీళ్ళు కారడం లేదా మసకగా కనిపించడం ఉండవచ్చు, కంటికి హాని సంభవించవచ్చు.

చర్మానికి తాకితే ప్రారంభంలో చర్మం పై చికాకు, అసౌకర్యం లేదా ర్యాష్ ఉండవచ్చు.

పీల్చితే ప్రారంభంలో ఎగువ శ్వాసకోశ మార్గాలలో చికాకు ఉండవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స చర్యలు: కలుషిత చర్మాన్ని నీరు మరియు సబ్బుతో శుభ్రంగా కడగాలి, కాళ్ళను సుమారు 15 నిమిషాలు శుభ్రం చేయాలి. పీల్చితే ఆ ప్రదేశం నుంచి తాజా గాలిలోకి తరలించాలి. కృత్రిమ శ్వాసను అందించాలి. శిలీంధ్రనాశినిని ఆపరేటర్ లోపలికి తీసుకుంటే, వాంతి వచ్చేలా చేయాలి. వెంటనే వైద్యుడిని పిలవాలి. మింగితే వాంతి వచ్చేలా 1 నుండి 2 గ్లాసుల నీటిని ఇవ్వాలి, అయితే రోగి స్పృహలో లేకపోతే ఇవ్వకూడదు. వైద్యుడిని పిలవాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ: సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో ఇది ఫైటోటాక్సిక్ కాదు.

విషానికి విరుగుడు: మింగితే యాక్టివేటెడ్ చార్‌కోల్ స్లర్రీ సస్పెండ్ 50గ్రా. యాక్టివేటెడ్ చార్‌కోల్ 400 మిలీ నీటిలో ప్లాస్టిక్ బాటిల్‌లో తయారుచేసి బాగా కదపాలి. సగటు వయోజనుడికి 5 మిలీ/కిలో లేదా 350 మిలీ ఇవ్వాలి. లక్షణాల ప్రకారంగా చికిత్స అందించండి.

పురుగుల మందును ఉపయోగించడానికి సంబంధించి మంచి పద్ధతులు:

మోతాదు / ప్రాంతం (హెక్టారుకి): పట్టికలో పేర్కొన్నట్లు.

వాతావరణ స్థితి (సాధారణంగా): గాలి స్థిరంగా మరియు తగిన విధంగా ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి. 30°C కంటే ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయడాన్ని నివారించండి.

మట్టి & నీరు (వర్తించిన చోట): ఫోలియర్ అప్లికేషన్గా మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది.

ఉపయోగించడానికి పద్ధతులు: అధిక వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్ అంటే న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్ ఉపయోగించి పిచికారీ చేయాలి.

పిచికారీ సమయం: మధ్యాహ్న సమయాలలో ఉపయోగించడం నివారించాలి. ఉపయోగించినడానికి సరైన సమయం ఉదయం మరియు సాయంత్రం వేళలు.

ఉపయోగించవలసిన పంట దశ: పంట ఏపుగా ఎదుగుతున్న దశలో వ్యాధి కనిపించిన వెంటనే ఉపయోగించాలి.

సామగ్రి రకం: న్యాప్సాక్ స్ప్రేయర్.

నాజిల్ రకం: హాలో కోన్ నాజిల్.

పునఃప్రవేశించే సమయం: 24 గంటలు.

కోత ముందు అంతరం (రోజులలో): పట్టికలో పేర్కొన్నట్లు.

గరిష్ఠ స్ప్రేల సంఖ్యతో సహా తరచుదనం: చీడ పట్టినదానిని బట్టి 2 నుండి 3 పిచికారీలు చేయాలి.

ఏదైనా పంట పై కీటకనాశినులను ఉపయోగించకూడని దశలు: పంట పరిపక్వ దశ లేదా కోతకి కొద్దిగా ముందు.

తేనెటీగలు వంటి ప్రయోజనకర కీటకాలు మరియు తెగుళ్ళకు సహజ శత్రువులకు హానిని నివారించడానికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు: తేనెటీగలు మరియు ఇతర పోలినేటర్‌లు పగటి సమయం ఆహారం కోసం వెతుకుతాయి కాబట్టి, అవి రసాయనాలకి బహిర్గతం అయ్యే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం తరువాత పిచికారీ చేయాలని సిఫార్సు చేయబడుతుంది.

ప్రయోజనం: వ్యవసాయ సంబంధం వినియోగానికి మాత్రమే.

ఉపయోగించిన పాత్రను పారవేయడం: వీటిని తిరిగి ఉపయోగించడాన్ని నివారించడానికి, ఖాళీ పాత్రలను నాశనం చేయాలి మరియు 1/2 మీటర్ లోతు నేలలో నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతి పెట్టాలి.

నిల్వచేయటానికి నియమాలు: 1. కీటకనాశినులను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలను పిల్లలు మరియు పశువులకు దూరంగా విడి గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఆహార పదార్థాలు మరియు ఇతర వస్తువులకు దూరంగా, తాళం ఉన్న విడి అల్మరాలలో, అసలైన పాత్రలలో స్టోర్ చేయాలి. 2. నిల్వ చేయడం కోసం ఉద్దేశించిన గదులు చల్లగా, పొడిగా, చక్కని గాలి, వెలుతురుతో, ధృడంగా, తగిన కొలతలతో ఉండాలి, తద్వారా నీటి ఆవిరి వలన కలిగే కాలుష్యాన్ని నివారించవచ్చు. 3. ప్యాకేజీలను ఆహార పదార్థాలు లేదా పశువుల దాణాను తాకని విధంగా నిల్వ/రవాణా చేయాలి. ఇవి తేలికగా మండుతాయి కాబట్టి నిప్పు రవ్వలు మరియు మంటల నుండి దూరంగా ఉంచాలి.

ఖాళీ పాత్రలను తిరిగి ఉపయోగించడం హానికరం.

రసాయన మిశ్రమం: డిస్పర్సంట్స్: ఎథాక్సిలేటెడ్ పోలీ ఎరిల్ ఫినాల్ – 2.433% w/w, ఎథనోలమైన్ పోలీ అక్రిలేట్ – 0.320% w/w, పోలీ ఎరిల్ ఫినాల్ ఈథర్ సల్ఫేట్ అమోనియం సాల్ట్ – 1.038% w/w, ఎథాక్సిలేటెడ్ ట్రైస్టైరిల్ ఫినాల్ – 3.163% w/w, కార్బెండాజిమ్ a.i. – 25.00% w/w, ఫ్లూసిలాజోల్ a.i. – 12.50% w/w, సర్ఫక్టంట్స్: ఆక్టిల్ ఫినాల్ ఎథాక్సిలేట్ – 9.367% w/w, యాంటీ ఫ్రీజింగ్ ఏజెంట్: గ్లైకాల్ 2.260% w/w, యాంటీ ఫోమింగ్ ఏజెంట్: సిలికాన్ యాంటీఫోమ్ ఎమల్షన్ 0.177% w/w, సస్పెన్షన్ సహాయకాలు: మాగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికేట్ – 0.450% w/w, పిపిటి. సిలికా – 0.450% w/w, యాంటీ మైక్రోబియల్ ఏజెంట్: బ్రోమో నైట్రో ప్రొపేన్ డయాల్ – 0.0913% w/w, pH అడ్జస్టర్లు: పొటాషియం డైహైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ – 0.060% w/w, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ – 0.010% w/w, థికెనర్: జాంతన్ గమ్ – 0.035% w/w, ద్రావకం: ఆహార /ఫార్మాస్యూటికల్ / పరిమాణం /అయాన్ రహిత నీరు QS% w/w, **మొత్తం: 100% w/w.**

హెచ్చరిక ప్రకటన: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రం పై పేర్కొన్న ప్రయోజనాలకు మినహా ఇతరములకు ఉపయోగించకూడదు. 2. కరపత్రంలో నిర్దేశించినట్లు ఉపయోగించిన తరువాత పాత్రను నాశనం చేయాలి.

Telugu

کاربنڈازیم 25% + فلوسیلازول 12.5% ایس ای
(نظامی فطرکش دوا)

کاربنڈازیم 25% + فلوسیلازول 12.5% ایس سی ایک نظامی فطر کش ہے جو دھان میں خول کے مرجھانے کی بیماری ، مونگ پھلی میں تنے کے سڑنے (سکلیروٹیم رولفسی)، ابتدائی پتوں کے دھبّے (سرکوسپورا آراچیڈیکولا)، دیری سے پتوں کے دھبّے (فیوساریوپسس پرسوناٹا)؛ مرچ میں سفوف نما پھپھوندی (لیولولا توریکا)، پھلوں کی سڑنے (الٹرنیریا سولانی)، ڈائی بیک (کولیٹوتریچم کیپسی)؛ سیب میں الٹرنیریا دھبّے (الٹرنیریا مالی) اور قبل از وقت پتوں کے گرنے (مارسوما کورونریا) بیماری کے کنٹرول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

تجاویز:

فصل (فصلیں)	بیماریوں کے عمومی نام	مقدار/ہیکٹر		پانی میں تحلیل (لیٹر)	آخری اسپرے سے فصل کی کٹائی تک کا انتظار کا دورانیہ (دنوں میں)
		فعال جزو (گرام)	تشکیل (ملی لیٹر)		
سیب	الٹرنیریا دھبّہ (الٹرنیریا مالی) اور قبل از وقت پتوں کا گرنا (مارسوما کورونریا)	0.03%	0.08%	650-1000	9
مرچ	سفوف نما پھپھوندی (لیویلولا توریکا) پھلوں کا سڑنا (الٹرنیریا سولانی) ڈائی بیک (کولیٹوتریچم کیپسی)	375	1000	375-500	5
مونگ پھلی	تنے کا سڑنا (سکلیروٹیم رولفسی) ابتدائی پتوں کا دھبہ (سرکوسپورا اراچیڈیکولا) دیری سے پتوں کا دھبہ (فیوساریوپسس پرسوناٹا)	240-300	640-800	500	72
دھان	خول کے مرجھانے کی بیماری	300-360	800-960	500	54

استعمال کی ہدایات: اسے پتّوں پر چھڑکاؤ کے لیے استعمال کی سفارش کی جاتی ہے جس میں زیادہ مقدار میں چھڑکاؤ والے آلے کا استعمال کیا جانا چاہیے جیسے پیٹھ پر لاد کر چھڑکاؤ کرنے کی مشین، راکنگ چھڑکاؤ مشین، پیروں والی چھڑکاؤ کی مشین وغیرہ۔ یہ دوا عام طور پر استعمال ہونے والی کیڑے مار ادویات، فطرکش ادویات اور کھادوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔

استعمال کا وقت: بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر پروڈکٹ کا فوری طور پر چھڑکاؤ کیا جانا چاہیے۔

حفاظتی احتیاطی تدابیر: حاملہ خواتین کو کاربنڈازیم فارمولیشن کے ساتھ رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ استعمال کے دوران دستانے، چشمے، چہرے کے ماسک اور حفاظتی لباس کا استعمال کریں اور اسپرے کے دھند میں کام کرنے سے بچیں۔

زہر آلودگی کی علامات: آنکھ کے رابطے میں ابتدائی طور پر آنکھوں میں جلن شامل ہو سکتی ہے جس میں تکلیف ہونا، آنسو آنا یا بصارت کا دھندلا ہونا آنکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جلد کے رابطے میں ابتدائی طور پر تکلیف یا خارش کے ساتھ جلد کی جلن شامل ہو سکتی ہے۔ سانس لینے میں ابتدائی طور پر اوپری سانس کے راستے کی جلن شامل ہو سکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد کے اقدامات: آلودہ جلد کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور آنکھ کو تقریباً 15 منٹ تک دھوئیں۔ اگر سانس کے ذریعہ اندر گیا ہو تو مریض کو وہاں سے نکال کر تازہ ہوا میں لے جائیں۔ مصنوعی سانس دیں۔ اگر آپریٹر نے فطرکش دوا کو کھا لیا ہے تو الٹی کرائیں۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو کال کریں۔ اگر نگل لیا جائے تو 1 سے 2 گلاس دیں اور الٹی کرائیں لیکن اس وقت نہیں جب مریض بے ہوش ہو۔ ڈاکٹر کو کال کریں۔

نباتی سمیّت: تجویز کردہ مقدار میں یہ پودوں کے لیے مضر نہیں ہے۔

تریاق: اگر نگل لیا گیا ہو تو فعال چارکول گھول تیار کریں 50 گرام فعال چارکول 400 ملی لیٹر پانی پلاسٹک کی بوتل میں ڈال کر اچھی طرح ہلائیں۔ ایک اوسط بالغ کو 5 ملی لیٹر/کلوگرام یا 350 ملی لیٹر دیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔ کیڑے مار دوا کے استعمال کی تکنیکوں سے متعلق اچھے طریقے:

مقدار/رقبہ (فی ہیکٹر): جیسا کہ ٹیبل میں بیان کیا گیا ہے۔

موسم کی حالت (عام طور پر): جب ہوا مستحکم اور مثالی ہو اس وقت چھڑکاؤ کریں۔ 30 ڈگری سیلسس سے زیادہ درجہ حرارت میں چھڑکاؤ کرنے سے گریز کریں۔

مٹی اور پانی (جہاں بھی قابل اطلاق ہو): صرف پتوں پر چھڑکاؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

استعمال کی تکنیک: زیادہ مقدار والی چھڑکاؤ کرنے کی مشین کا استعمال کرتے ہوئے چھڑکاؤ کریں جیسے پیٹھ پر لاد کر چھڑکاؤ کرنے کی مشین۔

استعمال کے اوقات: دوپہر کے اوقات میں استعمال کرنے سے گریز کریں۔ استعمال کرنے کا بہترین وقت صبح اور شام کے اوقات ہیں۔

فصل کے لیے چھڑکاؤ کا مرحلہ: چھڑکاؤ فصل کی ابتدائی نشوونما کے مرحلے پر کیا جانا چاہیے جیسے ہی بیماری ظاہر ہو۔

آلات کی قسم: نیپسیک اسپریئر۔

نوزل کی قسم: کھوکھلے شنک والی نوزل

دوبارہ داخلے کا وقت: 24 گھنٹے۔

کٹائی سے پہلے کا وقفہ (دن): جیسا کہ ٹیبل میں بیان کیا گیا ہے۔

تعد بشمول زیادہ سے زیادہ چھڑکاؤ کی تعداد: بیماری کی شدت کے مطابق 2 سے 3 بار چھڑکاؤ کریں۔

وہ مراحل جن کے دوران کسی بھی فصل پر کیڑے مار ادویات کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے: فصل کے پکنے کے دوران اور فصل کی کٹائی سے بالکل پہلے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔

فائدہ مند کیڑوں جیسے شہد کی مکھیوں اور کیڑوں کے قدرتی دشمنوں کو نقصان سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر: چونکہ شہد کی مکھیاں اور دیگر زرگل مُنتقِل کرنے والے دن میں چارہ تلاش کرتے ہیں، اس لیے صبح سویرے یا دیر شام کے وقت چھڑکاؤ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ ان کے زد میں آنے کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔

مقصد: صرف زرعی استعمال کے لیے۔

استعمال شدہ کنٹینرز کی تلفی: خالی کنٹینرز کو مسخ کر کے رہائش سے دور مٹی میں 2/1 میٹر گہرائی میں دفن کر دینا چاہیے اور اسے دوبارہ استعمال سے روکنے کے لیے کھلے میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط: 1. کیڑے مار دوا پر مشتمل پیکیج کو علیحدہ کمرے یا احاطے میں کھانے کی اشیاء اور دیگر اشیاء سے دور الگ الماری میں تالا اور چابی لگا کر بچوں اور مویشیوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے۔ 2. ذخیرہ اندوزی کے کمرے اچھی بناوٹ کے، خشک، ٹھنڈے، اچھی طرح سے روشن اور ہوادار اور پانی کے بخارات کی آلودگی سے بچنے کے لیے معقول طول وعرض کے ہونے چاہئیں۔ 3. پیکٹوں کو اس طرح سے ذخیرہ/ٹرانسپورٹ کیا جائے گا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں یا جانوروں کے چاروں کے ساتھ رابطے میں نہ آئیں۔ آتش گیر ہونے کی وجہ سے، ان کو چنگاریوں، آگ اور کھلے شعلوں سے دور رکھا جانا چاہیے۔

"خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہوتا ہے۔"

کیمیائی ترکیب: منتشر کرنے والے عامل: ایتھوکسیلیٹڈ پولی ایرل فینول 2.433% وزن/وزن، ایتھانولامین پولی کریلیٹ 0.320% وزن/وزن، پولی ایرل فینول ایتھر سلفیٹ کا امونیم نمک 1.038% وزن/وزن، ایتھوکسیلیٹڈ ٹریسٹیریل فینول 3.163% وزن/وزن، کاربنڈازیم فعال جزو 25.00% وزن/وزن، فلوسیلازول فعال جزو 12.50% وزن/وزن، سرفیکٹنٹ: اوکٹائل فینول ایتھوکسیلیٹ 9.367% وزن/وزن، اینٹی فریزنگ ایجنٹ: گلائکول 2.260% وزن/وزن، اینٹی فومنگ ایجنٹ: سلیکان اینٹی فوم ایملشن 0.177% وزن/وزن، سسپینشن ایڈز: میگنیشیم ایلومینیم سلیکیٹ 0.450% وزن/وزن، پی پی ٹی۔ سلیکا 0.450% وزن/وزن، اینٹی مائیکروبیل ایجنٹ: برومو نائٹرو پروپین ڈائیول 0.0913% وزن/وزن، پی ایچ ایڈجسٹرز: پوٹاشیم ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ 0.060% وزن/وزن، سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ 0.010% وزن/وزن، گاڑھا کرنے کا مادہ: زانتھن گم 0.035% وزن/وزن، محلل: خوراک/دواسازی/مقدار/ ڈیونڈ واٹر کیو ایس % وزن/وزن، **کل: 100% وزن/وزن۔**

احتیاطی بیان: 1. لیبل اور کتابچہ میں بیان کردہ مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ 2. کتابچہ میں دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کے بعد کنٹینرز کو تلف کر دیں۔

Urdu

445.00 mm

Size : 445 mm X 320 mm

Date : 11.12.2025