એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 18.2% ભા/ભા + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% ભા/ભા એસ.સી.

(અંતઃપ્રવાહી ફૂગનાશક)

એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 18.2% ભા/ભા + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% ભા/ભા એસ.સી. એક બહુઉપયોગી ફૂગનાશક છે જેમાં મુખ્ય રોગજનકોના નિયંત્રણ માટે અંતઃપ્રવાહી ક્રિયાશીલતા છે. તેની ભલામણ મરચાંમાં રૂક્ષ રોગ તેમજ ચૂર્ણ ફૂગ રોગ, ટમેટા પાકમાં અગ્રેત અંગમારી રોગ તેમજ વિલંબિત અંગમારી રોગ, ધાનમાં સહસમારી રોગ તેમજ પર્ણછદ અંગમારી, મકાઈમાં અંગમારી રોગ તેમજ મૃદુ રોમિલ ફૂગ અને ઘઉંમાં રતુઆ રોગ તેમજ ચૂર્ણ ફૂગ રોગના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે. સાવધાનઃ- ૧. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ તે સ્થળોએ પ્રતિબંધિત છે જ્યાં માછલી પાલન અથવા ધાનની ખેતી સાથે માછલી પાલન કરવામાં આવે છે. ૨. આ કીટનાશક મિશ્રણ માછલીઓ તેમજ અન્ય જલીય જીવ માટે ઝેરી છે અટલે તેનો ઉપયોગ મત્સ્યપાલનમાં અથવા તેની નજીક કરવો નહીં. ૩. પ્રતિકાર શક્તિ વિકસિત ન થાય તે માટે આ કીટનાશક મિશ્રણનો મંજૂર પાકોમાં વારંવાર ઉપયોગ (છંટકાવ) ન કરવો.

ભલામણ

		માત્રા/હેક્ટર				
પાક(ઓ)	જીવાત/રોગનું સામાન્ય નામ	એ.આઈ. (% સં. અથવા મી.લી./લી.)	ફોર્મ્યુલેશન	પાણીમાં દ્રાવણ (લિટર/હેક્ટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધી રાહ સમય (દિવસ)	દરેક ઉપયોગ પછી પુનઃપ્રવેશ (કલાકમાં)
મરચાં	એન્થ્રાક્નોઝ અને પાવડરી મિલ્ડ્યુ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	500	5	
કપાસ	લીફ સ્પોટ અને ગ્રે મિલ્ડ્યુ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	500	12	-
મકાઈ	બ્લાઈટ અને ડાઉની મિલ્ડ્યુ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	500	26	
ડુંગળી	પર્પલ બ્લોચ, સ્ટેમ્ફિલિયમ બ્લાઈટ અને ડાઉની મિલ્ડ્યુ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	500	7	-
ધાન	બ્લાસ્ટ અને શીથ બ્લાઈટ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	500	31	
શેરડી	રેડ રોટ, સ્મટ અને રસ્ટ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	400	265	-
ટામેટા	અર્લી બ્લાઈટ અને લેટ બ્લાઈટ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	500	5	
હળદર	લીફ બ્લોચ, લીફ સ્પોટ અને રાઇઝોમ રોટ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	500	60	-
ઘઉં	રસ્ટ અને પાવડરી મિલ્ડ્યુ	0.03% અથવા 0.3 g/l	0.1% અથવા 1 મી.લી./લીટર પાણી	500	35	

ઉપયોગ માટે માર્ગદર્શન
હવામાનઃ વરસાદ તેમજ તેજ પવન દરમિયાન છંટકાવ ન કરવો. માટી- માટીમાં જ્યારે પૂરતી ભેજ હોય ત્યારે જ છંટકાવ કરવો પાકની અવસ્થા, ઉપયોગની રીત તેમજ સમય, સાધનો, નોઝલનો પ્રકાર, છંટકાવ તેમજ દ્રાવણ તૈયાર કરવા સંબંધિત સૂચનાઓ- ઉત્પાદનની યોગ્ય માત્રા લો અને તેને થોડા પાણી સાથે સારી રીતે મિશ્રિત કરો. નિર્ધારિત માત્રાને બાકીના પાણીમાં સારી રીતે હલાવી મિશ્રિત કરો તેમજ હોલો કોન અથવા અન્ય યોગ્ય નોઝલનો ઉપયોગ કરીને નેપસેક સ્પ્રેયર અથવા અન્ય યોગ્ય સ્પ્રેયરથી સમગ્ર પાક પર 1-2 છંટકાવ (રોગની તીવ્રતા મુજબ છંટકાવ ફરી કરો) યોગ્ય સમયે કરો જ્યારે ઉપર મુજબ પ્રકોપ થયો હોય. પુનઃ પ્રવેશઃ છંટકાવની બુંદો પાક પર સૂકાઈ જાય તે પહેલાં ખેતરમાં પ્રવેશ ન કરવો છંટકાવ પછી ખાલી થયેલા ડબ્બાઓનો ફરી ઉપયોગ કરવો જોખમી થઈ શકે છે. ઉપયોગ થયેલા પેકનો ફરી ઉપયોગ ટાળવા માટે ઉપયોગ થયેલા ડબ્બાઓને ફરી બહાર ખાલી ન મૂકવા

ઉપયોગનો સમયઃ સીઆઈબી માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો

ઉપયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતી
ઉપયોગ પછી પ્રદૂષિત કપડાં તેમજ શરીરના અંગો સારી રીતે ધોવો. ઉપયોગ કરતી વખતે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો (હાથમોજાં, મોઢાનો માસ્ક, ચશ્મા, બૂટ વગેરે). શ્વાસ દ્વારા અંદર જવાથી બચો, ઉપયોગ દરમિયાન ધુમ્રપાન, ખાવું, પીવું અને ચાવવું ન જોઈએ. સ્પ્રે દ્રાવણ તૈયાર કરવા માટે રસોઈના વાસણોનો ઉપયોગ ન કરવો. સ્પ્રે દ્રાવણ હલાવવા માટે લાકડાની કાંડીનો ઉપયોગ કરો. કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી હાથોને સાબુ અને પૂરતા પાણીથી ધોવો. દ્રાવણ તૈયાર કરતી વખતે અને છંટકાવ કરતી વખતે, ત્વચા, આંખો અને કપડાંને ફૂગનાશકના સંપર્કથી બચાવો. સાન્દ્ર પદાર્થ અથવા છંટકાવ મિશ્રણથી પ્રદૂષિત થાય તો ત્વચાને તરત સારી રીતે ધોવો તેમજ આંખોને પૂરતા પાણીથી 15 મિનિટ સુધી ધોવો. ઉપયોગ પછી સુરક્ષા સાધનોને સારી રીતે સાફ કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને ફરી ઉપયોગ કરતા પહેલાં ધોવો. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ તે સ્થળોએ પ્રતિબંધિત છે જ્યાં માછલી પાલન અથવા ધાનની ખેતી સાથે પાક પાલન કરવામાં આવે છે. માછલીઓ માટે ઝેરી છે.
ચેતવણીઃ 1. લેબલ અને પત્રકમાં ઉલ્લેખ ન હોય તેવી સ્થિતિમાં તેનો ઉપયોગ પાક અને જીવાત પર ન કરવો.
2. પાકની કાપણી પછી તેનો ઉપયોગ ન કરવો.
3. પત્રકમાં આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ મુજબ ઉપયોગ થયેલા કન્ટેનર (ડબ્બાઓ)નો નાશ કરો.

ઝેરના લક્ષણો
ઝેરની અસરના લક્ષણો જેમ કે ક્રિયાશીલતા ઓછી થવી, આંખની પુપિલનો વિસ્તાર વધવો, પગનો પ્રતિસાદ ઘટાડો, ઓછો પ્રતિભાવ આપતો રિફ્લેક્સ, લાંબા શ્વાસ લેવો તેમજ શ્વાસની ગતિ ધીમી થવી જેવી થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
ત્વચા સંપર્કઃ પ્રદૂષિત કપડાં ઉતારી નાખો તેમજ શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવો.
શ્વસનઃ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને પ્રદૂષિત સ્થળથી હવાના વહનવાળી રૂમમાં અથવા ખુલ્લી જગ્યાએ લઈ જાઓ અને તાપમાનથી બચાવો.
જો ફૂગનાશક ઝેરની શંકા હોય તોઃ તાત્કાલિક તબીબી સલાહ લો.
આંખ સંપર્કઃ પાંપણોને અલગ કરીને આંખોને તરત સ્વચ્છ પ્રવાહ અથવા સ્વચ્છ પાણીથી સારી રીતે ધોવો તેમજ તરત તબીબી સલાહ લો.
ગળી જાય તોઃ પૂરતા પાણી સાથે સતત તબીબી ચારકોલ આપો. વધુ પ્રમાણમાં સાન્દ્ર પદાર્થ ગળી જાય તો તબીબી સલાહ લો. નોંધઃ દર્દી બેભાન હોય તો મોઢેથી કશું આપશો નહીં. ઉલ્ટી કરાવવાનો પ્રયાસ ન કરવો.

ફાઈટોટોક્સિસિટી : સીઆઈબી માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો

વિષનાશક
કોઈ વિશેષ પ્રતિઝેર ઉપલબ્ધ નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ
(1) છંટકાવ પછી ખાલી થયેલા ડબ્બાઓનો ફરી ઉપયોગ કરવો જોખમી થઈ શકે છે તેથી પર્યાવરણના પ્રદૂષણને અટકાવવા માટે ડબ્બાઓ, બાકી રહેલું દ્રાવણ/પદાર્થ, યંત્રોની ધુલાઈ અને ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ સુરક્ષિત સ્થળે કરો.
(2) ઉપયોગ થયેલા ડબ્બાઓ/પેકેટોને એમ જ બહાર ન છોડવા જોઈએ. તેથી તેમનો ફરી ઉપયોગ અટકાવી શકાય છે.
(3) પેકેટો/ડબ્બાઓને તોડી મરડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં દફનાવી દેવા જોઈએ.

સંગ્રહની શરતો
(1) ફૂગનાશકના ડબ્બાઓને અન્ય સામગ્રી ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રૂમ અથવા ઇમારતોથી દૂર રૂમોમાં અથવા ઇમારતોમાં અથવા અલગથી તાળાબંધ કબાટોમાં રાખવા જોઈએ.
(2) ફૂગનાશકના સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રૂમ અથવા ઇમારતો મજબૂત, સૂકા, પ્રકાશિત અને હવાદાર હોવા જોઈએ જેથી વરાળથી પ્રદૂષણ ન થાય

રાસાયણિક રચના:

એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન એ.આઈ.		18.20% ભાર/ભાર
ડિફેનોકોનાઝોલ એ.આઇ.		11.40% ભાર/ભાર
(ડિસ્પર્સંટ)		%
નેપ્થાલેનેસલ્ફોનિક એસિડ, સોડિયમ મીઠું ફોર્મલ્ડેહાઇડ		1.22% ભાર/ભાર
બ્લોકોપોલીમર પીઓ/ઈઓ		1.13% ભાર/ભાર
એંટીફોમિંગ એજન્ટ		%
પોલીડાઇમીથાઈલ્સિલોક્ષાઇન		0.79% ભાર/ભાર
(થિકનર)		%
(જાડા) રેખીય પોલીસેકરાઇડ		0.25% ભાર/ભાર
(પ્રિઝર્વેટિવ)		%
1, 2-બેંઝાઇસોથીયાઝોલ 3(2એચ)-એક		0.03% ભાર/ભાર
ભેજવાળી		%
સીટીએલ/સ્ટેરીલ-આલ્કોહોલ એસોસિયલેટેડ		20.70% ભાર/ભાર
પાણી		જરૂરી માત્રા%
કુલ		**100.00 ભાર/ભાર**

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

एझॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% भा/भा + डायफेनोकोनाझोल 11.4% भा/भा एस.सी.

(अंत:प्रवाही बुरशीनाशक)

एझॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% भा/भा + डायफेनोकोनाझोल 11.4% भा/भा एस.सी. हे एक बहुपयोगी बुरशीनाशक आहे ज्यामध्ये मुख्य रोगजनकांच्या नियंत्रणासाठी अंत:प्रवाही क्रियाशीलता आहे. याची शिफारस मिरचीमध्ये रुक्ष रोग तसेच चूर्ण बुरशी रोग, टोमॅटो पिकामध्ये अगेती अंगमारी रोग तसेच विलंबित अंगमारी रोग, भातामध्ये सहसमारी रोग तसेच पर्णच्छद अंगमारी, मका मध्ये अंगमारी रोग तसेच मृदू रोमिल बुरशी आणि गव्हामध्ये रतुआ रोग तसेच चूर्ण बुरशी रोग नियंत्रणासाठी केली जाते. सावधान:- 1. या उत्पादनाचा वापर त्या ठिकाणी वर्जित आहे जिथे मासे पालन किंवा भात शेतीसोबत मासे पालन केले जाते. 2. हे कीटनाशक मिश्रण मासे तसेच इतर जलीय जीवांसाठी विषारी आहे म्हणून याचा मत्स्यपालनामध्ये किंवा त्याच्या जवळ वापर करू नये. 3. प्रतिरोधक विकसित होऊ नये म्हणून या कीटनाशक मिश्रणाचा अनुमोदित पिकांवर वारंवार वापर (फवारणी) करू नये।

उपयोग

			मात्रा/हेक्टर			
पिके	किड/रोगाचे सामान्य नाव	ए.आय. (% सं. किंवा मि.ली./ली.)	फॉर्म्युलेशन	पाण्यात विरघळण्याचे प्रमाण (लिटर/हेक्टरी)	शेवटच्या फवारणीनंतर कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुनःप्रवेश (तासांमध्ये)
मिरची	ॲंथ्रॅक्नोज व पावडरी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	500	5	
कापूस	लीफ स्पॉट व ग्रे मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	500	12	-
मका	ब्लाइट व डाउनी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	500	26	
कांदा	पर्पल ब्लॉच, स्टेमफिलियम ब्लाइट व डाउनी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	500	7	-
भात	ब्लास्ट व शीथ ब्लाइट	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	500	31	
ऊस	रेड रॉट, स्मट व रस्ट	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	400	265	-
टोमॅटो	अर्ली ब्लाइट व लेट ब्लाइट	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	500	5	
हळद	लीफ ब्लॉच, लीफ स्पॉट व रायझोम रॉट	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	500	60	-
गहू	रस्ट व पावडरी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 g/l	0.1% किंवा 1 मि.ली./लिटर पाणी	500	35	

वापरासाठी दिशा-निर्देश
हवामान: पाऊस तसेच जोरदार वारा असताना फवारणी करू नये. माती- मातीमध्ये जेव्हा पुरेशी आर्द्रता असेल तेव्हाच फवारणी करा। पिकाची अवस्था, वापराची पद्धत तसेच वेळ, उपकरणे, नोजलचा प्रकार, फवारणी तसेच द्रावण तयार करण्यासंबंधी सूचना- उत्पादनाची योग्य मात्रा घ्या आणि ती थोड्या पाण्यासोबत चांगली मिसळा। निर्दिष्ट मात्रा उरलेल्या पाण्यात चांगली ढवळून मिसळा तसेच हॉलो कोन किंवा इतर योग्य नोजलचा वापर करून नॅपसॅक स्प्रेअर किंवा इतर योग्य स्प्रेअरने संपूर्ण पिकावर 1-2 फवारण्या (रोगाच्या तीव्रतेनुसार फवारणी पुन्हा करा) योग्य वेळी करा जेव्हा वरीलप्रमाणे प्रादुर्भाव झाला असेल. पुन: प्रवेश: फवारणीचे थेंब पिकावर सुकण्यापूर्वी शेतात प्रवेश करू नका। फवारणीनंतर रिकामे झालेले डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक ठरू शकते. वापरलेले पॅक पुन्हा वापर टाळण्यासाठी वापरलेले डबे पुन्हा बाहेर रिकामे सोडू नका।
वापराची वेळ: सीआयबी दिशा-निर्देशांचा संदर्भ घ्या.

वापरकर्त्यांसाठी सावधानता
वापरानंतर दूषित कपडे तसेच शरीराचे अवयव नीट धुवा। वापर करताना संरक्षणात्मक कपडे परिधान करा (हातमोजे, तोंडाचा मास्क, चष्मा, बूट इ.). श्वासावाटे आत जाणे टाळा, वापर करताना धूम्रपान, खाणे, पिणे आणि चघळणे करू नये. स्प्रे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाच्या भांड्यांचा वापर करू नका। स्प्रे द्रावण ढवळण्यासाठी लाकडी काठीचा वापर करा। काम पूर्ण झाल्यानंतर हात साबणाने आणि भरपूर पाण्याने धुवा। द्रावण तयार करताना आणि फवारणी करताना, त्वचा, डोळे आणि कपडे यांना बुरशीनाशकाच्या संपर्कापासून वाचवा। सान्द्र पदार्थ किंवा फवारणी मिश्रणामुळे दूषित झाल्यास त्वचा त्वरित चांगली धुवा तसेच डोळे पुरेशा पाण्याने 15 मिनिटे धुवा। वापरानंतर संरक्षणात्मक उपकरणे नीट स्वच्छ करा। दूषित कपडे पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा। या उत्पादनाचा वापर त्या ठिकाणी वर्जित आहे जिथे मासे पालन किंवा भात शेतीसोबत पीक पालन केले जाते। माशांसाठी विषारी आहे।
चेतावणी: 1. लेबल आणि पत्रकावर नमूद नसलेल्या पिकांवर आणि कीटकांवर याचा वापर करू नका।
2. पिकाची कापणी झाल्यानंतर याचा वापर करू नका।
3. पत्रकावर दिलेल्या सूचनांनुसार वापर केलेल्या कंटेनर (डबे) नष्ट करा।

विषाची लक्षणे
विषबाधेची लक्षणे जसे क्रियाशीलता कमी होणे, डोळ्यांची बुबुळे मोठी होणे, पायांचा प्रत्याहार, कमी प्रतिसाद देणारा रिफ्लेक्स, लांब श्वास घेणे व श्वासोच्छ्वासाची गती मंदावणे अशी असू शकतात।

प्राथमिक उपचार
त्वचा संपर्क: दूषित कपडे काढून टाका तसेच शरीराचे प्रभावित भाग साबण आणि पाण्याने चांगले धुवा।
श्वसन: प्रभावित व्यक्तीला दूषित ठिकाणाहून हवेशीर खोलीत किंवा मोकळ्या जागेत घेऊन जा आणि तापमानापासून वाचवा।
विषबाधेचा संशय असल्यास: त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या।
डोळा संपर्क: पापण्या वेगळ्या करून डोळे त्वरित स्वच्छ द्रव किंवा स्वच्छ पाण्याने नीट धुवा तसेच त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या।
गिळल्यास: पुरेशा पाण्यासोबत सतत वैद्यकीय चारकोल द्या। अधिक प्रमाणात सान्द्र पदार्थ गिळल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या। सूचना: रुग्ण बेशुद्ध असल्यास तोंडावाटे काहीही देऊ नका। उलटी करण्याचा प्रयत्न करू नका।

फोटोटॉक्सिसिटी: सीआयबी दिशा-निर्देशांचा संदर्भ घ्या

विषनाशक
कोणताही विशिष्ट प्रतिविष उपलब्ध नाही। लक्षणांनुसार उपचार करा।

रिकाम्या डब्यांचा निपटारा
(1) फवारणीनंतर रिकामे झालेले डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक ठरू शकते त्यामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळण्यासाठी डबे, उरलेले द्रावण/पदार्थ, यंत्रांची धुलाई आणि रिकाम्या डब्यांचा निपटारा सुरक्षित ठिकाणी करा।
(2) वापरलेले डबे/पॅकेट्स तसेच बाहेर टाकू नयेत। त्यामुळे त्यांचा पुन्हा वापर टाळता येईल।
(3) पॅकेट्स/डबे मोडून वाकवून लोकवस्तीपासून दूर जमिनीत गाडून टाका।

साठवणुकीच्या अटी
(1) बुरशीनाशकाचे डबे इतर वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर खोल्यांमध्ये किंवा इमारतींमध्ये किंवा स्वतंत्र कुलूपबंद कपाटांमध्ये ठेवावेत।
(2) बुरशीनाशक साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा इमारती मजबूत, कोरड्या, प्रकाशयुक्त आणि हवेशीर असाव्यात जेणेकरून वाफेमुळे प्रदूषण होऊ नये।

रासायनिक रचना:

एझोक्सिस्ट्रोबिन स.त.	18.20% भार / भार
डिफेनोकोनाझोल	11.40% भार / भार
(डिस्परसंट)	%
नेफ्थालीनस्लफोनिक एसिड,	1.22% भार / भार
सोडियम सॉल्ट कंडेनसेटेड विथ फॉरमलडिहाइड	%
ब्लॉकोपॉलिमर पीओ / इओ	1.13% भार / भार
(एन्टीफोमिंग एजंट)	%
पॉलिडायमिथाइल सिलोक्झेन	0.79% भार / भार
(थिकनर)	%
लिनीयर पॉलिसेक्चरा इड	0.25% भार / भार
(प्रीझरवेटीव)	%
1,2,बेन्झीसोथियाझोल –3 (2 एच)–वन	0.03% भार / भार
वेटर	%
सिटाइल / स्टीराइल–अल्कोहोल इथोक्झीलेटेड	20.70% भार / भार
पाणी	Q.S %
एकूण	**100.00% भार / भार**

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

ਐਜ਼ੋਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 18.2% ਭਾ/ਭਾ + ਡਾਇਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 11.4% ਭਾ/ਭਾ ਐਸ.ਸੀ.

(ਅੰਤਹ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ)

ਐਜ਼ੋਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 18.2% ਭਾ/ਭਾ + ਡਾਇਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 11.4% ਭਾ/ਭਾ ਐਸ.ਸੀ. ਇੱਕ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਗਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਅੰਤਹ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਰੋਗ ਅਤੇ ਚੂਰਨ ਫਫੂੰਦੀ ਰੋਗ, ਟਮਾਟਰ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਗਮਾਰੀ ਰੋਗ, ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਸਮਾਰੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਮਾਰੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਨਰਮ ਰੋਮਿਲ ਫਫੂੰਦੀ ਅਤੇ ਗੇਹੂੰ ਵਿੱਚ ਰਤੁਆ ਰੋਗ ਅਤੇ ਚੂਰਨ ਫਫੂੰਦੀ ਰੋਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ:- ੧. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ੨. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲੀਯ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ੩. ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਸਪਰੇ) ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

			ਖੁਰਾਕ/ਹੈਕਟੇਅਰ			
ਫਸਲ	ਕੀੜੇ/ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਐ.ਆਈ. (% ਸੰ. ਜਾਂ ਮਿ.ਲੀ./ਲੀ.)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ/ਹੈਕਟੇਅਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ)
ਮਿਰਚ	ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	500	5	
ਕਪਾਹ	ਲੀਫ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਗਰੇ ਮਿਲਡਿਊ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	500	12	-
ਮੱਕੀ	ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡਿਊ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	500	26	
ਪਿਆਜ਼	ਪਰਪਲ ਬਲੋਚ, ਸਟੇਮਫਿਲਿਅਮ ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡਿਊ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	500	7	-
ਧਾਨ	ਬਲਾਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	500	31	
ਗੰਨਾ	ਰੈੱਡ ਰਾਟ, ਸਮਟ ਅਤੇ ਰਸਟ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	400	265	-
ਟਮਾਟਰ	ਅਰਲੀ ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	500	5	
ਹਲਦੀ	ਲੀਫ ਬਲੋਚ, ਲੀਫ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਰਾਈਜ਼ੋਮ ਰਾਟ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	500	60	-
ਗੇਹੂੰ	ਰਸਟ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	0.03% ਜਾਂ 0.3 g/l	0.1% ਜਾਂ 1 ਮਿ.ਲੀ./ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ	500	35	

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੌਸਮ: ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿੱਟੀ- ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੁਰ ਨਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਉਪਕਰਣ, ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ
ਹਦਾਇਤਾਂ- ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਸਪਰੇਅਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਸਲ 'ਤੇ 1-2 ਛਿੜਕਾਅ (ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੁਹਰਾਓ) ਉਚਿਤ
ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼: ਛਿੜਕਾਅ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: CIB ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ (ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਐਨਕ, ਬੂਟ ਆਦਿ)। ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਚੱਬਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪਰੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪਰੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਛੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੰਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੁਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧੋਵੋ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਵੋ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
3. ਪੱਤਰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ (ਡਿੱਬੇ) ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਲੰਬੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਚਮੜੀ ਸੰਪਰਕ: ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜ਼ਹਿਰਲੇਪਣ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੋਣ 'ਤੇ: ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ: ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਨਿਗਲਣ 'ਤੇ: ਪ੍ਰਚੁਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਰਕੋਲ ਦਿਓ। ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਨੋਟ: ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਟੋਟਾਕਸਿਸਿਟੀ : CIB ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ

ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਵਿਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
(1) ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
ਡਿੱਬਿਆਂ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਲ/ਪਦਾਰਥ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ।
(2) ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਿੱਬਿਆਂ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(3) ਪੈਕਟਾਂ/ਡਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
(1) ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
(2) ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਫ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਐਜ਼ੋਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਏ.ਆਈ	18.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਡਾਇਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਏ.ਆਈ	11.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ
(ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ)	%
ਨੈਫਥੇਲੀਨਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਸੌਲਟ, ਫੌਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਕੰਡੇਂਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ	1.22% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਬਲਾੱਕਕੋਪੋਲੀਮਰ ਪੀਓ/ਈਓ	1.13% ਭਾਰ/ਭਾਰ
(ਐਂਟੀਫੋਮਿੰਗ ਏਜੰਟ)	%
ਪੋਲੀਡਾਇਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੋਕਜ਼ੇਨ	0.79% ਭਾਰ/ਭਾਰ
(ਥਿਕਨਰ)	%
ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਸੈਕੇਰਾਈਡ	0.25% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਟਿਵ	%
1,2 – ਬੈਂਜ਼ੀਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲ -3 (2 ਐਚ)-ਵਨ	0.03% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਵੈਟਰ	%
ਸਿਟਾਇਲ/ਸਟੀਰਾਇਲ - ਅਲਕੋਹਲ ਇਥੋਕ੍ਸੀਲੇਟਿਡ	20.70% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪਾਣੀ	ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ %
ਕੁਲ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% भा/भा + डाइफेनोकोनाझोल 11.4% भा/भा एस.सी.

(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% भा/भा + डाइफेनोकोनाझोल 11.4% भा/भा एस.सी. एक बहुपयोगी फफूंदनाशक है जिसमें मुख्य रोगजनकों के नियंत्रण के लिए अंत:प्रवाही क्रियाशीलता है। इसकी सिफारिश मिर्च में रुक्ष रोग तथा चूर्ण फफूंदी रोग, टमाटर फसल में अगेती अंगमारी रोग तथा विलंबित अंगमारी रोग, धान में सहसमारी रोग तथा पर्णच्छद अंगमारी, मक्का में अंगमारी रोग तथा मृदु रोमिल फफूंदी और गेहूं में रतुआ रोग तथा चूर्ण फफूंदी रोग नियंत्रण बीमारियों के लिए की जाती है। सावधान:- 1. इस उत्पाद का प्रयोग उन स्थानों पर वर्जित है जहाँ पर मछली पालन अथवा धान की खेती के साथ मछली पालन किया जाता हो। 2. यह कीटनाशी मिश्रण मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसे मत्स्यपालन में या इसके निकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 3. प्रतिरोधक क्षमता विकसित न होने देने के लिए इस कीटनाशी मिश्रण को अनुमोदित फसलों पर बार-बार इस्तेमाल (स्प्रे) न करें।

उपयोग

		प्रति हैक्टेयर मात्रा				
फ़सल	कीट/रोग का सामान्य नाम	स. तत्व (% सान्द्रता या मि,ली/लीटर)	संरचना	पानी की मात्रा (लीटर/हेक्टेर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिना)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
मिर्च	रुक्ष रोग तथा चूर्ण फफूंदी रोग	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	500	5	
कपास	पत्ती धब्बा रोग, सलेटी फफूंदी	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	500	12	-
मक्का	अंगमारी रोग तथा मृदुरोमिल फफूंदी	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	500	26	
प्याज	जामनी पत्ती छिदी रोग, स्टेम्पफाईलीयम फफूंदी मृदुरोमिल फफूंदी	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	500	7	-
धान	सहसमारी रोग तथा पर्णच्छद अंगमारी	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	500	31	
गन्ना	लाल गलन रोग. कंडुआ रोग, रतुआ रोग	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	400	265	-
टमाटर	अंगेती अंगमारी रोग तथा विलंबित अंगमारी रोग	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	500	5	
हल्दी	पत्ती छिदी रोग, पत्ती धब्बा रोग, कन्द गलन रोग	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	500	60	-
गेहूं	रतुआ रोग तथा चुर्ण फफूंदी रोग	0.03% या 0.3 ग्राम/लीटर	0.1% या 1 मि.ली./लीटर पानी	500	35	

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
मौसम: बारिश एवं तेज हवा चलते वक्त छिड़काव न करें। मिट्टी- मिट्टी में जब पर्याप्त नमी हो तभी छिड़काव करें। फसल की अवस्था, उपयोग के तरीका एवं समय, उपकरण, नौजल का प्रकार, छिड़काव एवं घोल बनाने सम्बन्धित हिदायतें- उत्पाद की उचित मात्रा लीजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। निर्दिष्ट मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए तथा हॉलो कोन अथवा अन्य उपयुक्त नौजल का इस्तेमाल करके नैपसेक स्प्रेयर अथवा अन्य उपयुक्त स्प्रेयर से पूरी फसल में 1-2 छिड़काव (बीमारी की तीव्रता के अनुसार छिड़काव दोहराएँ) ऐसे समय पर करें जब उपरोक्त का प्रकोप हुआ हो। पुन: प्रवेश: छिड़काव की बूंदें फसलों पर सूखने से पहले खेत में प्रवेश न करें। छिड़काव के बाद खाली हुए डिब्बों को दोबारा प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। इस्तेमाल हुए पैक को दोबारा प्रयोग करने से बचाने के लिए इस्तेमाल किए हुए डिब्बों को पुन: बाहर खाली न छोड़ें।

प्रयोग का समय: सीआईबी दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां
प्रयोग के बाद दूषित कपड़े तथा शरीर के अंग अच्छी तरह धोएं। प्रयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें (हाथ के दस्ताने, मुंह का नकाब, चश्मा, बूट्स आदि)। सांस के साथ अंदर लेने से बचें, प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और चबाना नहीं चाहिए। स्प्रे घोल तैयार करने के लिए खाना पकाने वाले बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर सारे पानी से धोएं। घोल बनाने और छिड़काव करने के वक्त, त्वचा, आँख और कपड़ों को फफूंदनाशी के संपर्क से बचाएं। सान्द्र पदार्थ अथवा छिड़काव मिश्रण से दूषित होने पर त्वचा को तुरंत अच्छी तरह धोएं एवं आँखों को पर्याप्त मात्रा में पानी से 15 मिनट तक धोएं। प्रयोग के उपरांत बचाव उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें। दूषित कपड़ों को पुन: उपयोग से पहले धोएं। इस उत्पाद का प्रयोग उन स्थानों पर वर्जित है जहाँ पर मछली पालन अथवा धान की खेती के साथ फसल पालन किया जाता हो। मछली के लिए विषकारक है।
चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़क पर न करें।
2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें।
3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग कंटेनर (डिब्बों) को नष्ट कर दें।

विष के लक्षण
विषबाधा के प्रभाव के लक्षण जैसे क्रियाशीलता कम होना, पुतली का फैलना, पांवों का प्रत्याहार, कम फैलता हुआ रिफ्लेक्स, लंबी सांसें लेना व सांसों की गति धीमी होना हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा
त्वचा स्पर्श: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं।
अंत:श्वसन: प्रभावित व्यक्ति को दूषित जगह से हवादार कमरे या खाली जगह में ले जाएं और तापमान से बचाएं।
विषाक्तता का संदेह होने पर: तुरंत चिकित्सीय सलाह लें।
नेत्र स्पर्श: पलकों को अलग कर आँखों को तुरंत सफाई वाले द्रव अथवा साफ पानी से अच्छी तरह धोएं एवं तुरंत चिकित्सक परामर्श लें।
निगल जाने पर: पानी की पर्याप्त मात्रा के साथ लगातार चिकित्सीय चारकोल खिलाएं। अधिक मात्रा में सान्द्र पदार्थ निगल जाने पर चिकित्सक सलाह लें। सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो मुंह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौध विषाक्तता : सीआईबी दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें

विष नाशक
कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
(1) छिड़काव के बाद खाली हुए डिब्बों को दोबारा प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है अत: पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धुलाई और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।
(2) उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेटों को वैसे ही बाहर नहीं छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार उनका दोबारा उपयोग बचाया जा सकता है।
(3) पैकेटों/डिब्बों को तोड़-मरोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें
(1) फफूंदनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बंद अलमारियों में रखना चाहिए।
(2) फफूंदनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारतें मजबूत, सूखी, प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सके।

रासायनिक संरचना

एजोक्सिस्ट्रोबिन स.त.	:	18.20% भार / भार
डाइफेनोकोनाझोल स.त.	:	11.40% भार / भार
छितरक	:	%
नैफ्थेलीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम	:	1.22% भार / भार
सॉल्ट फारमालडिहाइड कन्डेन्सेट		
ब्लोककोपालीमर पीओ / ईओ	:	1.13% भार / भार
एंटिफोमिंग एजेंट	:	%
पॉलीडॉयमिथाइल सिलोग्सेन	:	0.79% भार / भार
सान्द्रित करने वाले तत्व	:	%
लिनीयर पोलिसैकोराइड	:	0.25%भार / भार
प्रीजरवेटीव	:	%
1, 2–बैन्जिसोथायाजोल–3 (2एच)–ओन	:	0.03% भार / भार
वैटर	:	%
सिटायल / स्टिरायल–अल्कोहल इथोक्सीलेटीड	:	20.70% भार / भार
पानी	:	पर्याप्त मात्रा %
कुल	:	**100.0% भार / भार**

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC

(Systemic Fungicide)

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC is a broad spectrum fungicide having systemic activity against major pathogens. It is recommended for the control of Anthracnose and powdery mildew of chilli; Early blight and Late blight of Tomato; blast & sheath blight of Paddy; blight & downy mildew of Maize; Rust & Powdery Mildew of Wheat. Caution:- 1. The product shall not be used in area where pisciculture/intercropping pisciculture is practiced along with Rice cultivation. 2. The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore not to be used near aquactulture. 3. The combination product not to be used repeatedly on the approved grops of avoid development of resistance.

Recommendation

		Dosage/HA				
Crop(s)	Common Name of Pest	AI (% conc. or ml/l)	Formulation	Dilution in Water (Litre/hectare)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Chilli	Anthracnose and powdery mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/litre water	500	5	
Cotton	Leaf spot & grey mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/liter water	500	12	-
Maize	blight & downy mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/litre water	500	26	
Onion	Purple blotch, stemphylium blight & downy mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/liter water	500	7	-
Paddy	blast & sheath blight	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/litre water	500	31	
Sugarcane	Red rot, smut & rust	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/liter water	400	265	-
Tomato	Early blight and Late blight	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/litre water	500	5	
Turmeric	Leaf blotch, leaf spot & rhizome rot	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/liter water	500	60	-
Wheat	Rust & Powdery Mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1 ml/litre water	500	35	

Direction Of Use
Weather condition- Don't spray during windy and rainy weather; Soil- spray when there is sufficient moisture in soil; Crops stage, application technique & timing, equipment, Nozzle type, instruction for mixing & frequency including number of sprays- Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation for total coverage of crop. Give 1-2 sprays (depending on disease pressure, repeat the spray) with knapsack or any other suitable sprayer having hollow cone or any other suitable nozzle at the time when crops are infested with above mentioned diseases; Re-entry period- Do not enter the field until spray droplets are dried. Dangerous to re-use empty containers. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use and shall be broken and buried away from habitation.

Time of Application: Refer to CIB Guidelines

Precautions
Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing (hand gloves, mask, goggles, boots etc.) during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application. Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use sticks for stirring the spray solution. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. If contamination occurs with concentration or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for atleast 15 minutes with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. The product shall not be used in area where pisciculture/Intercropping pisciculture is practiced along with Rice cultivation.Product is toxic to fish.
Warning: 1. Not to be used on crops and diseases other than those mentioned on Label and Leaflets.
2. Not to be used for Post-Harvest application.
3. Destroy the container after use as directed on Leaflet.
4. Directions/dosage not relevant for poly houses/confined area as product is meant for use in open field.

Symptoms Of Poisoning
Poisoning may cause symptoms of activity decrease, pupil dilation, moderate foot withdrawal, reduce splay reflex, increased breathing depth and reduced breath rate etc.

First Aid
Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of body with water by soap and water.
Inhalation: Remove the affected person from the danger zone to well-ventilated room or to fresh air and protect from undercooling.
In case of suspected poisoning: Seek medical advice immediately.
Eye Contact: Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for atleast 15 minutes. Obtain immediate medical attention.
If swallowed: Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. Seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. Note: Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.

Phytotoxicity : Refer to CIB Guidelines

Antidote
No specific antidote is known, apply symptomatic therapy.

Disposal Of Used Container
1. Dangerous to re-use empty containers hence, packages or surplus materials and washing from the machines and
containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions
1. The packages containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides.
2. The rooms or premises means for storing fungicides shall be built, dry, well- lit and ventilated and of sufficient dimension avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Azoxystrobin a.i.	:	18.20% w/w
Difenoconazole a.i.	:	11.40% w/w
(Dispersant)	:	%
Napthalenesulfonic acid, sodium salt condensated with formaldehyde	:	1.22% w/w
Blockcopolymer PO/EO	:	1.13% w/w
(Antifoaming Agent)	:	%
Polydimethyl siloxane	:	0.79% w/w
(Thickner)	:	%
Linear polysaccharide	:	0.25% w/w
(Preservative)	:	%
1, 2-benzisothiazol-3 (2H)-one	:	0.03% w/w
Wetter	:	%
Cetyl/stearyl-alcohol ethoxilated	:	20.70% w/w
Water	:	Q.S. %
Total	:	**100% w/w**

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

AgroStar®

AJAX NXT

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC

(Systemic Fungicide)

एजैक्स नेक्स्ट

एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% भा/भा + डाइफेनोकोनाझोल 11.4% भा/भा एस.सी.

(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

For Agricultural Use Only

केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS

READ THE LEAFLET BEFORE USE

सूचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.



Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

এজোক্সিস্ট্রোবিন 18.2% ভা/ভা + ডাইফেনোকোনাজোল 11.4% ভা/ভা এস.সি.
(অন্তঃপ্রবাহী ছত্রাকনাশক)

এজোক্সিস্ট্রোবিন 18.2% ভা/ভা + ডাইফেনোকোনাজোল 11.4% ভা/ভা এস.সি. একটি বহুমুখী ছত্রাকনাশক, যাতে প্রধান রোগজীবাণুর নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্তঃপ্রবাহী ক্রিয়াশীলতা রয়েছে। এটি মরিচে রুক্ষ রোগ এবং গুঁড়ো ছত্রাক রোগ, টমেটো ফসলে আগামি ব্লাইট রোগ এবং বিলম্বিত ব্লাইট রোগ, ধানে সহসমারি রোগ এবং পত্রচ্ছদ ব্লাইট, ভুট্টায় ব্লাইট রোগ এবং নরম রোমিল ছত্রাক এবং গমে রতুয়া রোগ এবং গুঁড়ো ছত্রাক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করা হয়। সতর্কতা:- ১. এই পণ্যটি সেইসব স্থানে ব্যবহার নিষিদ্ধ যেখানে মাছ চাষ বা ধান চাষের সাথে মাছ চাষ করা হয়। ২. এই কীটনাশক মিশ্রণ মাছ এবং অন্যান্য জলজ জীবের জন্য বিষাক্ত তাই এটি মৎস্যচাষে বা তার নিকটে ব্যবহার করা উচিত নয়। ৩. প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশ রোধ করার জন্য এই কীটনাশক মিশ্রণ অনুমোদিত ফসলগুলিতে বারবার ব্যবহার (স্প্রে) করা উচিত নয়।

সুপারিশ

		মাত্রা/হেক্টর				
ফসল(সমূহ)	রোগ/পোকার সাধারণ নাম	এ.আই. (% সং. বা মি.লি./লি.)	ফর্মুলেশন	পানিতে দ্রবণ (লিটার/হেক্টর)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার অপেক্ষাকাল (দিন)	প্রতিটি প্রয়োগের পর পুনঃপ্রবেশ (ঘণ্টায়)
লঙ্কা	অ্যানথ্রাকনোজ এবং পাউডারি মিলডিউ	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	500	5	
তুলা	লিফ স্পট এবং গ্রে মিলডিউ	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	500	12	-
ভুট্টা	ব্লাইট এবং ডাউনি মিলডিউ	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	500	26	
পেঁয়াজ	পার্পল ব্লচ, স্টেমফিলিয়াম ব্লাইট এবং ডাউনি মিলডিউ	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	500	7	-
ধান	ব্লাস্ট এবং শীথ ব্লাইট	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	500	31	
আখ	রেড রট, স্মাট এবং রস্ট	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	400	265	-
টমেটো	আর্লি ব্লাইট এবং লেট ব্লাইট	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	500	5	
হলুদ	লিফ ব্লচ, লিফ স্পট এবং রাইজোম রট	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	500	60	-
গম	রস্ট এবং পাউডারি মিলডিউ	0.03% বা 0.3 g/l	0.1% বা 1 মি.লি./লিটার পানি	500	35	

ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী
আবহাওয়াঃ বৃষ্টি এবং প্রবল বাতাসের সময় স্প্রে করবেন না। মাটি- মাটিতে যখন পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকবে তখনই স্প্রে করুন। ফসলের অবস্থা, ব্যবহারের পদ্ধতি এবং সময়, যন্ত্রপাতি, নোজলের ধরন, স্প্রে এবং দ্রবণ প্রস্তুত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী- পণ্যের সঠিক পরিমাণ নিন এবং তা অল্প জলের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। নির্ধারিত পরিমাণটি বাকি জলে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিন এবং হলো কন বা অন্যান্য উপযুক্ত নোজল ব্যবহার করে ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার বা অন্যান্য উপযুক্ত স্প্রেয়ার দিয়ে পুরো ফসলে 1-2 বার স্প্রে করুন (রোগের তীব্রতা অনুযায়ী স্প্রে পুনরাবৃত্তি করুন) উপযুক্ত সময়ে করুন যখন উপরোক্ত আক্রমণ দেখা দেয়। পুনঃপ্রবেশঃ স্প্রের ফোঁটা ফসলে শুকানোর আগে ক্ষেতে প্রবেশ করবেন না। স্প্রে করার পর খালি ডিব্বাগুলি পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক হতে পারে। ব্যবহৃত প্যাক পুনরায় ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত ডিব্বাগুলি বাইরে খালি অবস্থায় ফেলে রাখবেন না।

ব্যবহারের সময়: সিআইবি নির্দেশিকার উল্লেখ করুন

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা
ব্যবহারের পরে দূষিত কাপড় এবং শরীরের অংশ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। ব্যবহারের সময় সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করুন (হাতমোজা, মুখোশ, চশমা, বুট ইত্যাদি)। শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে প্রবেশ এড়িয়ে চলুন, ব্যবহারের সময় ধূমপান, খাওয়া, পান করা এবং চিবানো করবেন না। স্প্রে দ্রবণ প্রস্তুত করতে রান্নার পাত্র ব্যবহার করবেন না। স্প্রে দ্রবণ নাড়ানোর জন্য কাঠের দণ্ড ব্যবহার করুন। কাজ শেষ হওয়ার পর হাত সাবান এবং প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দ্রবণ প্রস্তুত এবং স্প্রে করার সময়, ত্বক, চোখ এবং পোশাককে ছত্রাকনাশকের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করুন। ঘন পদার্থ বা স্প্রে মিশ্রণে দূষিত হলে ত্বক তৎক্ষণাৎ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন এবং চোখ পর্যাপ্ত জল দিয়ে 15 মিনিট ধুয়ে নিন। ব্যবহারের পরে সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। দূষিত কাপড় পুনরায় ব্যবহারের আগে ধুয়ে নিন। এই পণ্যটি সেইসব স্থানে ব্যবহার নিষিদ্ধ যেখানে মাছ চাষ বা ধান চাষের সাথে ফসল চাষ করা হয়।
মাছের জন্য বিষাক্ত।
সতর্কবার্তাঃ 1. লেবেল এবং লিফলেটে উল্লেখ না থাকলে এই পণ্যটি ফসল এবং কীটের উপর ব্যবহার করবেন না।
2. ফসল কাটার পরে এই পণ্য ব্যবহার করবেন না।
3. লিফলেটে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহৃত কন্টেইনার (ডিব্বা) ধ্বংস করুন।
বিষের লক্ষণ
বিষক্রিয়ার লক্ষণ যেমন কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, চোখের মণি বড় হওয়া, পায়ের প্রত্যাহার, কম প্রতিক্রিয়া, দীর্ঘ শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাসের গতি ধীর হয়ে যাওয়া হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
ত্বকের সংস্পর্শঃ দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন এবং শরীরের আক্রান্ত অংশ সাবান ও জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
শ্বাস গ্রহণঃ আক্রান্ত ব্যক্তিকে দূষিত স্থান থেকে বায়ুচলাচলযুক্ত ঘর বা খোলা স্থানে নিয়ে যান এবং তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করুন।
বিষক্রিয়ার সন্দেহ হলেঃ অবিলম্বে চিকিৎসা পরামর্শ নিন।
চোখের সংস্পর্শঃ চোখের পাতা আলাদা করে চোখ সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার তরল বা পরিষ্কার জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন এবং অবিলম্বে
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
গিলে ফেললোঃ পর্যাপ্ত জল সহ ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসা-সংক্রান্ত চারকোল দিন। অধিক পরিমাণে ঘন পদার্থ গিলে ফেললে
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নোটঃ রোগী অচেতন থাকলে মুখে কিছু দেবেন না। বমি করানোর চেষ্টা করবেন না।

ফাইটোটক্সিসিটি : সিআইবি নির্দেশিকার উল্লেখ করুন

বিষনাশক
কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

খালি ডিব্বার নিষ্পত্তি
(1) স্প্রে করার পর খালি ডিব্বাগুলি পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক হতে পারে, তাই পরিবেশ দূষণ রোধ করতে ডিব্বা, অবশিষ্ট দ্রবণ/পদার্থ, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার এবং খালি ডিব্বার নিষ্পত্তি নিরাপদ স্থানে করুন।
(2) ব্যবহৃত ডিব্বা/প্যাকেট এভাবে বাইরে ফেলে রাখা উচিত নয়। এতে পুনরায় ব্যবহার রোধ করা যায়।
(3) প্যাকেট/ডিব্বা ভেঙে মোচড় দিয়ে জনবসতি থেকে দূরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন।

সংরক্ষণের শর্তাবলী
(1) ছত্রাকনাশকের ডিব্বাগুলি অন্যান্য সামগ্রী বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা ভবন থেকে দূরে ঘর বা ভবনে অথবা আলাদা তালাবদ্ধ আলমারিতে সংরক্ষণ করতে হবে।
(2) ছত্রাকনাশক সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা ভবন শক্ত, শুষ্ক, আলোকিত এবং বায়ুচলাচলযুক্ত হওয়া উচিত যাতে বাষ্প থেকে দূষণ না ঘটে।

রাসায়নিক গঠন

ক্র. নং	উপাদান	বিবরণ ওজন
1	অ্যাজক্সিস্ট্রোবিন (a.i.)	18.20 % ওজন/ওজন
2	ডাইফেনোকোনাজল (a.i.)	11.40 % ওজন/ওজন
3	(বিক্ষেপক)	%
4	ন্যাফথালিন সালফোনিক অ্যাসিড, সোডিয়াম লবণ (ফরম্যালডিহাইডের সাথে সংঘনিত)	1.22 % ওজন/ওজন
5	ব্লক কোপলিমার পিও/ইও	1.13 % ওজন/ওজন
6	(ফেনা প্রতিরোধক এজেন্ট)	%
7	পলিডাইমিথাইল সিলোক্সেন	0.79 % ওজন/ওজন
8	(ঘনকারী)	%
9	রৈখিক পলিস্যাকারাইড	0.25 % ওজন/ওজন
10	(সংরক্ষক)	%
11	1,2-বেঞ্জিসোথিয়াজোল-3 (2H)-ওন	0.03 % ওজন/ওজন
12	(ভেজানোর উপাদান)	%
13	সিটিল/স্টিয়ারিল-অ্যালকোহল ইথক্সিলেটেড	20.70 % ওজন/ওজন
14	জল	Q.S.
	মোট	100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 18.2% பா/பா + டைபெனோகோனாசோல் 11.4% பா/பா எஸ்.சி.
(உள்சுரந்து செயல்படும் பூஞ்சைநாசினி)

அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 18.2% பா/பா + டைபெனோகோனாசோல் 11.4% பா/பா எஸ்.சி. என்பது ஒரு பல்நோக்கு பூஞ்சைநாசினி ஆகும், இதில் முக்கிய நோய்க்கிருமிகளை கட்டுப்படுத்த உள்சுரந்து செயல்படும் திறன் உள்ளது. இது மிளகில் உலர் நோய் மற்றும் தூள் பூஞ்சை நோய், தக்காளி பயிரில் ஆரம்ப பிளைட் நோய் மற்றும் தாமதமான பிளைட் நோய், நெலில் சகஸ்மாரி நோய் மற்றும் இலை மூடி பிளைட், மக்காச்சோளத்தில் பிளைட் நோய் மற்றும் மென்மையான ரோமில பூஞ்சை மற்றும் கோதுமையில் ரஸ்ட் நோய் மற்றும் தூள் பூஞ்சை நோய் கட்டுப்பாட்டிற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எச்சரிக்கை:- 1. இந்த தயாரிப்பு மீன் வளர்ப்பு நடைபெறும் இடங்களில் அல்லது நெல் சாகுபடியுடன் இணைந்த மீன் வளர்ப்பு நடைபெறும் இடங்களில் பயன்படுத்தத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 2. இந்த பூச்சிக்கொல்லி கலவை மீன்கள் மற்றும் பிற நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு விஷமாகும் எனவே இதனை மீன் வளர்ப்பில் அல்லது அதன் அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது. 3. எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகாமல் இருக்க இந்த பூச்சிக்கொல்லி கலவையை அனுமதிக்கப்பட்ட பயிர்களில் மீண்டும் மீண்டும் (தூவல்) பயன்படுத்தக் கூடாது.

பரிந்துரை

		அளவு/ஹெக்டேருக்கு				
பயிர்கள்	நோய்/பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	ஏ.ஐ. (% செறிவு அல்லது மி.லி./லிட்டர்)	தயாரிப்பு	நீரில் கலக்கும் அளவு (லிட்டர்/ஹெக்டேர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடைவேளை (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு பயன்படுத்தலின் பின் மீண்டும் நுழைவு (மணிநேரங்களில்)
மிளகாய்	அன்த்ராக்னோஸ் மற்றும் பவுடரி மில்ட்யூ	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	500	5	
பருத்தி	இலைத் தழும்பு மற்றும் கிரே மில்ட்யூ	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	500	12	-
மக்காச் சோளம்	பிளைட் மற்றும் டவுனி மில்ட்யூ	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	500	26	
வெங்காயம்	பர்ப்பிள் ப்ளாட்ச், ஸ்டெம்ஃபிலியம் பிளைட் மற்றும் டவுனி மில்ட்யூ	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	500	7	-
நெல்	பிளாஸ்ட் மற்றும் ஷீத் பிளைட்	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	500	31	
கரும்பு	ரெட் ராட், ஸ்மட் மற்றும் ரஸ்ட்	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	400	265	-
தக்காளி	அர்லி பிளைட் மற்றும் லேட் பிளைட்	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	500	5	
மஞ்சள்	இலை ப்ளாட்ச், இலைத் தழும்பு மற்றும் ரைசோம் ராட்	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	500	60	-
கோதுமை	ரஸ்ட் மற்றும் பவுடரி மில்ட்யூ	0.03% அல்லது 0.3 g/l	0.1% அல்லது 1 மி.லி./லிட்டர் நீர்	500	35	

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்
வானிலை: மழை மற்றும் பலமான காற்று வீசும் நேரத்தில் தெளிப்பு செய்ய வேண்டாம். மண்- மண்ணில் போதுமான ஈரப்பதம் இருக்கும் போது மட்டுமே தெளிக்கவும். பயிரின் நிலை, பயன்பாட்டு முறை மற்றும் நேரம், உபகரணங்கள், நுழல் வகை, தெளிப்பு மற்றும் கரைசல் தயாரிப்பு தொடர்பான வழிமுறைகள்- தயாரிப்பின் சரியான அளவை எடுத்துக் கொண்டு அதை சிறிது நீருடன் நன்றாக கலக்கவும். குறிப்பிடப்பட்ட அளவை மீதமுள்ள நீரில் நன்றாக கிளறி கலக்கவும் மற்றும் ஹாலோ கோன் அல்லது பிற பொருத்தமான நுழலை பயன்படுத்தி நாப்சாக் தெளிப்பான் அல்லது பிற பொருத்தமான தெளிப்பான் மூலம் முழு பயிரிலும் 1-2 முறை தெளிக்கவும் (நோயின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து தெளிப்பை மீண்டும் செய்யவும்) சரியான நேரத்தில் மேற்கொள்ளவும். மீள் நுழைவு: தெளிக்கப்பட்ட துளிகள் பயிரில் உலருவதற்கு முன் வயலில் நுழைய வேண்டாம்.
தெளித்த பிறகு காலியான டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானதாக இருக்கலாம். பயன்படுத்திய பாக்குகளை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க பயன்படுத்திய டப்பாக்களை வெளியில் காலியாக விட வேண்டாம்.

பயன்பாட்டு நேரம்: சிஜபி வழிகாட்டுதல்களை பார்க்கவும்

பயன்படுத்துபவர்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள்
பயன்பாட்டிற்கு பிறகு மாசடைந்த உடைகள் மற்றும் உடல் உறுப்புகளை நன்றாக கழுவவும். பயன்படுத்தும் போது பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும் (கைத்துணிகள், முகமூடி, கண்ணாடி, பூட்ஸ் முதலியவை). மூச்சின் மூலம் உள்ளே செல்லுவதை தவிர்க்கவும், பயன்படுத்தும் போது புகைப்பிடித்தல், உண்பது, குடிப்பது மற்றும் மென்றல் செய்யக்கூடாது. தெளிப்பு கரைசல் தயாரிக்க சமையல் பாத்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம். தெளிப்பு கரைசலை கலக்க மரக் குச்சியை பயன்படுத்தவும். வேலை முடிந்த பிறகு கைகளை சோப்பு மற்றும் அதிக நீரால் கழுவவும். கரைசல் தயாரிக்கும் போது மற்றும் தெளிக்கும் போது, தோல், கண்கள் மற்றும் உடைகளை பூஞ்சைநாசினி தொடர்பிலிருந்து பாதுகாக்கவும். செறிந்த பொருள் அல்லது தெளிப்பு கலவையால் மாசடைந்தால் தோலை உடனடியாக நன்றாக கழுவவும் மற்றும் கண்களை போதுமான நீரால் 15 நிமிடங்கள் கழுவவும். பயன்படுத்திய பிறகு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை நன்றாக சுத்தம் செய்யவும். மாசடைந்த உடைகளை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன் கழுவவும். இந்த தயாரிப்பு மீன் வளர்ப்பு நடைபெறும் இடங்களில் அல்லது நெல் சாகுபடியுடன் இணைந்த பயிர் சாகுபடி நடைபெறும் இடங்களில் பயன்படுத்தத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மீன்களுக்கு விஷமாகும்.
எச்சரிக்கை: 1. லேபல் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்படாத நிலையில் இந்த தயாரிப்பை பயிர்கள் மற்றும் பூச்சிகளின் மீது பயன்படுத்த வேண்டாம்.
2. பயிர் அறுவடை செய்யப்பட்ட பிறகு இந்த தயாரிப்பை பயன்படுத்த வேண்டாம்.
3. துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளின் படி பயன்படுத்திய கண்டெய்னர்களை (டப்பாக்கள்) அழிக்கவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்
நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகளில் செயல்திறன் குறைதல், கண்மணிகள் விரிதல், கால்களை உள்ளிழுத்தல், பதிலளிக்கும் திறன் குறைதல், ஆழ்ந்த சுவாசம் மற்றும் சுவாச விகிதம் குறைதல் ஆகியவை அடங்கும்.

முதல் உதவி
தோல் தொடர்பு: மாசடைந்த உடைகளை அகற்றி, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சோப்பு மற்றும் நீரால் நன்றாக கழுவவும்.
மூச்சு மூலம்: பாதிக்கப்பட்ட நபரை மாசடைந்த இடத்திலிருந்து காற்றோட்டமான அறை அல்லது திறந்த இடத்திற்கு கொண்டு சென்று வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாக்கவும்.
விஷப்பாதிப்பு சந்தேகம் இருந்தால்: உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறவும்.
கண் தொடர்பு: கண்ணிமைகளை பிரித்து கண்களை உடனடியாக சுத்தமான திரவம் அல்லது சுத்தமான நீரால் நன்றாக கழுவி உடனடியாக மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறவும்.
உண்டால்: போதுமான நீருடன் தொடர்ந்து மருத்துவ சார்கோல் அளிக்கவும். அதிக அளவில் செறிந்த பொருள் உட்கொண்டால்
மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறவும். குறிப்பு: நோயாளி மயக்கம் நிலையில் இருந்தால் வாயில் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். வாந்தி எடுக்க முயற்சிக்க வேண்டாம்.

பைட்டோடாக்ஸிசிட்டி : சிஜபி வழிகாட்டுதல்களை பார்க்கவும்

விஷநாசினி
குறிப்பிட்ட எதிர்விஷம் இல்லை. அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்கவும்.

காலியான டப்பாக்களின் அகற்றம்
(1) தெளித்த பிறகு காலியான டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது, எனவே சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைத் தவிர்க்க
டப்பாக்கள், மீதமுள்ள கரைசல்/பொருள், இயந்திரங்களின் கழுவுதல் மற்றும் காலியான டப்பாக்களின் அகற்றத்தை பாதுகாப்பான இடத்தில் செய்யவும்.
(2) பயன்படுத்திய டப்பாக்கள்/பேக்கெட்டுகளை அப்படியே வெளியே விடக்கூடாது. இதனால் அவற்றின் மீள் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்கலாம்.
(3) பேக்கெட்டுகள்/டப்பாக்களை உடைத்து மடித்து மக்கள் வசிப்பிடத்திலிருந்து தொலைவில் மண்ணில் புதைக்கவும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்
(1) பூஞ்சைநாசினி டப்பாக்களை பிற பொருட்களிலிருந்து குறிப்பாக உணவு பொருட்கள் சேமிக்கப்படும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களிலிருந்து தொலைவில்
அறைகளில் அல்லது கட்டிடங்களில் அல்லது தனி பூட்டப்பட்ட அலமாரிகளில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
(2) பூஞ்சைநாசினி சேமிப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் வலுவான, உலர்ந்த, ஒளியுள்ள மற்றும் காற்றோட்டமானவையாக இருக்க வேண்டும்
அதனால் ஆவியால் மாசுபாடு ஏற்படாது.

இரசாயன அமைப்பு

எண்	கூறு	விளக்கம் எடை
1	அசோக்சிஸ்ட்ரோபின் (a.i.)	18.20 % எடை/எடை
2	டைபெனோகோனாசோல் (a.i.)	11.40 % எடை/எடை
3	(பரவுபடுத்தி)	%
4	நாப்தலீன் சல்போனிக் அமிலம், சோடியம் உப்பு &ஃபார்மால்டிஹைடுடன் சங்கனிக்கப்பட்டது)	1.22 % எடை/எடை
5	ப்ளாக் கோபாலிமர் பி.ஓ./ஈ.ஓ.	1.13 % எடை/எடை
6	(நுரை தடுக்கும் முகவர்)	%
7	பாலிடைமெத்தில் சிலோக்சேன்	0.79 % எடை/எடை
8	(கட்டியாக்கி)	%
9	நேரியல் பாலிசாக்கரைடு	0.25 % எடை/எடை
10	(பாதுகாப்பான்)	%
11	1,2-பென்சிசோத்தியாசோல்-3 (2H)-ஒன்	0.03 % எடை/எடை
12	(ஈரப்பதப்படுத்தி)	%
13	செடில்/ஸ்டியாரில்-ஆல்கஹால் எத்தாக்சிலேட்டட்	20.70 % எடை/எடை
14	தண்ணீர்	Q.S.
	மொத்தம்	100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 18.2% భా/భా + డైఫెనోకోనాజోల్ 11.4% భా/భా ఎస్.సి.
(అంతఃప్రవాహి ఫంగిసైడ్)

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 18.2% భా/భా + డైఫెనోకోనాజోల్ 11.4% భా/భా ఎస్.సి. ఒక బహుళ ప్రయోజనాల ఫంగిసైడ్, ఇందులో ప్రధాన రోగకారకాలను నియంత్రించడానికి అంతఃప్రవాహ క్రియాశీలత ఉంది. ఇది మిరపలో రూక్ష రోగం మరియు పొడి బూజు రోగం, టమోటా పంటలో ముందస్తు బ్లైట్ రోగం మరియు ఆలస్య బ్లైట్ రోగం, వరి పంటలో సహసమారి రోగం మరియు ఆకుమచ్చ బ్లైట్, మొక్కజొన్నలో బ్లైట్ రోగం మరియు మృదు రోమిల బూజు, గోధుమలో రస్ట్ రోగం మరియు పొడి బూజు రోగ నియంత్రణకు సిఫారసు చేయబడింది. జాగ్రత్త:- 1. ఈ ఉత్పత్తిని చేపల పెంపకం జరిగే ప్రదేశాలలో లేదా వరి పంటతో పాటు చేపల పెంపకం జరిగే ప్రదేశాలలో ఉపయోగించరాదు. 2. ఈ కీటకనాశక మిశ్రమం చేపలు మరియు ఇతర జలచరాలకు విషపూరితం కాబట్టి దీనిని మత్స్యపాలనలో లేదా దాని సమీపంలో ఉపయోగించకూడదు. 3. నిరోధక శక్తి అభివృద్ధి చెందకుండా ఉండేందుకు ఈ కీటకనాశక మిశ్రమాన్ని అనుమతించిన పంటలపై పునరావృతంగా (స్ప్రే) ఉపయోగించకూడదు|

సిఫారసు

		మోతాదు/హెక్టారుకు				
పంటలు	వ్యాధి/పురుగుల సాధారణ పేరు	ఎ.ఐ. (% సాంద్రత లేదా మి.లీ./లీ.)	ఫార్ములేషన్	నీటిలో కలపవలసిన పరిమాణం (లీటర్/హెక్టారు)	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వేచి ఉండవలసిన కాలం (రోజులు)	ప్రతి వినియోగం తర్వాత మళ్లీ ప్రవేశం (గంటల్లో)
మిరప	ఆంత్రాక్నోస్ మరియు పౌడరీ మిల్డ్యూ	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	500	5	
పత్తి	ఆకు మచ్చలు మరియు గ్రే మిల్డ్యూ	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	500	12	-
మక్కజొన్న	బ్లైట్ మరియు డౌనీ మిల్డ్యూ	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	500	26	
ఉల్లిపాయ	పర్పుల్ బ్లాచ్, స్టెమ్ఫిలియం బ్లైట్ మరియు డౌనీ మిల్డ్యూ	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	500	7	-
వరి	బ్లాస్ట్ మరియు షీత్ బ్లైట్	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	500	31	
చెరకు	రెడ్ రాట్, స్మట్ మరియు రస్ట్	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	400	265	-
టమోటా	అర్లీ బ్లైట్ మరియు లేట్ బ్లైట్	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	500	5	
పసుపు	ఆకు బ్లాచ్, ఆకు మచ్చలు మరియు రైజోమ్ రాట్	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	500	60	-
గోధుమ	రస్ట్ మరియు పౌడరీ మిల్డ్యూ	0.03% లేదా 0.3 g/l	0.1% లేదా 1 మి.లీ./లీటర్ నీరు	500	35	

వినియోగానికి సూచనలు
వాతావరణం: వర్షం మరియు బలమైన గాలి ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయకండి. నేల- నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పిచికారీ చేయండి| పంట స్థితి, వినియోగ విధానం మరియు సమయం, పరికరాలు, నాజిల్ రకం, పిచికారీ మరియు ద్రావణం తయారీకి సంబంధించినసూచనలు- ఉత్పత్తి సరైన మోతాదును తీసుకుని కొద్దిగా నీటితో బాగా కలపండి. నిర్ణీత మోతాదును మిగిలిన నీటిలో బాగా కలిపి హాలో కోన్ లేదా ఇతర అనుకూల నాజిల్ ఉపయోగించి నాప్సా క్స్ప్రేయర్ లేదా ఇతర అనుకూల స్ప్రేయర్ ద్వారా మొత్తం పంటపై 1-2 సార్లు పిచికారీ చేయండి (రోగ తీవ్రతను బట్టి పునరావృతం చేయండి) సరైన సమయంలో చేయండి. మళ్లీ ప్రవేశం: పిచికారీ చేసిన చుక్కలు పంటపై ఎండకముందు పొలంలోకి ప్రవేశించవద్దు| పిచికారీ తరువాత ఖాళీ అయిన డబ్బాలను మళ్లీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం కావచ్చు. ఉపయోగించిన ప్యాకులను మళ్లీ ఉపయోగించకుండా ఉండేందుకు ఉపయోగించిన డబ్బాలను బయట ఖాళీగా వదలవద్దు|

వినియోగ సమయం: సీఐబి మార్గదర్శకాలను చూడండి

వినియోగదారుల కోసం జాగ్రత్తలు
వినియోగం తరువాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగండి. వినియోగ సమయంలో రక్షణ దుస్తులు ధరించండి (చేతి దస్తానాలు, ముఖ మాస్క్, కళ్లద్దాలు, బూట్లు మొదలైనవి). శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తపడండి, వినియోగ సమయంలో ధూమపానం, తినడం, తాగడం మరియు నమలడం చేయకండి. స్ప్రే ద్రావణం తయారు చేయడానికి వంట పాత్రలను ఉపయోగించకండి. స్ప్రే ద్రావణాన్ని కలపడానికి కలప కర్రను ఉపయోగించండి. పని పూర్తైన తరువాత చేతులను సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో కడగండి. ద్రావణం తయారీ మరియు పిచికారీ సమయంలో, చర్మం, కళ్ళు మరియు దుస్తులను ఫంగిసైడ్ సంపర్కం నుండి రక్షించండి. సాంద్ర పదార్థం లేదా పిచికారీ మిశ్రమం వల్ల కలుషితం అయితే చర్మాన్ని వెంటనే బాగా కడగండి మరియు కళ్లను తగినంత నీటితో 15 నిమిషాలు కడగండి. వినియోగం తరువాత రక్షణ పరికరాలను బాగా శుభ్రం చేయండి. కలుషితమైన బట్టలను మళ్లీ ఉపయోగించే ముందు కడగండి| ఈ ఉత్పత్తిని చేపల పెంపకం జరిగే ప్రదేశాలలో లేదా వరి పంటతో పాటు పంటల పెంపకం జరిగే ప్రదేశాలలో ఉపయోగించరాదు|
చేపలకు విషపూరితం|
హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు లీఫ్లెట్‌లో పేర్కొనబడని పరిస్థితిలో ఈ ఉత్పత్తిని పంటలపై మరియు పురుగులపై ఉపయోగించకండి|
2. పంట కోత తరువాత ఈ ఉత్పత్తిని ఉపయోగించకండి|
3. లీఫ్లెట్‌లో ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారం ఉపయోగించిన కంటైనర్లను (డబ్బాలు) నాశనం చేయండి|

విష లక్షణాలు
విష ప్రభావ లక్షణాలు వంటి క్రియాశీలత తగ్గడం, కంటి పిల్లలు విస్తరించడం, కాళ్ల ఉపసంహరణ, తక్కువ ప్రతిస్పందన, లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం మరియు శ్వాస వేగం తగ్గడం జరగవచ్చు|

ప్రథమ చికిత్స
చర్మ సంపర్కం: కలుషితమైన బట్టలను తొలగించి ప్రభావిత భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగండి|
శ్వాస ద్వారా: ప్రభావిత వ్యక్తిని కలుషిత ప్రదేశం నుండి గాలి ప్రసరణ ఉన్న గది లేదా బహిరంగ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి ఉష్ణోగ్రత నుండి రక్షించండి|
విష ప్రభావ అనుమానం ఉంటే: వెంటనే వైద్య సలహా పొందండి|
కంటి సంపర్కం: కంటి పలకలను వేరు చేసి కళ్లను వెంటనే శుభ్రమైన ద్రవం లేదా నీటితో బాగా కడిగి వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి|
మింగినట్లయితే: తగినంత నీటితో నిరంతరం వైద్య చార్కోల్ ఇవ్వండి. అధిక పరిమాణంలో సాంద్ర పదార్థం మింగినట్లయితే
వైద్య సలహా పొందండి. గమనిక: రోగి స్పృహలో లేకపోతే నోటితో ఏమీ ఇవ్వకండి. వాంతి చేయించడానికి ప్రయత్నించకండి|

ఫైటోటాక్సిసిటీ : సీఐబి మార్గదర్శకాలను చూడండి

విషనాశక
ప్రత్యేక ప్రతివిషం లేదు. లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్స చేయండి|

ఖాళీ డబ్బాల నిర్వాహణ
(1) పిచికారీ తరువాత ఖాళీ డబ్బాలను మళ్లీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం కావచ్చు, కాబట్టి పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి డబ్బాలు, మిగిలిన ద్రావణం/పదార్థం, యంత్రాల శుభ్రపరచడం మరియు ఖాళీ డబ్బాల నిర్వహణను సురక్షిత ప్రదేశంలో చేయండి|
(2) ఉపయోగించిన డబ్బాలు/ప్యాకెట్లను అలాగే బయట వదలవద్దు. ఇలా చేయడం వల్ల వాటి పునర్వినియోగాన్ని నివారించవచ్చు|
(3) ప్యాకెట్లు/డబ్బాలను పగలగొట్టి మడిచి జనావాసం నుండి దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టండి|

నిల్వ నిబంధనలు
(1) ఫంగిసైడ్ డబ్బాలను ఇతర వస్తువుల నుండి, ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా భవనాల నుండి దూరంగా గదుల్లో లేదా భవనాల్లో లేదా ప్రత్యేకంగా తాళం వేసిన అలమారాల్లో నిల్వ చేయాలి|
(2) ఫంగిసైడ్ నిల్వ కోసం ఉపయోగించే గదులు లేదా భవనాలు బలమైనవి, పొడిగా, వెలుతురు కలిగినవి మరియు గాలి ప్రసరణ ఉన్నవిగా ఉండాలి దీంతో ఆవిరి వల్ల కాలుష్యం జరగకుండా ఉంటుంది|

రసాయన సంయోజనము

క్ర.సం	ఘటకం	వివరణ బరువు
1	అజోక్సిస్ట్రోబిన్ (a.i.)	18.20 % బరువు/బరువు
2	డైఫెనోకోనాజోల్ (a.i.)	11.40 % బరువు/బరువు
3	(విక్షేపకం)	%
4	నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం, సోడియం ఉప్పు (ఫార్మాల్డిహైడ్‌తో సంకలనం)	1.22 % బరువు/బరువు
5	బ్లాక్ కోపాలిమర్ పి.ఓ./ఇ.ఓ.	1.13 % బరువు/బరువు
6	(ఫోమ్ నిరోధక పదార్థం)	%
7	పోలీడైమిథైల్ సిలోక్సేన్	0.79 % బరువు/బరువు
8	(గాఢం చేసే పదార్థం)	%
9	రేఖీయ పోలిసాకరైడ్	0.25 % బరువు/బరువు
10	(రక్షక పదార్థం)	%
11	1,2-బెంజిసోథియాజోల్-3 (2H)-వన్	0.03 % బరువు/బరువు
12	(తడిపే పదార్థం)	%
13	సెటిల్/స్టియారిల్-ఆల్కహాల్ ఎథాక్సిలేటెడ్	20.70 % బరువు/బరువు
14	నీరు	Q.S.
	మొత్తం	100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2% ಭಾ/ಭಾ + ಡೈಫೆನೋಕೋನಾಜೋಲ್ 11.4% ಭಾ/ಭಾ ಎಸ್.ಸಿ.
(ಅಂತಃಪ್ರವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2% ಭಾ/ಭಾ + ಡೈಫೆನೋಕೋನಾಜೋಲ್ 11.4% ಭಾ/ಭಾ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಂದು ಬಹುಉದ್ದೇಶದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಂತಃಪ್ರವಾಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಕ್ಷ ರೋಗ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬ್ಲೈಟ್ ರೋಗ ಮತ್ತು ತಡವಾದ ಬ್ಲೈಟ್ ರೋಗ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸಮಾರಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಲೆಮೇಲು ಬ್ಲೈಟ್, ಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ರೋಗ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ರೋಮಿಲ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ರೋಗ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ್ರತೆ:- 1. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಜ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. 3. ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮರು (ಸ್ಪ್ರೇ) ಬಳಸಬಾರದು।

ಶಿಫಾರಸು

		ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರ್				
ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗ/ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಎ.ಐ. (% ಸಂ. ಅಥವಾ ಮಿ.ಲೀ./ಲೀ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಮರುಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	5	
ಹತ್ತಿ	ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	12	-
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ	ಬ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	26	
ಈರುಳ್ಳಿ	ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲಾಚ್, ಸ್ಟೆಂಫಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	7	-
ಅಕ್ಕಿ	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೀತ್ ಬ್ಲೈಟ್	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	31	
ಕಬ್ಬು	ರೆಡ್ ರಾಟ್, ಸ್ಮಟ್ ಮತ್ತು ರಸ್ಟ್	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	400	265	-
ಟೊಮೇಟೊ	ಅರ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	5	
ಅರಿಶಿನ	ಲೀಫ್ ಬ್ಲಾಚ್, ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ರೈಜೋಮ್ ರಾಟ್	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	60	-
ಗೋಧಿ	ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	0.03% ಅಥವಾ 0.3 g/l	0.1% ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀಟರ್ ನೀರು	500	35	

ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಹವಾಮಾನ: ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಣ್ಣು- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ। ಬೆಳೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಯ, ಉಪಕರಣಗಳು, ನೋಜಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಪಡಣೆ ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳು- ಉತ್ಪನ್ನದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಳಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ತ ನೋಜಲ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ 1-2 ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ (ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ) ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಮರುಪ್ರವೇಶ: ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಹನಿಗಳು ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಒಣಗುವ ಮೊದಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ। ಸಿಂಪಡಣೆ ನಂತರ ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ: ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು
ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಕೆಯ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ (ಕೈಗವಸುಗಳು, ಮುಖವಸ್ತ್ರ, ಕಣ್ಣಿನ ಕನ್ನಡಿ, ಬೂಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ). ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ, ಬಳಕೆಯ ವೇಳೆ ಧೂಮಪಾನ, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕಲಸಲು ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ, ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಸಾಂದ್ರ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯಿರಿ। ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಜೊತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು। ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.
2. ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
3. ಲೀಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು (ಡಬ್ಬಿಗಳು) ನಾಶಪಡಿಸಿ.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಮಣಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವುದು, ಕಾಲುಗಳ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಉದ್ದವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ನಿಧಾನವಾಗುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಚರ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಉಸಿರಾಟ: ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.
ವಿಷದ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ: ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣು ಸಂಪರ್ಕ: ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛ ದ್ರವ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ನೀಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸೂಚನೆ: ರೋಗಿ ಅಚೇತನವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ : ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ವಿಷನಾಶಕ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ
(1)ಸಿಂಪಡಣೆ ನಂತರ ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಉಳಿದ ದ್ರಾವಣ/ಪದಾರ್ಥ, ಯಂತ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
(2) ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳು/ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
(3) ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು/ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮಡಚಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು
(1) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
(2) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಲವಾದ, ಒಣ, ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಇರುವಂತಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು।

ಕ್ರ.ಸಂ	ಘಟಕ	ವಿವರಣೆ ತೂಕ
1	ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ (a.i.)	18.20 % ತೂಕ
2	ಡೈಫೆನೋಕೋನಾಜೋಲ್ (a.i.)	11.40 % ತೂಕ
3	(ವಿಕ್ಷೇಪಕ)	%
4	ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು (ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ)	1.22 % ತೂಕ
5	ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಪಿ.ಒ./ಇ.ಒ.	1.13 % ತೂಕ
6	(ಫೋಮ್ ತಡೆಯುವ ಏಜೆಂಟ್)	%
7	ಪಾಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.79 % ತೂಕ
8	(ಗಾಢೀಕರಕ)	%
9	ರೇಖೀಯ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್	0.25 % ತೂಕ
10	(ಸಂರಕ್ಷಕ)	%
11	1,2-ಬೆಂಜಿಸೋಥಿಯಾಜೋಲ್-3 (2H)-ವನ್	0.03 % ತೂಕ
12	(ತೇವಕಾರಕ)	%
13	ಸೆಟಿಲ್/ಸ್ಟಿಯಾರಿಲ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್	20.70 % ತೂಕ
14	ನೀರು	Q.S.
	ಒಟ್ಟು	100 % ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೀಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

അസോക്സിസ്ട്രോബിൻ 18.2% ഭാ/ഭാ + ഡൈഫെനോകോണാസോൾ 11.4% ഭാ/ഭാ എസ്.സി.
(അന്തഃപ്രവാഹി ഫംഗിസൈഡ്)

അസോക്സിസ്ട്രോബിൻ 18.2% ഭാ/ഭാ + ഡൈഫെനോകോണാസോൾ 11.4% ഭാ/ഭാ എസ്.സി. ഒരു ബഹുപയോഗ ഫംഗിസൈഡാണ്, ഇതിൽ പ്രധാന രോഗകാരകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അന്തഃപ്രവാഹ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുണ്ട്. ഇത് മുളകിൽ രൂക്ഷ രോഗവും പൊടിപ്പൂപ്പൽ രോഗവും, തക്കാളി വിളയിൽ അഗേതി ബ്ലൈറ്റ് രോഗവും വൈകിയ ബ്ലൈറ്റ് രോഗവും, നെല്ലിൽ സഹസമാരി രോഗവും ഇലമൂട് ബ്ലൈറ്റ്, മക്കയിൽ ബ്ലൈറ്റ് രോഗവും മൃദു രോമിൽ പൂപ്പൽ രോഗവും, ഗോതമ്പിൽ കരിപ്പൂപ്പൽ രോഗവും പൊടിപ്പൂപ്പൽ രോഗവും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ശുപാർശ

		അളവ്/ഹെക്ടറിന്				
വിളകൾ	രോഗം/കീടത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	എ.ഐ. (% സം. അല്ലെങ്കിൽ മി.ലി./ലി.)	ഫോർമുലേഷൻ	വെള്ളത്തിൽ കലക്കേണ്ട അളവ് (ലിറ്റർ/ഹെക്ടർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസങ്ങൾ)	ഓരോ പ്രയോഗത്തിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശനം (മണിക്കൂറുകളിൽ)
മുളക്	ആന്ത്രാക്നോസ് മറ്റും പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	500	5	
പരുത്തി	ലീഫ് സ്പോട്ട് മറ്റും ഗ്രേ മിൽഡ്യൂ	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	500	12	-
മക്കാ	ബ്ലൈറ്റ് മറ്റും ഡൗണി മിൽഡ്യൂ	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	500	26	
ഉള്ളി	പർപ്പിൾ ബ്ലോച്ച്, സ്റ്റെംഫിലിയം ബ്ലൈറ്റ് മറ്റും ഡൗണി മിൽഡ്യൂ	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	500	7	-
നെല്ല്	ബ്ലാസ്റ്റ് മറ്റും ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റ്	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	500	31	
കരിമ്പ്	റെഡ് റോട്ട്, സ്മട്ട് മറ്റും റസ്റ്റ്	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	400	265	-
തക്കാളി	എർലി ബ്ലൈറ്റ് മറ്റും ലേറ്റ് ബ്ലൈറ്റ്	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	500	5	
മഞ്ഞൾ	ലീഫ് ബ്ലോച്ച്, ലീഫ് സ്പോട്ട് മറ്റും റൈസോം റോട്ട്	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	500	60	-
ഗോതമ്പ്	റസ്റ്റ് മറ്റും പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	0.03% അല്ലെങ്കിൽ 0.3 g/l	0.1% അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി./ലിറ്റർ വെള്ളം	500	35	

ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
കാലാവസ്ഥ: മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും ഉള്ളപ്പോൾ തളിക്കൽ നടത്തരുത്. മണ്ണ്- മണ്ണിൽ ആവശ്യമായ ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തളിക്കൽ നടത്താവൂ. വിളയുടെ അവസ്ഥ, ഉപയോഗത്തിന്റെ രീതി, സമയം, ഉപകരണങ്ങൾ, നോസിൽ തരം, തളിക്കലും ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ- ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ യോജ്യമായ അളവ് എടുക്കുക, അത് കുറച്ച് വെള്ളവുമായി നന്നായി കലക്കുക. നിർദ്ദിഷ്ട അളവ് ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലക്കി ചേർക്കുക, ഹോളോ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അനുയോജ്യമായ നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നാപ്സാ ക്സ്പ്രേയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അനുയോജ്യമായ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ വിളയിലും 1-2 തവണ തളിക്കുക (രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് തളിക്കൽ ആവർത്തിക്കുക) ശരിയായ സമയത്ത്, മുകളിൽ പറഞ്ഞ രോഗാക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ നടത്തുക. വീണ്ടും പ്രവേശനം: തളിച്ച തുള്ളികൾ വിളയിൽ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വയലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്| തളിച്ചതിന് ശേഷം കാലിയായ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ഉപയോഗിച്ച പാക്കുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന തടയാൻ ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ പുറത്തേക്ക് കാലിയായി വിടരുത്|

ഉപയോഗ സമയം: സിഐബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക

ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ
ഉപയോഗത്തിനുശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക (കൈയുറകൾ, മുഖമാസ്ക്, കണ്ണാടി, ബൂട്ടുകൾ മുതലായവ). ശ്വാസം വഴി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുകവലി, ഭക്ഷണം, പാനം

മറ്റും ചവയ്ക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യരുത്. സ്പ്രേ ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കാൻ പാചക പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. സ്പ്രേ ദ്രാവകം കലക്കാൻ മരക്കോൽ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായ ശേഷം കൈകൾ സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കുകയും തളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ചർമ്മം, കണ്ണുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഫംഗിസൈഡിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക. സാന്ദ്രമായ ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ മിശ്രിതം മൂലം മലിനമായാൽ ചർമ്മം ഉടൻ നന്നായി കഴുകുക, കണ്ണുകൾ മതിയായ വെള്ളത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് കഴുകുക. ഉപയോഗത്തിനുശേഷം സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ നന്നായി ശുചീകരിക്കുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകുക. ഈ ഉൽപ്പന്നം മത്സ്യകൃഷി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും നെൽ കൃഷിയോടൊപ്പം വിള കൃഷി നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വിഷമാണ്.
മുന്നറിയിപ്പുകൾ: 1. ലേബലിലും ലീഫ്ലെറ്റിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം വിളകളിലും കീടങ്ങളിലുമുപയോഗിക്കരുത്.
2. വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കരുത്.
3. ലീഫ്ലെറ്റിൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുക, കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി വീതി കൂടുക, കാലുകളുടെ പിൻവലിക്കൽ, കുറവ് പ്രതികരണം, ദീർഘശ്വാസം എടുക്കൽ, ശ്വാസത്തിന്റെ വേഗത കുറയുക എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

ആദ്യ ശുശ്രൂഷ
ചർമ്മ സ്പർശം: മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക.
ശ്വസനം: ബാധിച്ച വ്യക്തിയെ മലിനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറിയിലേക്കോ തുറസ്സായ സ്ഥലത്തേക്കോ മാറ്റുക, ചൂടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക.
വിഷബാധ സംശയമുള്ള പക്ഷം: ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക.
കണ്ണ് സ്പർശം: കണ്ണിമകൾ വേർതിരിച്ച് കണ്ണുകൾ ഉടൻ ശുദ്ധജലം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ദ്രാവകം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക, ഉടൻ
ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക.
വിഴുങ്ങിയാൽ: മതിയായ വെള്ളത്തോടൊപ്പം തുടർച്ചയായി മെഡിക്കൽ ചാർക്കോൾ നൽകുക. കൂടുതൽ അളവിൽ സാന്ദ്ര ദ്രവ്യം വിഴുങ്ങിയാൽ
ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. കുറിപ്പ്: രോഗി ബോധരഹിതനാണെങ്കിൽ വായിലൂടെ ഒന്നും നൽകരുത്. ഛർദ്ദി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

സസ്യവിഷാംശം : സിഐബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക

പ്രതിവിഷം
പ്രത്യേകമായ പ്രതിവിഷം ഇല്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുക.

കാലിയായ കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നശീകരണം
(1) തളിച്ചതിന് ശേഷം കാലിയായ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്, അതിനാൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ കണ്ടെയ്നറുകൾ, ശേഷിച്ച ദ്രാവകം/പദാർത്ഥം, യന്ത്രങ്ങളുടെ കഴുകൽ, കാലിയായ കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നശീകരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നടത്തുക.
(2) ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ/പാക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഇതിലൂടെ അവയുടെ വീണ്ടും ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാം.
(3) പാക്കറ്റുകൾ/കണ്ടെയ്നറുകൾ തകർത്തു വളച്ച് ജനവാസത്തിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള മണ്ണിൽ മൂടി വെക്കുക.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
(1) ഫംഗിസൈഡിന്റെ കണ്ടെയ്നറുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽ നിന്ന് അകലെ മുറികളിലോ കെട്ടിടങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടിയ അലമാരകളിലോ സൂക്ഷിക്കണം.
(2) ഫംഗിസൈഡ് സംഭരണത്തിനുള്ള മുറികളും കെട്ടിടങ്ങളും ശക്തമായതും വരണ്ടതും പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമായിരിക്കണം
അതുവഴി ആവിയിൽ നിന്ന് മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

രാസ ഘടന

ക്രമ സംഖ്യ	ഘടകം	ഭാരം
1	അസോക്സിസ്ട്രോബിൻ എ.ഐ.	18.20 % ഭാരം/ഭാരം
2	ഡൈഫെനോകോണാസോൾ എ.ഐ.	11.40 % ഭാരം/ഭാരം
3	(വിതരണകാരി)	%
4	നാഫ്തലീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ്, സോഡിയം ലവണ രൂപം, ഫോർമാൽഡിഹൈഡുമായി സംയോജിപ്പിച്ചത്	1.22 % ഭാരം/ഭാരം
5	ബ്ലോക്ക് കോപോളിമർ പി.ഒ/ഇ.ഒ.	1.13 % ഭാരം/ഭാരം
6	(നുര തടയുന്ന ഏജന്റ്)	%
7	പോളിഡൈമെതിൽ സിലോക്സേൻ	0.79 % ഭാരം/ഭാരം
8	(കട്ടിയാക്കുന്ന വസ്തു)	%
9	രേഖീയ പോളിസാക്കറൈഡ്	0.25 % ഭാരം/ഭാരം
10	(സംരക്ഷകം)	%
11	1,2-ബെൻസിസോതിയാസോൾ-3 (2H)-വൺ	0.03 % ഭാരം/ഭാരം
12	(വെറ്റർ)	%
13	സെറ്റിൽ/സ്റ്റീയറിൽ-ആൽക്കഹോൾ എതോക്സിലേറ്റഡ്	20.70 % ഭാരം/ഭാരം
14	വെള്ളം	Q.S.
	മൊത്തം	100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലീഫ്ലെറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ایزوکسسٹروبن 18.2% بھا/بھا + ڈائیفینوکونازول 11.4% بھا/بھا ایس-سی-
(اندرونی نظامی پھپھوندی کش)

ایزوکسسٹروبن 18.2% بھا/بھا + ڈائیفینوکونازول 11.4% بھا/بھا ایس-سی- ایک کثیر المقاصد پھپھوندی کش ہے جس میں اہم مرض پیدا کرنے والے عوامل کے کنٹرول کے لیے اندرونی نظامی فعالیت موجود ہے۔ اس کی سفارش مرچ میں خشک مرض اور سفوفی پھپھوندی مرض، ٹماٹر کی فصل میں ابتدائی جھلساؤ اور تاخیر سے جھلساؤ، دھان میں سہسماری مرض اور پتوں کا جھلساؤ، مکئی میں جھلساؤ مرض اور نرم روئیں دار پھپھوندی اور گندم میں زنگ مرض اور سفوفی پھپھوندی کے کنٹرول کے لیے کی جاتی ہے۔ احتیاط:- ۱- اس مصنوعات کا استعمال ان مقامات پر ممنوع ہے جہاں مچھلی پالی جاتی ہو یا دھان کی کاشت کے ساتھ مچھلی پالی جاتی ہو۔ ۲- یہ کیڑے مار مرکب مچھلیوں اور دیگر آبی جانداروں کے لیے زہریلا ہے اس لیے اسے مچھلی پالنے میں یا اس کے قریب استعمال نہ کریں۔ ۳- مزاحمتی صلاحیت کی نشوونما کو روکنے کے لیے اس کیڑے مار مرکب کو منظور شدہ فصلوں میں بار بار (اسپرے) استعمال نہ کریں۔

سفارش

		مقدار/فی ہیکٹر				
فصل(یں)	بیماری/کیڑے کا عام نام	اے- آئی- (% ارتکاز یا ملی لیٹر/لیٹر)	فارمولیشن	پانی میں محلول (لیٹر/ہیکٹر)	آخری سپرے سے کٹائی تک وقفہ (دن)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹوں میں)
مرچ	اینتھراکنوز اور پاؤڈری ملڈیو	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	500	5	
کپاس	لیف اسپاٹ اور گرے ملڈیو	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	500	12	-
مکئی	بلائٹ اور ڈاؤنی ملڈیو	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	500	26	
پیاز	پرپل بلاچ، اسٹیمفیلیم بلائٹ اور ڈاؤنی ملڈیو	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	500	7	-
دھان	بلاسٹ اور شیتھ بلائٹ	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	500	31	
گنا	ریڈ راٹ، سمٹ اور رسٹ	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	400	265	-
ٹماٹر	ارلی بلائٹ اور لیٹ بلائٹ	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	500	5	
ہلدی	لیف بلاچ، لیف اسپاٹ اور رائیزوم راٹ	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	500	60	-
گندم	رسٹ اور پاؤڈری ملڈیو	0.03% یا 0.3 g/l	0.1% یا 1 ملی لیٹر/لیٹر پانی	500	35	

استعمال کے لیے ہدایات
موسم: بارش اور تیز ہوا کے دوران چھڑکاؤ نہ کریں۔ مٹی- مٹی میں جب مناسب نمی ہو تب ہی چھڑکاؤ کریں۔ فصل کی حالت، استعمال کا طریقہ اور وقت، آلات، نوزل کی قسم، چھڑکاؤ اور محلول تیار کرنے سے متعلق ہدایات- مصنوعات کی مناسب مقدار لیں اور اسے تھوڑے پانی کے ساتھ اچھی طرح ملائیں۔ مقررہ مقدار کو باقی پانی میں اچھی طرح ملا کر ہلائیں اور ہولو کون یا دیگر مناسب نوزل کا استعمال کرتے ہوئے نیپ ساک اسپریئر یا دیگر مناسب اسپریئر کے ذریعے پوری فصل پر 1-2 مرتبہ چھڑکاؤ کریں (بیماری کی شدت کے مطابق دہرائیں) مناسب وقت پر کریں جب مذکورہ حملہ ہو چکا ہو۔ دوبارہ داخلہ: چھڑکاؤ کے قطرے فصل پر خشک ہونے سے پہلے کھیت میں داخل نہ ہوں۔ چھڑکاؤ کے بعد خالی ڈبوں کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ استعمال شدہ پیک کو دوبارہ استعمال سے بچانے کے لیے استعمال شدہ ڈبوں کو باہر خالی نہ چھوڑیں۔

استعمال کا وقت: سی آئی بی ہدایات کا حوالہ لیں

استعمال کنندگان کے لیے احتیاطی تدابیر
استعمال کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیں۔ استعمال کے دوران حفاظتی لباس پہنیں (دستانے، چہرے کا ماسک، چشمہ، جوتے وغیرہ)۔ سانس کے ذریعے اندر جانے سے بچیں، استعمال کے دوران تمباکو نوشی، کھانا، پینا اور چبانا نہ کریں۔ اسپرے محلول تیار کرنے کے لیے کھانا پکانے کے برتن استعمال نہ کریں۔ اسپرے محلول کو ملانے کے لیے لکڑی کی چھڑی استعمال کریں۔ کام مکمل ہونے کے بعد ہاتھوں کو صابن اور زیادہ پانی سے دھوئیں۔ محلول تیار کرنے اور چھڑکاؤ کے دوران، جلد، آنکھوں اور کپڑوں کو پھپھوندی کش کے رابطے سے بچائیں۔ مرتکز مادہ یا چھڑکاؤ مرکب سے آلودہ ہونے پر جلد کو فوراً اچھی طرح دھوئیں اور آنکھوں کو مناسب پانی سے 15 منٹ تک دھوئیں۔ استعمال کے بعد حفاظتی آلات کو اچھی طرح صاف کریں۔ آلودہ کپڑوں کو دوبارہ استعمال سے پہلے دھوئیں۔ اس مصنوعات کا استعمال ان مقامات پر ممنوع ہے جہاں مچھلی پالی جاتی ہو یا دھان کی کاشت کے ساتھ فصل کی کاشت کی جاتی ہو۔

مچھلیوں کے لیے زہریلا ہے۔
احتیاط: 1- لیبل اور پمفلٹ میں درج نہ ہونے کی صورت میں اس کا استعمال فصلوں اور کیڑوں پر نہ کریں۔
2- فصل کی کٹائی کے بعد اس کا استعمال نہ کریں۔
3- پمفلٹ میں دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال شدہ کنٹینرز (ڈبے) کو تلف کریں۔

زہر کی علامات
زہریلے اثرات کی علامات جیسے سرگرمی میں کمی، آنکھ کی پتلی کا پھیلنا، ٹانگوں کو پیچھے ہٹانا، کم رد عمل، لمبی سانس لینا اور سانس کی رفتار کا سست ہونا ہو سکتی ہیں۔

ابتدائی طبی امداد
جلد کا رابطہ: آلودہ کپڑے اتاریں اور متاثرہ حصوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
سانس کے ذریعے: متاثرہ شخص کو آلودہ جگہ سے ہوادار کمرے یا کھلی جگہ لے جائیں اور درجہ حرارت سے بچائیں۔
زہریلے پن کا شبہ ہو تو: فوراً طبی مشورہ حاصل کریں۔
آنکھوں کا رابطہ: پلکوں کو الگ کر کے آنکھوں کو فوراً صاف محلول یا صاف پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
نگلنے کی صورت میں: مناسب مقدار میں پانی کے ساتھ مسلسل میڈیکل چارکول دیں۔ زیادہ مقدار میں مرتکز مادہ نگلنے پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ نوٹ: اگر مریض بے ہوش ہو تو منہ کے ذریعے کچھ نہ دیں۔ قے کرانے کی کوشش نہ کریں۔

فائٹوٹاکسی سٹی: سی آئی بی ہدایات کا حوالہ لیں

زہر کش
کوئی خاص تریاق دستیاب نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کا تصفیہ
(1) چھڑکاؤ کے بعد خالی ڈبوں کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے ڈبوں، باقی ماندہ محلول/مادہ، مشینوں کی صفائی اور خالی ڈبوں کا تصفیہ محفوظ جگہ پر کریں۔
(2) استعمال شدہ ڈبوں/پیکٹوں کو اس طرح باہر نہ چھوڑیں۔ اس طرح ان کے دوبارہ استعمال سے بچا جا سکتا ہے۔
(3) پیکٹوں/ڈبوں کو توڑ مروڑ کر آبادی سے دور زمین میں دبا دیں۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط
(1) پھپھوندی کش کے ڈبوں کو دیگر اشیاء خصوصاً خوراکی اشیاء کے ذخیرہ کے لیے استعمال ہونے والے کمروں یا عمارتوں سے دور کمروں یا عمارتوں میں یا علیحدہ مقفل الماریوں میں رکھیں۔
(2) پھپھوندی کش کے ذخیرہ کے لیے استعمال ہونے والے کمرے یا عمارتیں مضبوط، خشک، روشن اور ہوادار ہونی چاہئیں تاکہ بخارات سے آلودگی نہ ہو سکے۔

کیمیائی ساخت

نمبر	جزو	وزن
1	ایزوکسسٹروبن (a.i.)	18.20 % وزن/وزن
2	ڈائیفینوکونازول (a.i.)	11.40 % وزن/وزن
3	(منتشر کرنے والا)	%
4	نیفتھلین سلفونک ایسڈ، سوڈیم نمک (فارملڈیہائیڈ کے ساتھ مرکب)	1.22 % وزن/وزن
5	بلاک کوپولیمر پی او/ای او	1.13 % وزن/وزن
6	(جھاگ روکنے والا ایجنٹ)	%
7	پولی ڈائی میتھائل سیلوکسان	0.79 % وزن/وزن
8	(گاڑھا کرنے والا)	%
9	خطی پولی سیکرائیڈ	0.25 % وزن/وزن
10	(محافظ)	%
11	1,2-بینزیسوتھیازول-3-(2H)-ون	0.03 % وزن/وزن
12	(گیلا کرنے والا)	%
13	سیٹل/سٹیریل الکحل ایتھوکسیلیٹڈ	20.70 % وزن/وزن
14	پانی	Q.S.
	کل	100 % وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu