

बैसीलस सभटिलिस 1.50% LF

बाएिँडि ढॅंगीसायीड उरल ढावभुलेस्रन (CFU 1 × 10⁸ / ml **थॅटे-थॅट**)
(T Stanes – Bs-1 Stain Accession No. MTCC 25072)

सटैनस सटिँड (बैसीलस सभटिलिस 1.50% LF) णिँ बाएिँडि ढॅंगीसायीड हें जें टाटार विँच अकसी बस्रायीट ठेग। अउं केले विँच सिगारैका ठेग। हे पुडावसाीं निरुपेकृत लसी बरडियां ज़ांदा ह।

ढसल दा नाम	निशान ठेग। दा आम नाम	छुंविड अदबी	ढावभुलेस्रन	पटी विँच भेल
टाटार	अरसी बस्रायीट	—	3 सीटर	500 सीटर
टाटार	अरसी बस्रायीट	—	10 मिसीसीटर पूंजी किलोग्राम बीस	—
केला	सिगारैका	0	5 सीटर	750 सीटर

सिङ्गारबः- सारटी सामल बरें
बढवँ हें निरुदेसः
मनबुुरसुदा पुुराबं 'उे बीसि छुपचार अउे पँडिआं 'उे ङिङ्गकां वजें सुडांऐ अतुसाव पाटी विँच भेल केे लगारह।

मैमकी सधिउीआं:
पुँप ढाले टिलर विँच खुँले अममल ठेइ।

मिंटी अउे पाटी:
सारीआं बिसमं।
ङ्गसल टी अदसबाः
केले टी ङ्गसल हे बतनसपडी अउं पुनतन पडाआं टॅरान सिगारैका ठेग। हे सुुुु ठेट 'उे पँडिआं 'उे ङिङ्गकां, अउे टाटार लसी तनसरी बिसाटी ममं बीस छुपचार अउे अरसी बस्रायीट ठेग। हे सुुु ठेट 'उे पँडिआं 'उे ङिङ्गकां।

ङिङ्गकां उकलीबः
सिङ्गारजं अतुसाव बीस छुपचार अउे पँडिआं 'उे ङिङ्गकांम।

साजे-सामनः
बीस छुपचार लसी बरउउे हे दसगाने जं ङ्गमं अउे पँडिआं 'उे ङिङ्गकां लसी वेले ठेने न्नेसल ढाला नैपसै सामग।

पुुराबः
केला – पँडिआं 'उे ङिङ्गकां 5 लिटर पूंजी ठुकेटाइर।
टाटार – बीस छुपचार 10 ml पूंजी बिँले बीस अउे पँडिआं 'उे ङिङ्गकां 3 लिटर पूंजी ठुकेटाइर।

मिलाछुटे हे निरुदेसः
बिसाटी उें पघिलां टाटार हे चीजं नाल लेङ्गीटी माउरा विँच बाएिँडि छुउपाद मिलाछ। केले अउे टाटार टी ङ्गसल 'उे पँडिआं हे ङिङ्गकां लसी, बस्राटी जं ङ्गमं विँच बेउे पाटी नाल लेङ्गीटी माउरा मिलाछ, लँउउे टी ङ्गसी नाल रंणी उगुं मिलाछ अउे बस्री पाटी सिङ्गारब अतुसाव 750 लिटर पूंजी ठुकेटाइर जं 500 लिटर पूंजी ठुकेटेअर पारं। ठेग हे सुुु ठेट 'उे उरसीगी उँठ 'उे सहेवे जं साम ठे ममं पँडिआं 'उे ङिङ्गकां कवे। डुरगराँडि ङिङ्गकां 15 टिलर हे अँउराल 'उे लेङ अतुसाव कवे।

दुबारा पेउ विँच दापले टी मिंगादः 12 थँटे।
ढावी उें पघिलं दा अँउराल (PHI): 0
बढवँ दा ढँगा अउे सामं:
नगरसी बिसाटी ममं बीस छुपचार अउे ठेग। हे सुुु ठेट 'उे उरसीगी उँठ 'उे सहेवे जं साम ठुं ङ्गसल 'उे ङिङ्गकां **ङिङ्गकां दा ममं:**
सहेवे जं साम ठे ममं ङिङ्गकां कवे।

वँच उें वँप ङिङ्गकां टी गिउटी:
बिसाटी उें पघिलां टाटार दा बीस छुपचार अउे केले अउे टाटार टी ङ्गसल 'उे 15 टिलर हे अँउराल जं 2-3 ढाव ङिङ्गकां लेस अतुसाव।

पिगान देट वेगः
बाएिँडिमनटीगडी ङुं ङ्गसल पँकट दे ठेउे अउे ढावी उें अँन पघिलां लगीं लगारुआं चारुीदा।
लाउकली बीकिआं लसी सादपाटीआं:
सहेवे जं साम ठुं ङिङ्गकां कवे।

जघिर दे लँडटः
केली भाम लँडट नाहीं। गलॉबि, सिरदकर, छुलटीआं अउे मउसी हे सकरी ह।
मुँबल्ली सगारुिडाः
(1) जें निगल लिमा ठेवे: गले हे पिढाले हिंमे ठुं गुरुदुगा के छुलटी बरढाव।
(2) जें साच राणी अँदर लिमा ठेवे: मूढीज ठुं खुँसुं रढा विँच लै जाँद।
(3) चमडी नाल सँपकर ठेट 'उे: पुब पाटी अउे सगउ नाल सवे।
(4) अँधं नाल सँपकर ठेट 'उे: अम सैलानी पटी नाल 10-15 मिंट लसी अँधं वेहें।

अँटीडेट बिसातः
लँडटां अतुसाव टिलस कवे।

सुडंमिमा सादपाटीआं:
भेल डिअर करवे ममं ङिँटिआं बारन साच अउे चमडी नाल सँपकर उें बवे। न्नेगे रँषां नाल ना मिलाछ।
उरवेक रंमं उें बाअर, मिलाछुटे अउे ङिङ्गकां करन ढाले सजे-सामन ठुं पुब पाटी नाल रंणी उगुं वेहें। ढाव भेल ठुं चेउां, खसुं जं ढरिँडे पाटी विँच ना सुँट। बढवँकार पुुरा सुडंमिमा कँपडा पघिले। बाएिँडिलिँजीकल ढॅंगीसायीड टी बढवँ टॅरान सिगरटलेसी, ढाटा जं पीटा ना कवे।

सटेनेस हे निरुदेसः
(1) बाएिँडि-ढॅंगीसायीड ढाले पेलेज वँपवे कभरे जं अगउे विँच सटेन कवे जें ढाटे-पीटी टीगं चीजं हे सटेनेस उें दुर वेहे जं माउरा अउे सुडाआं अतुसाव वँपटीगं अलमारीगं विँच उासा लडा के रंथं।
(2) सटेनेस ढाले कभरे जं अगउे रंणी उगुं बढे ठेवे, सुँठे, रंणी उगुं ठेकनी ढाले अउे रढादार ठेवे चारुीदे गत अउे डाङ्ग नाल पुसुसट उें बउट लसी क़डीं ढँडे ठेवे चारुीदे गत।

चेउावली बिसातः
लेखल अउे पवर हे उँमे छुऐजं उें टिल्लाढ बिमे ठेवे छुऐचे लसी टी पारं। बढवे विँच रंमे अतुसाव बढवँ उें दुबरा ङँडे ठुं नकट कवे।
बढवे गडे ङँडिआं दा लिपटारः
(1) छुउपादकं, ढावभुलेटारं अउे आपढेटारं टी सिमेढारी ह कि पेकेजं, ढावु मसंगरी अउे मसीनं टी घुलसी अउे ङँडिआं दा लिपटार। सुडंमिलउ उलीके नाल कीडा ज़ावे उां जे वाउावट अउे पाटी पुसुसट ना ठेवे।
(2) धाली ङँडिआं टी दुबारा बढवँ भउरनक ह। बढवे गडे पेकेजं ठुं बाघर नलॉ ङँडटा चारुीदा उां जें छुटनं टी दुबारा बढवँ ना ठे सवे।
(3) पेकेजं ठुं उँउे के बँडें जं दुर रंथ दिँडा जावे।

	समँगरी	% ङार/ङार
बैसिलस सभटिलिस (सपेव अउे माटिमीसीअल थँड) (CFU 1 × 10 ⁸ /मि.सी. थॅटे-थॅट)		1.50%
ढापा मपिआं		96.00%
ढैग्या सेरँट (ग़ा़िलसरेल)		0.50%
परासट ससिरवारक (पीवीपी K-30)		2.00%
वुँल		100.00%

भेसिलस सभिटलिस 1.50% भेल.भेङ्.

ज़ैविङ डूगनाशङ प्रवाडी ड़ाभ्युलेशन (CFU 1 × 10⁸ / मि.टी. न्यूनतम)
(T Stanes – Bs-1 Stain Accession No. MTCC 25072)

भेसिलोड्रिङस (भेसिलस सभिटलिस 1.50% भेल.भेङ्.) भेङ ज़ैविङ डूगनाशङ छे, ज़े टमेटांमं थता अर्ली पलाइट रोग अने डेणामं थता सिगाटोङ रोगान् असरडारड निबंउग। माटे उषयोग। छे.

पाङनुं नाम	लक्ष्य रोगनुं सामान्य नाम	राड ज़ेपाानी अवधि	ड़ाभ्युलेशन	पाएीमं द्रावण
टमेटा	अर्ली प्लाइट	—	3 लिटर	500 लिटर
टमेटा	अर्ली प्लाइट	—	10 मिेली प्रति डिलेग्राम भोज	—
डेण।	सिगाटोङ	0	5 लिटर	750 लिटर

उषयोग माटेनी सूचनाओ
भलामछ डरेली मआममं पाएीमं भेणवीमे भोज उषचार तथा पहायि छंङडव तरीडे उषयोग डरवे।

डवामम परिस्थिति-भुल्लुं आडाश अने सूरीप्रडाशवाण।
हिवसओमं उषयोग डरवे।जमीन अने पाएीने प्रडाश **तमाम प्रडाशनी जमीन अने पाएी माटे भोउय.**

उषयोग माटे पाङनी अवस्था-डेणाम। पाङनी वानस्पतिक वुट्टि तथा प्रजनन अवस्था दशमिशन सिगाटोङ रोगमा प्रारंभिक लक्षणे हेभाय त्वाडे पहायि छंङडव डरवे। टमेटाम पाङमं नर्सरीमं वावणी समये भोज उषचार डरवी अने त्वाशआव वानस्पतिक वुट्टि तथा प्रजनन अवस्था दशमिशन अर्ली प्लाइट रोगमा प्रारंभिक लक्षणे हेभाय त्वाडे पहायि छंङडव डरवे।

उषयोग डरवानी पद्धति-भलामछ।
मुशभ भोज उषचार तथा पहायि छंङडव डरवे।

उषयोगमं लेवानी साधने-भोज उषचार माटे उमरना ड़ावमोजे अथवा ड़मने उषयोग डरवे। पहायि छंङव माटे छेले ड़ेन नोअन लगवेव बोज पर वदन ड़री ङडाब तथा छेङडव यंत्रणे उषयोग डरवे।

मात्रा - डेण।: पहायि छंङडव माटे 5 लिटर प्रति हेक्टर - टमेटा: भोज उषचार माटे 10 मिेली प्रति डिलेग्राम भोज तथा पहायि छंङव माटे 2 लिटर प्रति हेक्टर

मिश्रण माटेनी सूचनाओ- वावणी पहेलं टमेटान भोज साबे ज़रुडी मआममं ज़ैविक उषावन सरी रीते मिश्रित ड़वे. डेण। अने टमेटान पाङमं पहायि छंङव माटे ज़रुडी मआममं ज़ैविक उषावनने जाट्टी अथवा ड़ममं बोडा पाएी साबे भेणवे। लाङनी जाङक वडे सरी रीते दलवाे अने भलामछ।
मुशभ प्रति हेक्टर 750 लिटर (डेण। माटे) अथवा 500 लिटर (टमेटा माटे) पाएी भेमेरी द्रावण तैयार ड़वे. रोगमा प्रारंभिक लक्षणे हेभाय त्वाडे सवारे अथवा सांण। समये पहायि छंङडव डरवे। ज़रुडिशत मुशभ 15 दिवसना अंतरे पुनःछंङडव डरवे।

पुनःप्रवेश अवधि-12 ड़लस
ङापणी पूर्व अवधि-0 दिवस
उषयोग डरवानी रीत अने समय-नर्सरीमं वावणी समये भोज उषचार डरवे। अने रोगमा प्रारंभिक लक्षणे हेभाय त्वाडे पाड पर पहायि छंङडव डरवे। छंङडव वडेली सवारे अथवा सांण। समये डरवे वधु योउय छे.

छंङडवनी समय-वडेली सवारे अथवा सांण। समये छंङडव डरवे।

छंङडवनी अवधर्नतन अने मडतम ड़ेव्या-टमेटाम। पाङमं वावणी पहेलं भोज उषचार डरवे। डेण। अने टमेटान। पाङमं ज़रुडिशत मुशभ 15 दिवसना अंतरे र ड़ी उ वजन पहायि छंङडव डरवे। पाङनी अेवी अवस्था ज़खारे उषयोग न डरवे।-ज़ैविक डूगनाशङनो उषयोग पाड परिपक्व थवानी नछुड अथवा ङापणी पहेलं ततन डरवे।मडमामी अने अमल लाभदेगड ज़ुवजंतुओम रक्षण माटेनी सावयेतीओ

सावयेती-मडमामी तथा अन्य लाभदेगड ज़ुवजंतुओमे नुससन न थाय ते माटे वडेली सवारे अथवा सांण। समये छंङडव डरवे।

विषाडतन।म लक्षणे-डीह थोडस लक्षणे।
जाएली नयी. तेन छातं मथामे।
ड़ुमाओ, छेटी अने छमडा आदी राडे छे.

प्राथमिक सावधान-1.गणी ज़वाबी: ज़े छे।उषावन गणी लेवामं आब्युं छेय ते गणमा पाछण।म।
भ।ममं ड़गणी छेण।म आपी छेली ड़ववी।2.खास द्वा़रा अंदर ज़वाबी: असरअसत व्यडितने ततन ज़ भुल्लवी अने त।छु।
ड़वामं लछं ज़वे।
3.यामडीम।
संपर्कमं आवे ते: यामडी अथवा ड़पाडं द्रुमिच धावे।
छेय ते पूरता प्रमादामं पाएी अने साभुबी सरी रीते ड़ीह नाभव।
4.आंभमं ज़ाय ते: आंभे छुपित बछं छेय ते।
10 बी।
15 मिनिट सूची सामान्य क्षमयुक्त पाएीबी सारी रीते ड़ोवी.

प्रतिछेप-लक्षणे। अनुसार सावधान ड़रवी.

सुरक्षा सावयेतीओ- 1.द्रावण तैयार ड़रनी वमते छांटा पडवाबी अथवा ड़ोण।छं ज़वाबी खास द्वा़रा अंदर ज़वा अने यामडीम।
संपर्कवी अयधुं 2.भुल्लव।
डावबी मिश्रण न ड़रवुं 3.उरेड उषयोग पढी मिश्रण अने छंङडवना साधनेमे पूरत प्रमादामं पाएीबी सारी रीते ड़ीह लेव।
4.वडा़म।
सुं छंङडव द्रावण भेतमं, खिर पाएीमं अथवा वडेता पाएीमं न नाभवुं।उषयोग दशमिशन संपूर्ण सुरक्षासड वरवे, ड़ावमोजे, भूट, यडेरा माटे रक्षाभासक आवरध। अथवा मारडने उषयोग ड़रवे।
5.ज़ैविक डूगनाशङना उषयोग अने संभाण दशमिशन सूधमान, अयुं डे पीवुं नटी.

संयड माटेनी सूचनाओ

1. ज़ैविक डूगनाशङ धरयत।
पेडेटेने अन्य पदतुओ, भास ड़रवे।
जाड पढाओ।
संयडित ड़वयामं आवत।
उम अथवा ख़ाणेवी अलगा उम अथवा ख़ाणे।
राववा.
ज़ैविक डूगनाशङनी मआ अने पद्धति अनुसार तेने अलगा त।ग।मंथ ड़म।ममं सुरक्षित रीते संयडित ड़वुं
2. ज़ैविक डूगनाशङना संयड माटे निधिरित उम अथवा ख़ाण मजबूत।
अंथंडमवायुं, खुँसुं, पूरता प्रडाश अने ड़वा व्यक़शवायुं छे।वुं ज़े।छे।अने त्वा। तेनी वरगणबी द्रुम।म न थाय ते माटे पूरती ङड्या धरयतुं छे।वुं ज़े।छे।

येतवुली-लेव।म अने पडिम।मं द्रुम।विव ड़े।सुं।विव अन्य-अन्य पद।म हेष।
पे।वुं माटे तेने उषयोग ड़रवे।
नटी.
उषयोग पढी प्रडिम।म।
दश।विकी सूचनाओ मुशभ ड़रटेनेओ नाव।
ड़रवे।

वपारसछ। ड़रटेनेओ निडाल- 1. छे।वपार।मं ड़े।म।विव अने ड़रटेने ड़म।म।अने अने उषयोग।ड़म।ओनी ड़रव छे डे।पेडेटे, वधेली सामग्री, मगुनी तथा ड़रटेनेओ।
ड़े।वपार।मं अउरओओनी सलामत रीते निडाल ड़र।
ये।व। पसु।वरध।म अने पाएीनुं मड़ुष।म अउरओनी वडा़र।
2. पाएी ड़रटेनेओनी पुनःउषयोग ड़रवे।
ज़े।म।मं छे.
वपारसछ।म ड़रटेनेओ पुनःउषयोग अडेड़िव।म माटे अड़ार भुल्लव।
ख़णे न छे।उ।व।
3. पेडेटेने तडीं नांभीमे ड़ेव।मं विस्तारथी ड़र ज़मीनमं द़ाडी देव।

Bacillus subtilis 1.50% LF

Bio Fungicide,Liquid Formulation (CFU 1 X 10⁸ / ml min) (T Stanes – Bs-1 Strain Accession No. MTCC 25072)

BACILLOFIX (*Bacillus subtilis* 1.50% LF) is a Bio Fungicide used for the effective control of Early Blight disease in Tomato and Sigatoka disease in Banana.

Name of Crop	Common name of target pest	Waiting period	Active Ingredients	Formulation (ml)	Dilution in water(L)
Tomato	Early blight <i>Alternaria solani</i>	-	-	3 lit	500
Tomato	Early blight <i>Alternaria solani</i>	-	-	10 ml per kg seed	-
Banana	Sigatoka <i>Mycosphaerella muscicola</i>	0	-	5 lit	750

Directions for use : Apply as seed treatment and foliar spray at approved doses by diluting in water as suggested.

Weather Conditions: Open sky during sunny days.

Soil and water: All types.

Crop stage for application – days after showing:

Foliar spray on sigatoka disease incidence during vegetative and reproductive phase of banana crop and seed treatment at nursery sowing followed by foliar spray on early blight disease incidence during vegetative and reproductive phase of tomato crop.

Application Techniques: Seed treatment and foliar spray as per recommendations.

Equipment type: Seed treatment by using rubber hand gloves or drums and foliar spray using knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Dosage: Banana Foliar spray 5 lit per ha. Tomato Seed treatment 10 ml per kg seed and foliar spray 3 lit per ha.

Instruction for mixing: Mix required quantity of bio product with tomato seed before sowing. For foliar spray on banana and tomato crop mix required quantity of the bio product in small quantity of water in bucket or drum stir well with wooden stick and add rest water at 750 lit per ha or 500 lit per ha as per recommendation. Apply as foliar spray preferably during morning or evening hours on initiation of disease incidence. The repeat application is to be made at 15 days interval as required.

Re-entry period :12 hours. **Pre Harvest Interval(PHI)** :0

Manner and Time of application : Seed treatment at nursery sowing and Foliar spray on the crop on initiation of disease incidence preferably during early morning or evening hours.

Application timings: Spray during early morning or evening hours.

Frequency including maximum number of sprays:

Seed treat treatment before sowing and foliar spray on banana and tomato crop at 15 days interval 2-3 times as per requirement.

Stages during : The biopesticide should not be applied near to crop maturity and just before crop harvest.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests : Precautions : Spray early morning or evening hours.

Symptoms of poisoning : No specific symptoms. However, headache, vomiting and nausea may occur.

First Aid: (1)If ingested If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. (2)If inhaled If inhaled remove the patient in to open air. (3)In case of skin contact In case of skin and clothes contamination wash with plenty of water and soap. (4) In case of eye contact If eyes are contaminated flush with normal saline water for 10 to 15 minutes.

Antidote Statement: Treat symptomatically.

Safety Precautions : Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. After each operation the mixing and spraying equipment is to be rinsed thoroughly with plenty of water. Any surplus spray solution must not be disposed off in crop lands in stagnant or flowing water. The user should use full protective clothings. Do not smoke, eat or drink during handling and application of biological fungicide.

Instructions for storage: (1)The packages containing the Bio-fungicide shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the Bio-fungicide.

(2) The rooms or premises meant for storing the Bio-fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with its vapours.

Cautionary Statement: Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Disposal of used containers: (1) It shall be the duty of manufacturers, formulators of formulation and operator to dispose packages or surplus materials and washing from the machines, and containers shall be disposed-off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. (2) Dangerous to re-use empty containers. Used packages shall not be left outside to prevent their re-use. (3) Packages shall be broken and burried away from habitation.

Chemical Composition:	Content %w/w
<i>Bacillus subtilis</i> (Spores and mycelial fragments) (CFU 1X10 ⁸ /ml min)	1.50%
Growth Medium	96.00%
Dispersal agent (Glycerol)	0.50%
Osmatic stabilizer (PVP K-30)	2.00%
Total	100.00%

बैसिलस सबटिलिस १.५०% तरल संरचना

बैसिलस सबटिलिस १.५०% तरल संरचना (सीएफयू गणना १ X १०^८/ मिली न्यू.)
(T Stanes – Bs-1 Strain Accession No. MTCC 25072)

बॅसिलोफिक्स (बैसिलस सबटिलिस १.५०% तरल संरचना) एक जैविक कवकनाशी है जिसका उपयोग टमाटर में अली ब्लाइट रोग और केले में सिगाटोका रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

अनुशंसा:

निगम का नाम	लक्ष्य कीटनाशक का सामान्य नाम	अंतिम रंग से कटाई तक प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)	सक्रिय सामग्री (g.m.)	सूत्रीकरण (ML)	पानी में पतलापन (L)
टमाटर	अमेता बुलुस रोग आल्टरनेरिया सोलेनी	–	–	३ लीटर	५००
टमाटर	अमेता बुलुस रोग आल्टरनेरिया सोलेनी	०	–	१० मिली	–
केला	सिगाटोका बीमारी मायकोस्फेरेला म्युसीकोला	०	–	५ लीटर	७५०

इस्तेमाल के लिए निर्देश: जैविक फफूंदीनाशक की संस्तुत की गई मात्रा के अनुसार बीज उपचार और पौधों पर छिड़काव करें।

मौसमी की स्थिति (सामान्य रूप में) : खुला आसमान धूम निकली हो।

मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो) : सभी प्रकार

आवेदन के लिए फसल चरण – दिखाने के बाद के दिन: केले पर फसल के वनस्पतिक व प्रजनन चरण के दौरान सिगाटोका बीमारी के संक्रमण पर पौधों पर छिड़काव एवं टमाटर पर नर्सरी बीन से पहले बीज उपचार और उसके बाद फसल के वनस्पतिक व प्रजनन चरण के दौरान के अमेता बुलुसा रोग के संक्रमण पर पौधों पर छिड़काव

आवेदन तकनीक: संस्तुत की गई मात्रा के अनुसार बीज उपचार और पौधों पर छिड़काव

उपकरण के प्रकार: हाथों में स्बर के दस्ताने पहन कर या ड्रम द्वारा बीज उपचार और नैपसेक स्प्रेयर छिड़काव यंत्र जिसमें होले कोन नोजिल लगा हो द्वारा पौधों पर छिड़काव।

मात्रा बनाने की विधि: केला – ५ लीटर प्रति हैक्टयर की दर से पौधों पर छिड़काव। टमाटर– १० मिली प्रति किग्रा बीज की दर से बीज उपचार और ३ लीटर प्रति हैक्टयर की दर से पौधों पर छिड़काव करें।

मिलाने का निर्देश: हाथों में स्बर के दस्ताने पहन कर या ड्रम द्वारा १० मिली प्रति किग्रा बीज की दर से ड्रमाई से पहले टमाटर बीज उपचार और जैविक फफूंदीनाशक की संस्तुत की गई मात्रा को बाल्टी या ड्रम में लेकर थोड़े से पानी में एकड़ की डंडी से हिला–हिलाकर घुले और ७५० लीटर प्रति हैक्टयर या ५०० लीटर प्रति हैक्टयर की दर से जरूरत के अनुसार शेष पानी मिलाये। बीमारी के संक्रमण शुरू होने पर पौधों पर सवेरे या शाम के समय छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार १५ दिन के अंतराल पर जरूरत के अनुसार पौधो पर पन: छिड़काव करें।

पुन: प्रवेश अवधि: १२ घंटे

फसल पूर्व अंतराल(PHI): ०

आवेदन का तरीका और समय: जैविक फफूंदीनाशक की संस्तुत की गई मात्रा के अनुसार बुवाई से पहले टमाटर बीज उपचार और केले एवं टमाटर पर बीमारी के संक्रमण शुरू होने पर पौधों पर सवेरे या शाम के समय छिड़काव करें

आवेदन का समय: पौधों पर सवेरे या शाम के समय छिड़काव करें।

रंगे की अधिकतम संख्या सहित आवृत्ति : ड्रमाई से पहले टमाटर बीज उपचार और कल एवं टमाटर पर आवश्यकतानुसार १५ दिन के अंतराल पर दो – तीन बार या जरूरत के अनुसार पौधो पर छिड़काव करें।

घरणी के दौरान: फ

