Size : 504x280 mm ■ PANTONE 2150 C Red Lines are Folding Mark and Area : 72 mm x 70 mm

AgroStar®

NOYAN FLO™

Chlorothalonil 40.0% w/w + Difenoconazole 4.0% w/w SC [Chlorothalonil 500 g/L + Difenoconazole 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(Broad-Spectrum Foliar Fungicide for Agricultural use)

नोयान फ्लो

क्लोरोथेलोनिल ४०.०% भार/भार + डाईफेनोकोनाजोल ४.०% भार/भार एस.सी. [क्लोरोथेलोनिल ५०० ग्रा./ली. + डाईफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./ली. एस.सी. (५५० ग्रा./ली. एस.सी.)]
(बहुपयोगी फिंडकाच फफूंदनाशक कृषि में उपयोग हेतु)

For agricultural use only.

केवल कृषि उपयोग के लिए।

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE.

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़े।

Manufactured by:
Syngenta India Pvt. Ltd.,
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3,
Baner Road, Pune-411 045, Maharashtra, India.

Factory Address:
Plot No. 1, Swastik Ceramic Compound, Sankarda, Dist. Vadodara, Gujarat-391 350, India.

Marketed by:
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED,
Regd. Office Nos. 001 and 002, Ground Floor, Wing A, and Nos 003 and 004, Ground Floor, Wing B,
Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune, Maharashtra-411014, India.

निर्माता:
सिंजेन्टा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड,
अमर पैराडिम, एस. नं. ११०/११/३,
बानेर रोड, पुणे-४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत।

फैक्टरी का पता:
प्लॉट नं. १, स्वास्तिक सिरेमिक कम्पाउंड, सनकार्ड, जिला वडोदरा, गुजरात-३९१३५०, भारत।

विपणनकर्ता:
यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड,
रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर ००१ और ००२, ग्राउंड फ्लोर, विंग ए, और नंबर ००३ और ००४, ग्राउंड फ्लोर, विंग बी, न्याति टेक पार्क, वडगांव शेरी, पुणे, महाराष्ट्र-४११ ०१४, भारत।

IN3xxxxxx-UAPL

Marketed by: ULink Agritech Private Limited, Regd. Office Nos 001 and 002, Ground Floor, Wing A, and Nos 003 and 004, Ground Floor, Wing B, Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune, Maharashtra-411014, India.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
info@agrostar.in 9503095030
or **customer service team** at the above address

NOYAN FLO™

Chlorothalonil 40.0% w/w + Difenoconazole 4.0% w/w SC [Chlorothalonil 500 g/L + Difenoconazole 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(Broad-Spectrum Foliar Fungicide for Agricultural use)

Read leaflet before use.

Purpose: Chlorothalonil 40.0% w/w + Difenoconazole 4.0% w/w SC is a broad-spectrum foliar fungicide having systemic and contact activity against major plant pathogens (fungal diseases). It is recommended for the control of Early blight and Late blight of Tomato; Powdery Mildew, Anthracnose, Fruit rot of Chilli crop; Tikka leaf spot and Rust in Ground nut and Powdery Mildew; Premature leaf fall and Scab in Apple crop To express on wb basis, one litre of this formulation contains 500 gm of Chlorothalonil and 50 gm of Difenoconazole.

Composition:

	Contents (% w/w)
Chlorothalonil a.i.	40.0
Difenoconazole a.i.	4.0
Inert Ingredients:	
Blockcopolymer POE0	4.84
Poly [1-(2-oxiranyl)-1-pyrrolidinylethylene]	0.23
Anti-freeze:	
DL-propanediol-(1,2)	6.08
Antifoaming Agent:	
Polydimethylsiloxane in emulsion	0.18
Stabilizing Agent:	
Silicic acid	0.74
Xanthan Gum	0.216
Buffer:	
Sodium hydroxide	0.02
Phosphoric acid	0.05
Complexing Agent:	
Ethylenediamine-tetraacetic acid tetrasodium salt	0.22
Preservative:	
1,2-benzothiazol-3-one	0.05
Solvent:	water
Water	Q.S.
Total	**100**

Density at 20°C = 1.25 g/cm³

Application & Recommendations for use:
Crops & Pests Groups: When used as per the recommendations given below, the product protects Tomato and Chilli crops from the following disease:

Crop	Common name of the disease	Dosage ha	a.i. (gm)	Formulation (ml)	Waiting period from last application to harvest (in days)	Time and Method of Application
Tomato	Early Blight, Late Blight	440* (400+40)	1000	500	7	Foliar spray with the help of knapsack sprayer. First spray at start of initial disease infection and repeat one spray at 10-15 days interval depending upon disease incidence.
Chilli	Powdery Mildew, Anthracnose, Fruit rot	440* (400+40)	1000	500	7	
Ground nut	Tikka leaf spot and Rust	440	1000	500	47	First spray as preventive application and following application at 10-15 days interval depending upon disease incidence.
Apple	Powdery Mildew; Premature leaf fall and Scab	352	800	1000	24	

*Calculated as 550 (500+50)gm a.i.ha on w/v basis

Application & Recommendation for use (via Drone application):
Chlorothalonil 40.0% w/w + Difenoconazole 4.0% w/w SC is recommended for the control of the following diseases:

Crop	Common name of the disease	Dosage (g Or milha)	a.i. (g/ha)	Formulation (milha)	Dilution in water (Litre/hectare)	Waiting period from last application to harvest (in days)
Tomato	*Early Blight, Late Blight*	440* (400+40)	1000	20	7	
Chilli	*Powdery Mildew; Anthracnose, Fruit rot*	440* (400+40)	1000	20	7	

Notes:
(i) Drone application should be carried out as per DGCA approved guidelines / norms. Drone should have UIN number obtained from DGCA and pilot should have the license to operate the drone from DGCA as well as trained on both drone operation and safe use of pesticides.
(ii) Don'ts for the Drone in contraventions to the Unmanned Aircraft System / Drone Rules (UAS), 2021 rules as published by Ministry of Civil Aviation vide G.S.R. 589(E) dated 25th August, 2021 and as amended from time to time.

Good practices relating to pesticide application techniques covering the following:
(i) **Weather conditions in general:** Do not spray during the windy weather conditions or during hot hours of the day, if the foliage is wet or if rain is imminent. Spray strictly in the direction of wind to prevent prolonged or repeated exposure to the spray mist. Do not undertake and overlaps by overlapping applications or by exceeding the recommended rate.
(ii) **Soil and Water:** This is not a soil applied fungicide hence, not applicable. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose and water areas viz. ponds, ditches, lakes, drainage systems, etc, by disposal of product waste and do not allow direct over spray or spray drift of product on to these areas to avoid long term adverse effect in the aquatic environment.
(iii) **Crop stages for application:** The first spray to be given as preventive or at initial disease appearance followed by one spray at 10-15 days interval depending upon disease incidence.
(iv) **Application Technique:** Foliar spray with sufficient quantity of water to ensure uniform coverage on leaves.
(v) **Equipment type:** Spray with knapsack or any other suitable sprayer.
(vi) **Nozzle type:** Hollow cone nozzle or any other suitable nozzle.
(vii) **Dosage:** Given in the table above.
(viii) **Directions for Use / Instructions for mixing:** Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare and apply by a suitable sprayer e.g. knapsack sprayer.
(ix) **Optimal Re-entry period:** Do not enter treated areas for 24 hours after each spray.
(x) **Pre-harvest interval:** Given in the table above.
(xi) **Manner and Time of Application:** The first spray to be given as preventive or at initial disease appearance followed by one spray at 10-15 days interval depending upon disease incidence.
(xii) **Frequency including maximum number of sprays:** The first spray to be given as preventive or at initial disease appearance followed by one spray at 10-15 days interval depending upon disease incidence. Maximum number of sprays in a crop season are two.

Resistance Management

GROUP	M05	3	FUNGICIDE

It is recommended to use this fungicide in spray sequence in case repeated sprays are required to manage disease, alternation with another approved fungicide from a different mode of action group is recommended.
1. FRAC Group code: Chlorothalonil - M05 and Difenoconazole – 3
2. Chemical class & Mode of Action Chlorothalonil (chloronitriles) is a contact fungicide with multi-site contact activity, stops the germination of fungal spores. Difenoconazole (Triazole) is sterol demethylation inhibitor.

Storage:
1. The package containing the Fungicide shall be stored in tightly closed original containers separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or animal feed shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the Fungicide.
2. The rooms or premises meant for storing the Fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour.
3. Keep away from direct sunlight and from reach of children, animal and unauthorized persons.
4. Do not allow the product to freeze.

Safety Precautions:
Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use wooden stick for stirring the spray solution. Avoid contact of product concentrate or spray mixture with skin, eyes, mouth and clothing. Avoid inhalation of fog, vapors or spray mist. Wear protective clothing (full sleeve shirt and pants), chemical resistant gloves, mask, goggles, capthat and boots while handling the product. Do not eat, drink, chew or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water, clean protective equipment and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the fungicide. Also wash the contaminated clothes separately from other clothing before re-use. Newly treated areas must not be grazed and all livestock are to be kept out of the treated area a day. This product should not be applied (tank-mix) with any other chemical. Do not blow nozzle with mouth. Do not spray crops under stress. Do not mix with other chemicals. Dangerous to re-use empty containers. Rinse empty container three times before disposal and add rinsate in to spray tank before spray. Do not re-use empty container to keep food items or for any other purpose. If any indisposition occurs, stop the work, follow first aid measures and call a physician immediately. Spilt product must not be re-used. Remove heavily contaminated soil layer, collect up spilt material thoroughly and bury it in a safe place. Rinse spilt area with plenty of water. Run-off in to surface water to be avoided. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

Cautionary statements:
1. **Not to be used for any purpose other than those subscribed on labels & leaflets.**
2. **This product is a skin sensitizer.**
3. **This product is toxic to fish and aquatic organisms; its use must be avoided near aquaculture.**
4. Set up the least buffer zone (as specified by DGCA/ CIB&RC) between drone treatment and the non-target crop.
5. The drone and spraying unit should be properly calibrated before flying.
6. The spraying unit should be checked for pump pressure, nozzle wear out for uniform spraying, and leakage in tank and lines.

Disposal of used packages/ containers, surplus material:
1. It shall be the duty of the manufacturers, formulators of this product and operators to dispose packages or surplus material and washings from the sprayers/containers in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.
4. Dangerous to re-use empty containers. Rinse empty container three times before disposal. Add rinsate to spray tank before spray. DO NOT re-use empty container to keep food items or for any other purpose.

Symptoms of Poisoning:
The product was found as skin sensitizer in laboratory animals. Poisoning may cause an allergic skin reaction, sedation, dyspnoea and allergic symptoms such as redness of eye, bronchial irritation, rashes on exposed area, redness etc.

First aid measures:
Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated room or to fresh air. In case of suspected poisoning; stop work immediately and call a physician.
Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected part (especially under hairs and nails) of the body with water and soap. Flush irritation persists, call a physician.
Eye Contact: Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for atleast 15 minutes. Remove contact lenses. Immediate medical attention is required.
Ingested: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label to doctor. Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.
Inhalation: If inhaled move the victim to fresh air and avoid cold if breathing is irregular or stopped, commence resuscitation and avoid exert combination. Call a physician immediately.
Antidote: No specific antidote is known; treat symptomatically.
The user bears the risk for damage resulting from factors beyond the manufacture's control.

नोयान फ्लो

क्लोरोथेलोनिल ४०.०% भार/भार + डाईफेनोकोनाजोल ४.०% भार/भार एस.सी. [क्लोरोथेलोनिल ५०० ग्रा./ली. + डाईफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./ली. एस.सी. (५५० ग्रा./ली. एस.सी.)]
(बहुपयोगी फिंडकाच फफूंदनाशक कृषि में उपयोग हेतु)

इस उत्पाद के इस्तेमाल से पहले पत्रक पढ़ना चाहिए।

उद्देश्य: क्लोरोथेलोनिल ४०.०% भार/भार + डाईफेनोकोनाजोल ४.०% भार/भार एस.सी. एक व्यापक-स्पेक्ट्रम फिंडकाच फफूंदनाशक है जिसमें प्रमुख पौध रोगाणुओं (फफूंद संबंधी बीमारियों) के नियंत्रण के लिए प्रणालीगत एवं स्पर्शीय क्रियाशीलता है। इसकी सिफारिश आर्ली ब्लाइट व लेट ब्लाइट आर्ली ब्लाइट टमाटर; पाउडरी मिल्डयू, एन्थ्रेक्नोज, फ्रूट रोट मिरची; टिक्का लीफ स्पॉट और रस्ट मूंगफली; एवं पाउडरी मिल्डयू, समय पूर्व पत्ती झड़ना और स्कैब सेब फसल के लिए प्रयोग किया जाता है। वजन के आधार पर, इस फॉर्मूलेशन के एक लीटर में क्लोरोथेलोनिल 500 ग्राम और डाईफेनोकोनाजोल 50 ग्राम होते हैं।

संघटन:

	मात्रा (% w/w)
क्लोरोथेलोनिल a.i.	४०.०
डाईफेनोकोनाजोल a.i.	४.०
निष्क्रियतत्व:	
ब्लॉक कोपोलीमर POE0	४.८४
पॉलि [1-(2-ऑक्सो-1-पायलीनीथाइल)] इथाइलीन	०.२३
एन्टी-फ्रीज:	
डी.एल-प्रोपाइलीन-(1,2)	६.०८
एन्टीफोमिंग एजेंट:	
पॉलीडाइमेथाइलसिलोक्सेन का इमल्शन	०.१८
स्टेबिलाईजिंग एजेंट:	
सिलिसिक एसिड	०.७४
जेंथन गम	०.२१६
बफर:	
सोडियम हाइड्रोक्साइड	०.०२
फास्फोरिक एसिड	०.०५
कम्प्लेक्सिंग एजेंट:	
इथाइलीनडायामाइन-टेट्राएसीटिक एसिड टेट्रासोडियम साल्ट	०.२२
प्रीजर्वेटीव: १,२-बेन्जिसोथायाजोलीन-३-ओन | ०.०५ |
सॉल्वेन्ट: पानी | पर्याप्त मात्रा |
कुल | **१००** |

घनत्व २०°C = 1.25 g/cm³

उपयोग का सलाह तथा सिफारिशें की गई मात्रा:
फसल और कीट समूह: जब नीचे दी गई सिफारिशों के अनुसार उपयोग किया जाता है, तो उत्पाद निम्न फसलों को निम्न बीमारी से बचाता है:

फसल	रोग का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर (ग्राम) (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर/ हेक्टेयर)	अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)	छिड़काव का समय एवं उपयोग का तरीका
टमाटर	अगेती अंगमारी; पिछेती अंगमारी रोग	४४०* (४००+४०)	१०००	५००	७	एक आवरण वाले स्प्रेयर की सहायता से छिड़काव करें।
मिर्च	चूर्ण फफूंदी, गढ़ा रोग, फल सड़ा	४४०* (४००+४०)	१०००	५००	७	पहला छिड़काव बीमारी के प्रारम्भ होते ही एवं दूसरा छिड़काव रोग की तीव्रता के आधार पर १०-१५ दिन के अन्तर पर करें
मूंगफली	टिक्का पत्ती धब्बा रोग और रोस्ट	४४०	१०००	५००	४७	रोग और रोग की गम्भीरता की तरफ के आधार पर १०-१५ दिन के अन्तर पर करें
सेब	चूर्ण फफूंदी रोग, समय से पहले पत्ता गिरना रोग और स्कैब	३५२	८००	१०००	२४	

*गणना 550 (500+50)ग्राम a.i./ha w/v आधार पर।

ड्रोनके द्वारा उपयोग की सलाह और सिफारिशें (ड्रोन एप्लिकेशन के माध्यम से):

फसल	रोग का सामान्य नाम	मात्रा (ग्रा. या एकड़ / हेक्टेयर)	सक्रिय तत्व (ग्रा./हेक्टेयर)	संरचना (मि.ली./हेक्टेयर)	पानी की मात्रा (लीटर/ हेक्टेयर)	अंतिम आवेदन से काटाई तक की कटाई के प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)
टमाटर	अगेती अंगमारी; पिछेती अंगमारी रोग	४४०* (४००+४०)	१०००	५००	२०	७
मिर्च	चूर्ण फफूंदी, गढ़ा रोग, फल सड़ा	४४०* (४००+४०)	१०००	५००	२०	७

*गणना 550 (500+50)ग्राम a.i./ha w/v आधार पर।

नोट:
(i) ड्रोन एप्लीकेशन डीजीसीए अनुमोदित दिशानिर्देशों/मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। ड्रोन में डीजीसीए से प्राप्त यूआईएन होना चाहिए और उस ड्रोन को डीजीसी से उड़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और कीटनाशकों के उपयोग के साथ-साथ ड्रोन के संचालन में प्रशिक्षित होना चाहिए।
(ii) ड्रोन के लिए निषेधाज्ञाएं: मानवरहित विमान प्रणाली / ड्रोन नियम (यूएएस), २०२१ के नियमों के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जी.एस.आर. ५८९(ई) दिनांक २५ अगस्त २०२१ को जैसा संशोधित किया गया है।

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छी प्रैक्टिस/ सर्वोत्तम कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकें निम्नलिखित को कवर करती हैं:
(i) **मौसम की सामान्य परिस्थितियाँ:** तेज हवा के मौसम की स्थिति के दौरान या दिन के सबसे गरम घंटों के दौरान या जब पत्ते गीले हों या वर्षा की संभावना हो तो स्प्रे न करें। स्प्रे धुंध के संपर्क में लंबे समय तक या बार-बार आने से बचने के लिए हवा की दिशा में सख्ती से छिड़काव करें। छिड़काव की दरों से अधिक या ओवरलैपिंग द्वारा ओवरलैपिंग अनुप्रयोगों में न उलझना चाहिए।
(ii) **मिट्टी एवं पानी:** यह मिट्टी में छिड़काव किया जाने वाला फफूंदनाशक नहीं है, इसलिए लागू नहीं है। जिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के माध्यम से सिंचाई के उद्देश्य या घरेलू उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को प्रदूषित न करें और तालाब, डिच, झील, जल निकासी प्रणाली, आदि जैसे जलीय क्षेत्रों के क्षेत्रों पर सीधे छिड़काव या स्प्रे ड्रिफ्ट से बचें ताकि जलीय वातावरण में दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके।
(iii) **अनुप्रयोग के लिए फसल की अवस्था:** पहला छिड़काव निवारक रूप अपने के साथ के साथ या रोग की शुरुआत के समय में करें। तुरंत छिड़काव १०-१५ दिन के अंतराल पर बीमारी की तीव्रता के आधार पर करें।
(iv) **छिड़काव की तकनीक:** फसलों पर समान कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ पत्तों पर पत्ते पर छिड़काव करें।
(v) **उपकरण के प्रकार:** नैपसैक स्प्रेयर अथवा अन्य किसी उपयुक्त स्प्रेयर से छिड़काव करें।
(vi) **नोजल का प्रकार:** हॉलो कोन नोजल या कोई अन्य उपयुक्त नोजल।
(vii) **मात्रा:** ऊपर टेबल में दी गयी है।
(viii) **इस्तेमाल के लिए निर्देश / मिश्रण के लिए निर्देश:** उत्पाद की आवश्यक मात्रा को मापें और इसे थोड़ी मात्रा में पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं। पूरी तरह से हिलाने के साथ निर्दिष्ट पानी की शेष मात्रा जोड़ें। उपयुक्त स्प्रेयर जैसे नैपसैक स्प्रेयर के लिए एक हेक्टेयर को कवर करने के लिए आवश्यक पानी के अनुपात में उत्पाद की मात्रा को समायोजित करें।
(ix) **उपयुक्त पुनः प्रवेश अंतराल:** प्रत्येक स्प्रे के बाद 24 घंटे के लिए उपचारित क्षेत्रों में प्रवेश न करें।
(x) **अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल:** ऊपर टेबल में दी गयी है।
(xi) **छिड़काव का तरीका और तारीख:** पहला छिड़काव रोग आने से पहले या रोग की शुरुआत के समय में करें और इसके बाद एक छिड़काव १०-१५ दिन के अंतराल पर बीमारी की तीव्रता के आधार पर करें।
(xii) **आवेदनों संख्या में बंटवार सहित आवृत्ति:** पहला छिड़काव रोग आने से पहले या रोग की शुरुआत के समय में करें। तुरंत छिड़काव १०-१५ दिन के अंतराल पर बीमारी की तीव्रता के आधार पर करें। फसल मौसम में अधिकतम दो छिड़काव करें।

प्रतिरोध प्रबंधन

समूह	एम०५	३	फफूंदनाशक

इस फफूंदनाशक का उपयोग स्प्रे के क्रम में करने की सलाह दी जाती है यदि बार-बार फफूंदनाशक के इस्तेमाल के (रोटेशन) में कवर चाहिए। यदि कीटनाशी की विभिन्न क्रिया वाले दूसरे फफूंदनाशक के साथ वैकल्पिक इस्तेमाल करने की अनुशंसा की जाती है।
1. फ्रैक समूह कोड: क्लोरोथेलोनिल - M05 और डिफेनोकोनाजोल – 3
2. रासायनिक वर्ग एवं क्रियाविधि क्लोरोथेलोनिल (क्लोरोनिट्राइल) एक बहुआयामी संपर्क फफूंदनाशक है जो बीज अंकुरण को रोकता है। डिफेनोकोनाजोल (ट्रिएजोल) स्टेरोल डीमेथिलीकरण अवरोधक है।

भंडारण:
1. फफूंदनाशक युक्त पैकेज को अलग-अलग कमरे या परिसर में संग्रहीत किया जाना चाहिए और अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य या पशु चारे के साथ के कमरे या परिसर से दूर, फफूंदनाशक की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताला-चाबी के साथ अलमारियों में रखा जाना चाहिए।
2. फफूंदनाशकों के भंडारण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या परिसरों का निर्माण अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, सूखी, प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सके।
3. सीधी धूप और बच्चों, जानवरों और अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखें।
4. फफूंदनाशक को जमने न दें।

प्रयोग के लिए निर्देश:
स्प्रे मिश्रण को तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। मिश्रित स्प्रे को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह को स्प्रे मिश्रण के संपर्क से बचाने के लिए कवर-अप वस्त्र पहनें। छिड़काव के समय खाना, पीना या धूम्रपान न करें। छिड़काव करने वाले व्यक्ति को सुरक्षात्मक वस्त्र (फुल स्लीव शर्ट और पैंट), रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मास्क, चश्मा, टोपी और जूते पहनने चाहिए। उपयोग के बाद हाथों को साबुन और पानी से धोएं। उपकरण को साफ करें और कपड़े बदलें। हवा या जलीय निकायों को फफूंदनाशक से प्रदूषित होने से बचाएं। दूसरे कपड़ों से अलग प्रभावित कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल से पहले धोएं। नवीनतम उपचारित क्षेत्रों को चराया नहीं जाना चाहिए और सभी पशुओं को उपचारित क्षेत्र से एक दिन के लिए दूर रखा जाना चाहिए। यह उत्पाद किसी अन्य रसायन के साथ मिलाया (टैंक मिक्स) नहीं होना चाहिए। मुंह से नोजल को फूंक कर साफ न करें। तनाव में फसलों पर छिड़काव न करें। अन्य रसायनों के साथ मिलाना न करें। खाली कंटेनरों का पुनः उपयोग खतरनाक है। निपटान से पहले खाली डिब्बों को तीन बार धोएं और धोए गए पानी को छिड़काव से पहले स्प्रे टैंक में डालें। खाली कंटेनर का उपयोग भोजन, पशुओं के चारे या किसी अन्य उद्देश्य के लिए दोबारा उपयोग न करें। यदि कोई अस्वस्थता महसूस होती है, तो काम रोक दें, प्राथमिक उपचार के उपाय करें और तुरंत एक चिकित्सक को बुलाएं। छिड़काव के दौरान धूम्रपान, खाना या पीना न करें। फैले हुए उत्पाद का दोबारा उपयोग न करें। भारी दूषित मृदा परत को हटाएं, फैली हुई सामग्री को पूरी तरह से इकट्ठा करें और इसे सुरक्षित स्थान पर दफनाएं। फैले हुए क्षेत्र को पानी से धोएं। सतह पानी में बहाव से बचें। जहर के किसी भी संकेत के मामले में, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें।

चेतावनियाँ:
1. **इस फफूंदनाशक का लेबल पर दिये हुए विवरण के अनुसार इस्तेमाल करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य हेतु इस्तेमाल नहीं करें।**
2. **यह उत्पाद त्वचा संवेदीकारक है।**
3. **यह उत्पाद मछलियों एवं जलीय जीवों के लिए विषाक्त है, अतः इसका उपयोग मत्स्यपालन के क्षेत्रों के नजदीक नहीं करना चाहिए।**
4. ड्रोन उपकरण और कैप्स्यूल (टैंक) के बीच न्यूनतम बफर (सिफारिश) (डीजीसीए / सीआईबी और आरसी द्वारा निर्दिष्ट) स्थापित करें।
5. उड़ान से पहले ड्रोन और छिड़काव यंत्र को ठीक से कैलिब्रेट किया जाना चाहिए।
6. छिड़काव इकाई को पंप के दबाव, एक समान छिड़काव के लिए नोजल घटाव और टैंक और लाइनों में रिसाव के लिए जाँच की जानी चाहिए।

इस्तेमाल किये हुए पैकेज / डिब्बे, बचे हुए पदार्थ का निपटान:
1. पदार्थों या उत्पाद प्रयुक्त पैकेजों के लिए, पैकेज या अतिरिक्त सामग्री और धोने के सुरक्षित तरीके में निपटान का दायित्व नियामक के निर्माता, फार्मूलेटर और ऑपरेटर का होगा।
2. उपयोग किए गए डिब्बों / बैरलों को फेंकने से बचने के लिए बाहर फेंक दिए जाएँगे।
3. बैरलों / टिन्स को नष्ट नहीं करना चाहिए।
4. खाली कंटेनरों का दोबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है। इसलिए, खाली कंटेनर के निपटान से पहले उसे तीन बार धो दें और धोने के तीन लिटर पानी को स्प्रे टैंक में मिलाकर उसे नष्ट करें। खाली कंटेनर का उपयोग खाद्य पदार्थ या किसी अन्य उद्देश्य के लिए दोबारा करने का प्रयास न करें।

विषाक्तता के लक्षण: ये उत्पाद प्रयोगशाला में जानवरों के त्वचा हेतु प्रयोगों में त्वचा संवेदी पाया गया। हालांकि विषाक्तता से त्वचा की एलर्जी, बेहोशी, दम घुटना तथा हल्की एलर्जी लक्षण जैसे आँख लाल होना, श्वास नलियों में जलन, त्वचा पर चकत्ते, लाल होना, आदि।

प्राथमिक उपचार:
प्रभावित व्यक्ति को अच्छी तरह हवादार कमरे में या ताजी हवा के क्षेत्र जाने और उसे ठंडा होने से बचाएं। संदिग्ध विषाक्तता के मामले में, तुरंत काम बंद करें और एक चिकित्सक को बुलाएं।
त्वचा के संपर्क में आने पर: दूषित कपड़ों को हटाएं और प्रभावित शरीर (विशेषकर बालों के नीचे और नाखूनों) को पानी और साबुन से अच्छी तरह से धो दें। यदि जलन बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें।
आंखों के संपर्क में आने पर: कम से कम पानी से, पलकों के नीचे भी, कम से कम १५ मिनट के लिए तुरंत धोएं। कॉन्टैक्ट लेंस निकालें। तत्काल चिकित्सा सहायता दें।
निगल जाने पर: अगर निगलने में आ जाए तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें। उत्पाद के लेबल को डॉक्टर को दिखाएं। बेहोश व्यक्ति को कुछ भी मुंह में नहीं दें। विषाक्तता का कारण न बनें।
श्वास द्वारा अन्दर जाने पर: पीड़ित व्यक्ति को ताजी हवा में ले जाएं। यदि श्वास अनियमित या रुक गई है, तो कृत्रिम श्वसन का प्रयास करें। ठंडी से बचें और अनावश्यक श्रम से बचें। तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें।
विष प्रतिरोधक: कोई ज्ञात विष प्रतिरोधक नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।
किसी भी परिस्थिति में निर्माता के नियंत्रण से परे कारकों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए उपयोगकर्ता जोखिम उठाता है।

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनील ४०.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू + डायफेनोकोनाझोल ४.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी [क्लोरोथालोनील ५०० ग्रॅम/लि. + डायफेनोकोनाझोल ५० ग्रॅम/लि एससी (५५० ग्रॅम/लि. एससी)]
(कृषी क्षेत्रात फवारणीसाठी व्यापक क्षमतेचे बुरशीनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती/लेबल वाचा.

उद्देश: क्लोरोथालोनील ४०.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू + डायफेनोकोनाझोल ४.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी हे व्यापक-आयामचे पत्रकीय बुरशीनाशक असून मुख्य पीकरोगाणूंविरुद्ध (बुरशीजन्य रोग) प्रणालीगत व संपर्कात्मक क्रियाशील आहे. टोमॅटोचे अर्ली ब्लाइट व लेट ब्लाइट; आणि मिरचीवरील पावडरी मिल्ड्यू, ॲन्थ्रक्नोज व फळकुजी; भुईमुगाच्या टिक्का पानावरील ठाण आणि रस्ट आणि सफरचंद पिकामध्ये पावडरी मिल्ड्यू, लवकर पानगळ आणि खपली यांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस करण्यात येते. वजनाच्या आधारावर, या फॉर्मुलेशनच्या एका लिटरमध्ये ५०० ग्रॅम क्लोरोथालोनील आणि ५० ग्रॅम डिफेनोकोनाझोल असतात.

संघटन:

	घटक (% डब्ल्यू/डब्ल्यू)
सक्रिय:	
क्लोरोथालोनील a.i.	४०.०
डायफेनोकोनाझोल a.i.	४.०
निष्क्रियतत्वे:	
ब्लॉक कोपोलीमर POE0	४.८४
पॉली [1-(2-ऑक्सो-1-पायलीनीथाइल)] इथाइलीन	०.२३
अँटी-फ्रीझ:	
डी.एल-प्रोपाईल-(1,2)	६.०८
अँटीफोम:	
पॉलीडाइमेथाइलसिलोक्सेन पॉली (ऑक्सी इथाइलीन) इमल्शन	०.१८
स्टॅबिलायझर:	
सिलिसिक ॲसिड	०.७४
झॅन्थन गम	०.२१६
बफर:	
सोडियम हाइड्रोक्साइड	०.०२
फॉस्फोरिक ॲसिड	०.०५
कॉम्प्लेक्सिंग एजंट:	
इथाइलीनडायामाइन-टेट्राएसीटिक ॲसिड टेट्रासोडियम क्षार	०.२२
प्रिझर्वेटिव:	
१,२-बेंझिसोथायाझोलीन-३-ओन	०.०५
सॉल्वेंट:	पाणी
पाणी	पुरेसे
एकूण | **१००** |

घनता २०°C = 1.25 g/cm³

पीक आणि कीटक गट: जेव्हा नीचे दिलेल्या शिफारशींनुसार वापरल्यानंतर, हे उत्पादन टोमॅटो आणि मिरचीची पिकांचे खालील रोगांपासून संरक्षण करते:

पिक	रोगाचे सामान्य नाव	मात्रा/ग्रॅम/हेक्टर (मिली)	पाण्याची मात्रा (लिटर/ हेक्टर)	पाण्याच्या द्रावण काढल्यानंतर कापणीची वेळ (दिवस)	फवारणीची वेळ
टोमॅटो	अर्ली ब्लाइट व लेट ब्लाइट	४४०* (४००+४०)	१०००	५००	७	एका आवरणाच्या नॅपसॅक स्प्रेयरच्या मदतीने पानांवर फवारणी करावी. प्राथमिक लक्षणांच्या सुरुवातीस पहिली फवारणी करावी. आवश्यकतेनुसार १०-१५ दिवसांनंतर दुसरी फवारणी करावी.
मिरची	पावडरी मिल्ड्यू, ॲन्थ्रक्नोज व फळकुजी	४४०* (४००+४०)	१०००	५००	७	
भुईमूग	टिक्का लीफ स्पॉट आणि रस्ट	४४०	१०००	५००	४७	पहिली फवारणी प्रतिबंधात्मक आणि त्यानंतर रोगाच्या तीव्रतेनुसार पुढील फवारणी १०-१५ दिवसांनंतर करावी.
सफरचंद	पावडरी मिल्ड्यू; लवकर पानगळ आणि खपली	३५२	८००	१०००	२४	

*गणनेनुसार(w/w आधार 550 (500+50) ग्रॅम a.i./हे. प्रती हेक्टर लागणीच्या वेळेस).

ड्रोनद्वारे फवारणी करताना शिफारशी (ड्रोन ॲप्लिकेशन द्वारा):
क्लोरोथालोनील ४०.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू + डायफेनोकोनाझोल ४.०% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी हे खालील रोगांच्या नियंत्रणासाठी शिफारशीत आहे:

| पिक | रोगाचे सामान्य नाव | डोस (ग्रॅम किंवा मिली/हेक्टर) | a.i. (ग्र

Size : 504x280 mm ■ PANTONE 2150 C Red Lines are Folding Mark and Area : 72 mm x 70 mm

AgroStar®

NOYAN FLO™

Chlorothalonil 40.0% w/w + Difenoconazole 4.0% w/w SC
[Chlorothalonil 500 g/L + Difenoconazole 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(Broad-Spectrum Foliar Fungicide for Agricultural use)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% भार/भार + डाईफेनोकोनाजोल ४.०% भार/भार एस.सी.
[क्लिलोरोथेलोनिल ५०० ग्रा./ली. + डाईफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./ली. एस.सी. (५५० ग्रा./ली. एस.सी.)]
(बहुपयोगी फिक्कगय फफूंदनाशक कृषि में उपयोग हेतु)

For agricultural use only.

केवल कृषि उपयोग के लिए।

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE.

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़े।

Manufactured by:
Syngenta India Pvt. Ltd.,
Amar Paradigm, S. No. 110/11/3,
Baner Road, Pune-411 045, Maharashtra, India.

Factory Address:
Plot No. 1, Swastik Ceramic Compound, Sankarda, Dist. Vadodara, Gujarat-391 350, India.

Marketed by:
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED,
Regd. Office Nos. 001 and 002, Ground Floor, Wing A, and Nos 003 and 004, Ground Floor, Wing B,
Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune, Maharashtra-411014, India.

निर्माता:
सिंजेन्टा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
अमर पैरेडाइम, एस. नं. ११०/११/३,
बानेर रोड, पुणे-४११ ०४५, महाराष्ट्र, भारत।

फैक्टरी का पता:
प्लॉट नं. १, स्वास्तिक सिरेमिक कम्पाउंड, सनकार्दा, जिला वडोदरा,
गुजरात-३९१३५०, भारत।

विपणनकर्ता:
यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड,
रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर ००१ और ००२, ग्राउंड फ्लोर, विंग ए, और नंबर ००३ और ००४,
ग्राउंड फ्लोर, विंग बी, न्याति टेक पार्क, वडगांव शेरी, पुणे, महाराष्ट्र-४११ ०१४, भारत।

IN30000000-UAPL

Marketed by: ULink Agritech Private Limited, Regd. Office Nos 001 and 002, Ground Floor, Wing A, and Nos 003 and 004, Ground Floor, Wing B, Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune, Maharashtra-411014, India.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
info@agrostar.in 9503095030
or **customer service team** at the above address

নোয়ান ফ্লো

ক্লোরোথালোনিল ৪০.০% ডব্লিউ/ডব্লিউ + ডাইফেনোকোনাজোল ৪.০% ডব্লিউ/ডব্লিউ এসসি
[ক্লোরোথালোনিল ৫০০ গ্রাম/লি + ডাইফেনোকোনাজোল ৫০ গ্রা./লি. এসসি (৫৫০ গ্রা./লি. এসসি)]
(ব্যাপক ভিত্তিক ফুঁদনাশক কৃষিজিনিস ব্যবহার যোগ্য)

নويان فلو

كلوروثالونيل 40.0% w/w + ديفينوكونازول 4.0% w/w SC
[كلوروثالونيل 500 g/L + ديفينوكونازول 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(مبيد فطري واسع الطيف لاستخدام الزراعي)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल 40.0% w/w + डाइफेनोकोनाजोल 4.0% w/w एससी
[क्लोरोथालोनिल 500 ग्रा./ली. + डाइफेनोकोनाजोल 50 ग्रा./ली. एससी (550 ग्रा./ली. एससी)]
(बहुव्यापी फफूंदनाशक कृषि उपयोग के लिए)

ノヤン フロー

クロロタロニル 40.0% w/w + ジフェノコナゾール 4.0% w/w SC
[クロロタロニル 500 g/L + ジフェノコナゾール 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(農業用の広域殺菌剤)

诺亚安福

氯百菌清 40.0% 重量/重量 + 苯醚甲环唑 4.0% 重量/重量 悬浮剂
[氯百菌清 500 克/升 + 苯醚甲环唑 50 克/升 (550 克/升 悬浮剂)]
(广谱叶面杀菌剂用于农业)

노이안 플로

클로로탈로닐 40.0% 중량/중량 + 디페노코나졸 4.0% 중량/중량 에스씨
[클로로탈로닐 500 그램/리터 + 디페노코나졸 50 그램/리터 (550 그램/리터 에스씨)]
(농업용 광범위 살균제)

Nоян Флоу

Хлоротиалонил 40.0% вес/вес + Дифеноконазол 4.0% вес/вес СК
[Хлоротиалонил 500 г/л + Дифеноконазол 50 г/л СК (550 г/л СК)]
(Универсальный фунгицид для сельскохозяйственного использования)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% भार/भार + डाइफेनोकोनाजोल ४.०% भार/भार एस.सी.
[क्लोरोथालोनिल ५०० ग्रा./ली. + डाइफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./ली. एस.सी. (५५० ग्रा./ली. एस.सी.)]
(बहुपयोगी फिक्कगय फफूंदनाशक कृषि में उपयोग हेतु)

ノヤン フロー

クロロタロニル 40.0% w/w + ジフェノコナゾール 4.0% w/w SC
[クロロタロニル 500 g/L + ジフェノコナゾール 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(農業用の広域殺菌剤)

诺亚安福

氯百菌清 40.0% 重量/重量 + 苯醚甲环唑 4.0% 重量/重量 悬浮剂
[氯百菌清 500 克/升 + 苯醚甲环唑 50 克/升 (550 克/升 悬浮剂)]
(广谱叶面杀菌剂用于农业)

노이안 플로

클로로탈로닐 40.0% 중량/중량 + 디페노코나졸 4.0% 중량/중량 에스씨
[클로로탈로닐 500 그램/리터 + 디페노코나졸 50 그램/리터 (550 그램/리터 에스씨)]
(농업용 광범위 살균제)

Nоян Флоу

Хлоротиалонил 40.0% вес/вес + Дифеноконазол 4.0% вес/вес СК
[Хлоротиалонил 500 г/л + Дифеноконазол 50 г/л СК (550 г/л СК)]
(Универсальный фунгицид для сельскохозяйственного использования)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लू/डब्लू + डाइफेनोकोनाजोल ४.०% डब्लू/डब्लू एससी
[क्लोरोथालोनिल ५०० ग्रा./लि + डाइफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./लि. एससी (५५० ग्रा./लि. एससी)]
(व्यापक भिन्नता फफूंदनाशक कृषिजिनिस ब्यवहार योग्य)

نوياين فلو

كلوروثالونيل 40.0% w/w + ديفينوكونازول 4.0% w/w SC
[كلوروثالونيل 500 g/L + ديفينوكونازول 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(مبيد فطري واسع الطيف لاستخدام الزراعي)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लू/डब्लू + डाइफेनोकोनाजोल ४.०% डब्लू/डब्लू एससी
[क्लोरोथालोनिल ५०० ग्राम/लिटर + डाइफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./लि. एससी (५५० ग्रा./लि. एससी)]
(व्यापक भिन्नता फफूंदनाशक कृषिजिनिस ब्यवहार योग्य)

诺亚安福

氯百菌清 40.0% 重量/重量 + 苯醚甲环唑 4.0% 重量/重量 悬浮剂
[氯百菌清 500 克/升 + 苯醚甲环唑 50 克/升 (550 克/升 悬浮剂)]
(广谱叶面杀菌剂用于农业)

노이안 플로

클로로탈로닐 40.0% 중량/중량 + 디페노코나졸 4.0% 중량/중량 에스씨
[클로로탈로닐 500 그램/리터 + 디페노코나졸 50 그램/리터 (550 그램/리터 에스씨)]
(농업용 광범위 살균제)

Nоян Флоу

Хлоротиалонил 40.0% вес/вес + Дифеноконазол 4.0% вес/вес СК
[Хлоротиалонил 500 г/л + Дифеноконазол 50 г/л СК (550 г/л СК)]
(Универсальный фунгицид для сельскохозяйственного использования)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लू/डब्लू + डाइफेनोकोनाजोल ४.०% डब्लू/डब्लू एससी
[क्लोरोथालोनिल ५०० ग्रा./लि + डाइफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./लि. एससी (५५० ग्रा./लि. एससी)]
(व्यापक भिन्नता फफूंदनाशक कृषिजिनिस ब्यवहार योग्य)

ノヤン フロー

クロロタロニル 40.0% w/w + ジフェノコナゾール 4.0% w/w SC
[クロロタロニル 500 g/L + ジフェノコナゾール 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(農業用の広域殺菌剤)

诺亚安福

氯百菌清 40.0% 重量/重量 + 苯醚甲环唑 4.0% 重量/重量 悬浮剂
[氯百菌清 500 克/升 + 苯醚甲环唑 50 克/升 (550 克/升 悬浮剂)]
(广谱叶面杀菌剂用于农业)

노이안 플로

클로로탈로닐 40.0% 중량/중량 + 디페노코나졸 4.0% 중량/중량 에스씨
[클로로탈로닐 500 그램/리터 + 디페노코나졸 50 그램/리터 (550 그램/리터 에스씨)]
(농업용 광범위 살균제)

Nоян Флоу

Хлоротиалонил 40.0% вес/вес + Дифеноконазол 4.0% вес/вес СК
[Хлоротиалонил 500 г/л + Дифеноконазол 50 г/л СК (550 г/л СК)]
(Универсальный фунгицид для сельскохозяйственного использования)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लू/डब्लू + डाइफेनोकोनाजोल ४.०% डब्लू/डब्लू एससी
[क्लोरोथालोनिल ५०० ग्रा./लि + डाइफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./लि. एससी (५५० ग्रा./लि. एससी)]
(व्यापक भिन्नता फफूंदनाशक कृषिजिनिस ब्यवहार योग्य)

ノヤン フロー

クロロタロニル 40.0% w/w + ジフェノコナゾール 4.0% w/w SC
[クロロタロニル 500 g/L + ジフェノコナゾール 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(農業用の広域殺菌剤)

诺亚安福

氯百菌清 40.0% 重量/重量 + 苯醚甲环唑 4.0% 重量/重量 悬浮剂
[氯百菌清 500 克/升 + 苯醚甲环唑 50 克/升 (550 克/升 悬浮剂)]
(广谱叶面杀菌剂用于农业)

노이안 플로

클로로탈로닐 40.0% 중량/중량 + 디페노코나졸 4.0% 중량/중량 에스씨
[클로로탈로닐 500 그램/리터 + 디페노코나졸 50 그램/리터 (550 그램/리터 에스씨)]
(농업용 광범위 살균제)

Nоян Флоу

Хлоротиалонил 40.0% вес/вес + Дифеноконазол 4.0% вес/вес СК
[Хлоротиалонил 500 г/л + Дифеноконазол 50 г/л СК (550 г/л СК)]
(Универсальный фунгицид для сельскохозяйственного использования)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लू/डब्लू + डाइफेनोकोनाजोल ४.०% डब्लू/डब्लू एससी
[क्लोरोथालोनिल ५०० ग्रा./लि + डाइफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./लि. एससी (५५० ग्रा./लि. एससी)]
(व्यापक भिन्नता फफूंदनाशक कृषिजिनिस ब्यवहार योग्य)

ノヤン フロー

クロロタロニル 40.0% w/w + ジフェノコナゾール 4.0% w/w SC
[クロロタロニル 500 g/L + ジフェノコナゾール 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(農業用の広域殺菌剤)

诺亚安福

氯百菌清 40.0% 重量/重量 + 苯醚甲环唑 4.0% 重量/重量 悬浮剂
[氯百菌清 500 克/升 + 苯醚甲环唑 50 克/升 (550 克/升 悬浮剂)]
(广谱叶面杀菌剂用于农业)

노이안 플로

클로로탈로닐 40.0% 중량/중량 + 디페노코나졸 4.0% 중량/중량 에스씨
[클로로탈로닐 500 그램/리터 + 디페노코나졸 50 그램/리터 (550 그램/리터 에스씨)]
(농업용 광범위 살균제)

Nоян Флоу

Хлоротиалонил 40.0% вес/вес + Дифеноконазол 4.0% вес/вес СК
[Хлоротиалонил 500 г/л + Дифеноконазол 50 г/л СК (550 г/л СК)]
(Универсальный фунгицид для сельскохозяйственного использования)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लू/डब्लू + डाइफेनोकोनाजोल ४.०% डब्लू/डब्लू एससी
[क्लोरोथालोनिल ५०० ग्रा./लि + डाइफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./लि. एससी (५५० ग्रा./लि. एससी)]
(व्यापक भिन्नता फफूंदनाशक कृषिजिनिस ब्यवहार योग्य)

ノヤン フロー

クロロタロニル 40.0% w/w + ジフェノコナゾール 4.0% w/w SC
[クロロタロニル 500 g/L + ジフェノコナゾール 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(農業用の広域殺菌剤)

诺亚安福

氯百菌清 40.0% 重量/重量 + 苯醚甲环唑 4.0% 重量/重量 悬浮剂
[氯百菌清 500 克/升 + 苯醚甲环唑 50 克/升 (550 克/升 悬浮剂)]
(广谱叶面杀菌剂用于农业)

노이안 플로

클로로탈로닐 40.0% 중량/중량 + 디페노코나졸 4.0% 중량/중량 에스씨
[클로로탈로닐 500 그램/리터 + 디페노코나졸 50 그램/리터 (550 그램/리터 에스씨)]
(농업용 광범위 살균제)

Nоян Флоу

Хлоротиалонил 40.0% вес/вес + Дифеноконазол 4.0% вес/вес СК
[Хлоротиалонил 500 г/л + Дифеноконазол 50 г/л СК (550 г/л СК)]
(Универсальный фунгицид для сельскохозяйственного использования)

नोयान फ्लो

क्लोरोथालोनिल ४०.०% डब्लू/डब्लू + डाइफेनोकोनाजोल ४.०% डब्लू/डब्लू एससी
[क्लोरोथालोनिल ५०० ग्रा./लि + डाइफेनोकोनाजोल ५० ग्रा./लि. एससी (५५० ग्रा./लि. एससी)]
(व्यापक भिन्नता फफूंदनाशक कृषिजिनिस ब्यवहार योग्य)

ノヤン フロー

クロロタロニル 40.0% w/w + ジフェノコナゾール 4.0% w/w SC
[クロロタロニル 500 g/L + ジフェノコナゾール 50 g/L SC (550 g/L SC)]
(農業用の広域殺菌剤)

诺亚安福

氯百菌清 40.0% 重量/重量 + 苯醚甲环唑 4.0% 重量/重量 悬浮剂
[氯百菌清 500 克/升 + 苯醚甲环唑 50 克/升 (550 克/升 悬浮剂)]
(广谱叶面杀菌剂用于农业)

노이안 플로

클로로탈로닐 40.0% 중량/중량 + 디페노코나졸 4.0% 중량/중량 에스씨
[클로로탈로닐 500 그램/리터 + 디페노코나졸 50 그램/리터 (550 그램/리터 에스씨)]
(농업용 광범위 살균제)

Nоян Флоу

Хлоротиалонил 40.0% вес/вес + Дифеноконазол 4.0% вес/вес СК
[Хлоротиалонил 500 г/л + Дифеноконазол 50 г/л СК (550 г/л СК)]
(Универсальный фунгицид для сельскохозяйственного использования)