(டிரைக்கோடர்மா விரிடி 1.15% WP)
உயிரியல் பூஞ்சாணக் கொல்லி
2x10^{6}விதைகள் / கிராம் (குறைந்த பட்சம்)

முன்னுரை
பயோக்யூர்-F என்பது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஒரு உயிரியல் பூஞ்சாணக் கொல்லி ஆகும். இது 1.15% WP டிரைக்கோடர்மா விரிடி என்ற பூஞ்சாணத்தின் விதைகளை உள்ளடக்கியது.

பயிர்	நோயின் பெயர்	பரிந்துரை/கிலோவிதை/ஹெக்டேர்		காத்திருக்கும் இடைவெளி
		அளவு	உபயோகிக்கும் முறை	
நிலக் கடலை	நாற்று வாடல் நோய்	4.0 கிராம்/ கிலோ விதை	**1.விதை நேர்த்தி** தேவையான விதைகளை பரிந்துரை செய்த அளவு பயோகியூர் F இட்டு நன்கு கலந்து நிழலில் உலர் வைத்து பிள்ளு விதைக் கவும். **2.மண்ணில் இடுதல்** **2.5 கிலோ பயோக்யூர்-F உடன் 100 கிலோ நன்கு மட்கிய தொழு உரத்தை** கலந்து சீராக ஒரு ஹெக்டேர் நிலத்தில் தூவ வேண்டும்.	தேவையில்லை
		2.5 கி.கி/ ஹெக்டேர்		
கோதுமை	உதிரிக்கரிப் பூட்டை நோய்	4.0 கிராம்/ கிலோ விதை	மேற்சொன்ன வாறு விதை நேர்த்தி செய்தல் அவசியம்	தேவையில்லை
மிளகாய்	வேர் வாடல்	5.0 கிராம்/ கிலோ விதை 5.0 கிராம்/ ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் 3.0 / கி.கி/ ஹெக்டேர்	1.விதை நேர்த்தி மேற்சொன்ன வாறு விதை நேர்த்தி செய்தல் அவசியம் 2.நாற்று நனைப்பு நாற்றுக்களை நடும்முன், அவற்றின் வேர்களை 20 நிமிடங்களுக்கு முக்கி வைக்கவும். 3.மண்ணில் இடுதல் ஒரு ஹெக்டேர்க்கு 3.0 கிலோ T. viride/ 100 கிலோ தொழு உரம் பயிர் நடவு செய்யும் சமயம், பூக்கும் பருவத்திலும் இடவும்.	தேவையில்லை

மண்ணில் இடும் நேரம்
விதை விதைத்த உடனேயோ அல்லது நாற்று நடவுக்குப் பின்னரோ இந்தப் பூஞ்சாணத்தை மண்ணில் இடுவது நல்லது.
உபயோகிக்கும் உபகரணங்கள்
விதை நேர்த்தி செய்ய டிரம் தெளிப்பான் மற்றும் நேப்சேக் தெளிப்பானை உபயோகிப்பது நல்லது.
முதலுவதி
விஷத்தன்மையின் அறிகுறிகள்
தோல் மற்றும் கண் அரிப்பு ஏற்பட்டால், தாராளமாக தண்ணீர் விட்டு பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை கழுவ வேண்டும். மேலும் விஷத்தன்மை தொடர்ந்து காணப்பட்டால் மருத்துவரை அணுகவும்.
விஷமுறிவு
நச்சு அடையாளங்களுக்கேற்ப சிகிச்சை மேற்கொள்ளவும்.
பாதுகாப்பு
டிரைக்கோபிக்ஸ் குளிர்ந்த காற்றோட்டமுள்ள தனி அறையில் உணவு பதார்த்தங்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்கள் இல்லாத இடங்களில் வைத்து பத்திரப்படுத்தி பாதுகாக்க வேண்டும்.
உபயோகித்த பின்னர் அகற்றும் விதம்
1. உபயோகித்த காலி பாக்கெட்டை பயிர் செய்யும் நிலத்தை விட்டு தூரத்தில் இட்டு எரித்துவிட வேண்டும்.
2. உபயோகித்த காலி பாக்கெட்டுகளை திரும்பவும் உபயோகித்தல் கூடாது.
3. பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை மாசுபடுவதை தவிர்க்கலாம்.
முன்னெச்சரிக்கை
1. மருந்தை உபயோகிக்கும் பொழுது தோலின் மீது படுவதையும் மற்றும் மருந்து கலந்த காற்றை சுவாதிப்பதையும் தவிர்க்கவும்.
2. மருந்தை உபயோகிக்கும் பொழுது சாப்பிடுவது, மெல்லுவது, புகைப்பிடிப்பது போன்றவற்றை தவிர்க்கவும்.
3. தெளிப்பான் கரைசல் தயாரிக்கும் பொழுதும், உபயோகிக்கும் பொழுதும், கையுறை, முகமூடி போன்றவை அணிந்து கொள்வது நல்லது.
4. கைகளால் கரைசலை கலக்குவதை தவிர்க்கவும்.
5. உபயோகித்த பின்னர் காலி பாக்கெட்டுகளை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றி விடுவது அவசியம்.

ട്രൈക്കോഡെർമ വിരിഡി 1.15% ഡബ്ലിയു.പി.
ജൈവ കുമിൾനാശിനി
(2x10^6 സി.എഫ്.യുസ് ഗ്രാമിൽ) എങ്കിലും

പരിചയപ്പെടുത്തൽ (ആമുഖം)
ട്രൈക്കോഡെർമ വിരിഡി എന്ന മിത്രകുമിളിൻെറ സ്പോറുകൾ അടങ്ങിയ പരിസര സ്നേഹിയായ ഒരു ജൈവ കുമിൾ നാശിനിയാണിത്.

വിള	രോഗത്തിൻെറ പേർ	അളവ്		കാത്തിരിപ്പ് സമയം
		ഒരുഹെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടഅളവ്	ഒരുകിലോ വിത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്	
നിലക്കടല	വാട്ടം (ഉണക്കം)	4.0ഗ്രാം ഒരുകിലോ വിത്തിന് തണലിൽ ഉണക്കി	**വിത്തിൽ പുരട്ടാൻ** നിർദ്ദിഷ്ട അളവിൽ കുമിൾ നാശിനി നിർദ്ദിഷ്ട അളവിലുള്ള വിത്തിൽ നന്നായി കലർത്തി (ഒരുപോലെ) വിതയ്ക്കുക. **മണ്ണിൽഉപ യോഗിക്കാൻ** 100കിലോ ഗ്രാം പൊടിഞ്ഞ കാലി വളത്തിൽ2.5 കിലോ കുമിൾനാശി കലർത്തി ഒരു ഹെക്ടറിൽ ഒരേപോലെ വിതറുക.	2.5 kg/ha	ഇല്ല
ഗോതമ്പ്	ലൂസ്സ്മെട്ട്	4.0ഗ്രാം ഒരു കിലോ വിത്തിന്	വിത്തിൽ പുരട്ടാൻ	ഇല്ല
മുളക്	റൂട്ട് വാട്ടം	5.0 ഗ്രാം/ കി. ഗ്രാം വിത്ത് 5.0 ഗ്രാം/ ലിറ്റർ വെള്ളം 3.0 കി. ഗ്രാം/ ഹെക്ടർ	**വിത്തിൽ പുരട്ടാൻ** മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ **തൈകൾ മുക്കുക** നടുന്ന സമയത്ത് തൈകളുടെ വേരുകൾ 20 മിനിറ്റ് മുക്കിവയ്ക്കുക. **മണ്ണിൽഉപ യോഗിക്കാൻ** ഒരു ഹെക്ടറിന്: 3.0 കിലോഗ്രാം T വിരിഡെ 100 കിലോഗ്രാം കാലിവളവുമായി കലർത്തി. വിള നടീൽ സമയത്തും പൂവിടുന്ന ഘട്ടത്തിലും പ്രയോഗിക്കുക.		ഇല്ല

ഉപയോഗസമയം
നട്ട ഉടനെയോ വിതച്ച ഉടനെയോ മണ്ണിൽ വിതറാനായിഉപയോഗിക്കാം.
ഉപയോഗിക്കേണ്ടഉപകരണം
വിത്തിൽ കുമിൾ നാശിനി പുരട്ടാൻ ഡ്രം, ഇലകളിൽ തളിക്കാൻകുറ്റിപിമ്പുകൾ, മർദ്ദസ്പ്രെയറുകൾ, പൗഡർസ്പ്രെയറുകൾ.
പ്രഥമശുശ്രൂഷ വിഷഭാധാലക്ഷണം
ദേഹത്ത് സ്പർശിച്ചാൽ ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ വൈദ്യ സഹായം തേടുക. ദേഹത്തും കണ്ണിലും ചൊറിച്ചിലും ചർദിയുമാണ് വിഷബാധാലക്ഷണങ്ങൾ.
മറുമരുന്ന്
വിഷബാധാലക്ഷണമനുസരിച്ച്
സൂക്ഷിപ്പ്
ട്രൈക്കോഫിക്സ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി കലർത്താതെപ്രത്യേകമുറികളിൽഅലമാരകളിലാക്കി സുരക്ഷിതമായിസൂക്ഷിക്കുക.
നശിപ്പിക്കൽ
1. കുടുകളും ടിന്നുകളും കീറിമുറിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കി ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ച് മൂടുക.
2. പുനരുപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻഇവ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കിനശിപ്പിക്കുക.
3. കുടുകളും, ടിന്നുകളും ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോളുള്ള കുമിൾ നാശിനി കലർന്ന ജലാവശിഷ്ടവും, പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതെസുരക്ഷിതമായസ്ഥലത്ത്നശിപ്പിക്കുക.
മുൻകരുതൽ
1. കുമിൾ നാശിനി ശ്വസിക്കുകയോ, വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
2. ഉപയോഗ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുക, വെള്ളം കുടിയ്ക്കുക, മുറുക്കുക, പുകവലിയ്ക്കുകഎന്നിവ ഒഴിവാക്കണം.
3.കണ്ണട,കയ്യുറ,മുഖംമൂടിഎന്നിവകുമിൾനാശിനി കലക്കുമ്പോൾഉപയോഗിക്കുക.
4. കയ്യുറ ധരിക്കാതെ കുമിൾ നാശിനി വെള്ളത്തിൽ കലക്കരുത്.
5. ഉപയോഗശേഷം ശൂന്യമായകുടുകൾ, ടിന്നുകൾ എന്നിവനശിപ്പിക്കുക.

ट्राइकोडरमा बिरिडि 1.15 प्रतिशत
घुलनशील चूर्ण
जैविक फफूंदनाशक
2x10^6 *cfu's* / ग्राम मिनिमम

भूमिका
ट्राइकोडरमा बिरडी वुलनशील चूर्ण एक पर्यावरण के लिए सुरक्षित जैव रोग नियंत्रक है। जिसमें ट्राइकोडरमा बिरडी फफूंद का जीवाणु मौजूद है।

फसल का नाम	बिमारी का सामान्य नाम	मात्रा प्रति किलो बीज या प्रति हेक्टेयर		इतंजार का समय
		संरचना	उपयोग करने की विधि	
मूगँफली	बीजोढ़ उक्टा	4.0gm/Kg seeds 2.5 kg/ha	**बीज उपचार** आवश्यकतानुसार बीज की मात्रा को ट्राइकोडरमा बिरडी घुलनशील चूर्ण की उचित मात्रा के अनुसार मिलाते समय यह सुनिश्चित कर लें कि बीज पर समान रूप से लिप जाए। फिर छाया सुखाकर बुवाई करें **भूमि उपचार** 100 किलो कम्पोस्ट खाद में ढाई किलो ट्राइकोडरमा बिरडी को अच्छी तरह मिलाकर खेत में छिड़कें। बीज उपचार उपरोक्त	नही नही
गेंहू	अनावृत कण्ड	4.0gm/Kg seeds	**बीज उपचार** जैसा ऊपर उल्लिखित है	नही
मिर्च	जड़ मुरझान	5.0gm/Kg seeds 5.0gm/ lit. water 3.0 kg/ha	**बीज उपचार** जैसा ऊपर उल्लिखित है **पौध डुबोना** पौधों को रोपने के समय,उनकी जड़ों को 20 मिनट के लिए डुबोकर रखें। **भूमि उपचार** प्रति हेक्टेयर: 3.0 किलोग्राम T. viride को 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाए। इसे फसल की बुवाई के समय और फूल आने की अवस्था में प्रयोग करें।	नही

छिड़काव का समय
जमीन पर बोने या रोपने तुरन्त बाद इस लगा सकते है। उपयोग में आने वाले यंत्र : बीज उपचार ड्रम यंत्र, जैसे पीठ पर लाइने वाला, पीठ पर लादकर दबावयुक्त छिड़काव यंत्र, शक्ति चालित पीठ पर लादकर दवाव में चलने वाला छिड़काव यंत्र, एस.पी. शक्ति चालित छिड़काव यंत्र।
जहर चढ़ने के लक्षण एवं प्राथमिक चिकित्सा
यदि यह आँखों में पड जाए तो अच्छी तरह ऑखों को पानी से धो डालें। अगर लक्षण दिखे ती तुरन्त डाक्टर के पास जाए। त्वचा और ऑखों मे जलन ही, उल्टी हो तो उपचार लक्षण अनुसार करे।
संग्रह
ट्राईकोडरमा बिरडी एक अलग कमरे में या जगह में दूसरे पदार्थ खासकर जगह से दूर रखे, इसी अलग अल्मारियों में वाला चाबी लगाकर रखना चाहिए।
खाली डब्बों का निपटारा
१.इसके खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोडफोड कर अबादी से दूर जमीन में गाड दे।
२.उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग में न लाने के लिए बाहर खुला न छोंडें।
३.डिब्बे, बचा हुआ फॉगीसाईड और यंत्रों का धोवन इस विधि से निपटारा करें कि जिसे पीने का पानी तथा वातावरण दुषित न हों।
सावधानियाँ
१.इसको न सूंघें और न ही इसे छूऐं।
२.इसे खाली हाथों से नहीं मिलाना चाहिए।
३.छिड़काव करने के समय सुरक्षित वस्त्र, चश्मा, हाथों के दस्तानें और ऐप्रिम का प्रयोग करें।
४.उपयोग के समय खाना-पीना और धूम्रपान करना मना है।
५.उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट कर दें।

(ट्रैकोडर्मा विरिडी 1.15% (W.P.)
जैव शिलींध्रनाशक
2x10^6 Cfu's / ग्रामु कनिष्ठमु

परिचयमु
ट्रैकोडर्माविरिडी अनेदि ऒक मंचि जैव संबंध शिलींध्रमु इदि ट्रैकोडर्मा विरिडि बूजू कलिगि उंटुंदि.
मोतादु मरियु सिफारुलु :

पंटल	रोगमु पेरु मंदु	मोतादु / कैजे/ वित्तनमु		वेचिउंडे डवलसिन समयंमु
		वाडे विधानंमु	हेक्टारुकु	
वेरुशेनग	वित्तनकुळ्ळु	4.0gm/Kg seeds 2.5 kg/ha	**वित्तन शुद्धि** तगिनंत वित्तनमुनकु तगिनंत ट्रैकोडर्माविरिडि इ.आ. नु कलिपि समानंगा नीदलो आरबेट्टवलयुनु **भूमिलो वादुटकु** 2. 5 कैजीलु ट्रैकोडर्माविरिडि इ.आ. नु 100 कैजीलु बागा कुळ्ळिन पश्वुल एरुवुलो कलिपि ऒक हेक्टार्ल नेलकु समानंगा चल्लवलयुनु.	*Nil*
गोधुमु	लूज्स्मुट्	4.0gm/Kg seeds	**वित्तन शुद्धि** पैन पेर्कॊन्नटुग	*Nil*
मिरप	वेरु वाडिपोवडं	5.0gm/Kg seeds 5.0gm/ lit. water 3.0 kg/ha	**वित्तन शुद्धि** पैन पेर्कॊन्नटुगा **मॊक्कल वेर्ल मुंचु चिकित्स** नारु मॊक्कलनु नाकॆ समयंलो, वाटि वेर्लनु 20 निमिषाल पाटु मुंचंडि. **भूमिलो वादुटकु** हेक्टारुकु: 3.0 कॆ.ग्रा. T. viride नु 100 कॆ.ग्रा. पश्वुल एरुवुतो कलिपि, पंट्ल नाकॆ समयंलोनु, पुष्प दशलोनू वेयाली.	

वादवलसिन समयमु :
दॆनिनि भूमिलो वित्तनमु चल्लॆमयमुलोगानि चल्लिन तर्वात्वगानि उपयोगिंचवच्चुनु.
वादुटकु कावलसिन परिकरमुलु
वित्तन शुद्धि द्रमुलु, पिचिकारी कॊरकु नाप्सॉक् स्प्रेयर् कंप्रेशन् नाप्सॉक् स्प्रेयर्, कंप्रेशन् नाप्सॉक् ब्यॊटरी स्प्रेयर् ASPEE हॆच्.टी.पि. पवर् स्प्रेयर्
प्रथम चिकित्स :
विषप्रभावलक्षणमुलु :
ऒक वेळ ताकिनचॆ ऎक्कुव नीटितो शुभ्रंगा कडुगवलॆनु. ऒक वेळ लक्षणमुलु ऎक्कुवगा उन्नचॆ दाक्टरुनु संप्रदिंचि तगिन मंदुलु वादवलयुनु. चर्मामु, कळ्ळु मंटगा **अनिपिंचवच्चुनु.**
विरुगुदु चर्य :
रोग लक्षणालनु बट्टि चिकित्स चॆयवलयुनु.
निल्व :
ट्रैकोफिक्स् नु कलिगिन दब्बालनु विडिगा वॆरॆगदुललो उंचवलयुनु. ई मंदु दब्बालनु उन्न गदिलो ए विधमयिन आहार पदार्थमुलु उंचरादु. ई मंदुनुनु उंचिन रूममुकु तालं वॆसि उंचवलयुनु. ई मंदु निल्वकोसंगु उपयोगिंचिन गदिकि गालि वॆलुतुरु मरियु पॊडि वातावरणमु उंदुनट्लु चॆयुट उपयोगकरमु.
वाडिन दब्बालनु नाशनं चॆयु विधानमु
1.दब्बालनु नाशनं चॆसि परिसरालकु दूरंगा उंचवलयुनुनि.
2.वाडिन दब्बालनु परिसर प्रांतालल्लो अलागॆ वदिलि वॆयरादु
3.दब्बालु मिगिलिन पदार्थालु यंत्रमुललो वाडिन वस्तुवुलु मरियु दब्बालु नाशनं चॆसि वातावरणं मरियु नीरु कालुष्यमु काकुंडा उंचवलॆनु.
मंदु जाग्रत्तुलु :
1.श्वासकु चर्म्मानिकि दूरंगा उंदुनट्लु चॆयवलयुनु.
2. मंदुवाडु समयमुलो तिनुट, पॊगत्रागुट, नमुलुट, त्रागुट चॆयरादु
3.मंदु तयारुचॆयुनप्पुडु, पिचिकारी चॆयुनप्पुडु चॆतितॊडुगुलु कळ्ळ अद्दमुलु, गाली निरोधकमुलु वादवलयुनु.
4.वट्टि चॆतुलतो कलपरादु.
5.वाडिन तर्वात्व खाळीदब्बालनु नाशनं चॆयवलयुनु.

(ট্রৈকোডর্মা বিরডি 1.15% wp)
জৈবিক–শিলীন্দ্রনাশক
2x10^6 cfu's / গ্রাম কনিষ্ঠ

প্রস্তাবনে
ট্রৈকোডর্মা বিরডি, পরিসর স্নেহি জৈবিক–শিলীন্দ্রনাশক. শিলীন্দ্রদ বীজ কণগলনু হোন্দিরুত্তদে.

ಬೆಳೆ	ಬೆಳೆ	ಹಕ್ಕೋಳ್ಳಾದು ಪ್ರತಿ ಕ.ಜಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣ		ನಿರಿಕ್ಷಿಯ ಅವಧಿ
		ಸಂಯೋಜನೆ	ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ	
ನೆಲಗಡಲೆ	ಮೊಳಕೆ ಒಣಗುವಿಕೆ	4.0gm/Kg seeds 2.5 kg/ha	ಬೀಜೋಪಚಾರಕ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಬೀಜವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಟ್ರೈಎರಡೆ wp ದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಣಮಾಡಿ. ಸಮಾನಾಗಿ ಬೀಜಕ್ಕೆಲೇಪನ ಆಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೆನಿಂದು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದಂತರ ಬೀಜನಾಟ ಮಾಡು ಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇದ ಮಾಡುವಕ್ರಮ 21/2. ಕೆ.ಜಿ. ಟ್ರೈಎರಡಿ wp ಅನ್ನು 100 ಕೆ.ಜಿ.ಸುದವಾಕಿ ಕೆಳಿರುವ ಕೆಣುಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಣಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಗಿ ಹರಡಬೇಕು.	ಇಲ್ಲ
ಗೋಧಿ	ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ	4.0gm/Kg seeds	ಬೀಜೋಪಚಾರಕ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ	ಇಲ್ಲ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ರೂಟ್ ವಿಲ್ಟ್	5.0gm/Kg seeds 5.0gm/ lit. water 3.0 kg/ha	ಬೀಜೋಪಚಾರಕ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊಳಕೆ ಅದು: ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಸಿಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ರಿಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆ: ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ: 3.0 ಕೆಜಿ *ಟಿ. ವಿರಿಡಿ* ಅನ್ನು 100 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ.	ಇಲ್ಲ

ಬಳಕೆಗೆ ಕಾಲ
ಒಟ್ಟುಪಾವತಿಯಿಂದ ನಾಟಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಳ್ಳವೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಹದಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಚರಬಹುದು.
ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಪಕರಣಗಳು
ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಡ್ರಂಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಲಿಯರ್ (ತೆಳುರೇಖಾ) ಸಿಂಪರಣಾ ರಂಗಂತ್ರಗಳು ಅವುಗಳಿಂದರೆ.ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪರಣಯಂತ್ರ. ಒತ್ತಡದ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪರಣಯಂತ್ರ. ಬ್ಯಾಟರಿಚಾಲಿತ ಒತ್ತಡ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಯಂತ್ರ ASPEE HTP ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಂಪಡಣ ಯಂತ್ರ.
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಾಶಕಶಾಗಿದ್ದರೆ ಯಥೇಚ್ಛನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಲಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಜತಗೆ ಓಕರಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವಿಷಾಪಹಾರಿ
ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.
ದಾಸ್ತಾನು.
ಟ್ರೈಕೊಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು. ನಾಶಕದ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಗಮನಿಸಿ ಬೀಗದಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕು.
ವಿಲೇವಾರಿ
1. ಜನವಸತಿ ಇರದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಡೆದ ಪೊಟ್ಟಣ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಬೇಕು. ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಅಸ್ಪದ ಆಗದಂತೆ
ನಾಶಕದ ಡಬ್ಬ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು.
2. ಡಬ್ಬ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು, ಉಳಿಕೆ ನಾಶಕಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ.
1. ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಆವಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಾಗಲಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಾಗಲಿ. ಮಾಡಕೂಡದು.
2. ನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಕೆಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ಚಿಪ್ಪರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೇದುವುದನ್ನು.
3. ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ, ಕೈಚೀಲ, ಗಾಳಿಮುಖವಾಡವನ್ನು ಸಿಂಪರಣ ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಂಧರ್ಬ ಧರಿಸಬೇಕು. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡ
ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಬರಿಗೈಲಿ ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಾರದು. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
5. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.

AgroStar®

TRICHOFIX
(Trichoderma Viride 1.15% WP)
(Bio Fungicide)

ट्राइकोफिक्स
(ट्राइकोडर्मा विरिडे 1.15% डब्ल्यूपी)
(जैव फफूंदनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Regd. Office Nos 001 and 002, Ground Floor, Wing A, And Nos 003 and 004, Ground Floor Wing B, Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune, Maharashtra- 411014
Manufactured By: T. STANES AND COMPANY LIMITED. No.8/23-24, Race Course Road, Coimbatore - 641 018

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

(ٹرائیکوڈرما ویریڈے 1.15% WP)

حیاتیاتی پھپھوندی کش

سی ایف یو / گرام (کم از کم) 2×10^6

تعارف

ٹرائیکوڈرما ویریڈے ایک ماحول دوست حیاتیاتی پھپھوندی کش ہے جس فنگس کے بیضے شامل ہوتے ہیں۔ TRICHODERMA VIRIDE میں

فصل	بیماری کا نام	مقدار (فارمولیشن)	طریقۂ استعمال	انتظار کی مدت
مونگ پھلی	سیڈلن گ ولٹ	4.0 گرام/کلوگرام بیج	بیج کا علاج: مطلوبہ مقدار میں WP ٹرائیکوفکس کو بیجوں کے ساتھ اچھی طرح ملا کر یکساں تہہ جڑھائیں، سایہ میں خشک کر کے بوائی کریں۔ مٹی میں استعمال: 2.5 کلوگرام WP ٹرائیکوفکس کو 100 کلوگرام اچھی طرح گلی سڑی کھاد کے ساتھ ملا کر فی ہیکٹر زمین میں یکساں طور پر پھیلائیں۔	ندارد
گندم	لوز اسمٹ	4.0 گرام/کلوگرام بیج	بیج کا علاج: جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے۔	ندارد
مرچ	روٹ ولٹ	5.0 گرام/کلوگرام بیج؛ 5.0 گرام/لیٹر پانی	بیج کا علاج: جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے۔ پنیری کی جڑوں کو ڈبونا: منتقلی سے پہلے جڑوں کو 20 منٹ تک محلول میں ڈبوئیں۔ مٹی میں استعمال: 3.0 کلوگرام WP ٹرائیکوفکس کو 100 کلوگرام گلی سڑی کھاد کے ساتھ ملا کر فی ہیکٹر یکساں طور پر پھیلائیں۔	ندارد

:استعمال کا وقت

حفاظتی یا برائی کے فوراً بعد کھیت میں مٹی کے استعمال کے طور پر لگایا جا سکتا ہے۔

:استعمال ہونے والے آلات

بیج کے علاج کے ڈرم اور پتوں پر اسپرے کرنے والے آلات جیسے نیپ سیک اسپرے ٹر، کمپریشن نیپ سیک اسپرے ٹر، کمپریشن بیٹری نیپ سیک اسپرے ٹر اور پاور اسپرے ٹر۔

:ابتدائی طبی امداد / زہر کی علامات

رابطہ ہونے کی صورت میں کافی مقدار میں پانی سے دھوئیں۔ اگر علامات برقرار رہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جلد اور آنکھوں میں جلن اور متلی ہو سکتی ہے۔

:تریاق

علامات کے مطابق علاج کریں۔

:ذخیرہ

ٹرائیکوفکس کو خوراکی اشیاء اور دیگر سامان رکھنے کی جگہوں سے دور الگ کمروں یا مقامات پر ذخیرہ کریں۔ مصنوعات کی مقدار اور نوعیت کے مطابق مقفل الماریوں میں رکھیں۔

:تلفی

پیکٹوں کو توڑ کر آبادی سے دور دفن کریں۔ 1.
استعمال شدہ پیکٹ دوبارہ استعمال سے بچانے کے لیے بابرنہ جھونڑیں۔ 2.
زائد مواد اور مشینوں و برتنوں کی دھلائی کو محفوظ طریقے سے تلف کریں تاکہ ماحولیاتی آلودگی نہ ہو۔ 3.

:احتیاطی تدابیر

محلول بناتے وقت سانس کے ذریعے اندر جانے اور جلد سے رابطے سے بچیں۔ 1.
استعمال کے دوران کھانا، پینا، تمباکو چبانا یا سگریٹ نوشی نہ کریں۔ 2.
محلول تیار کرتے وقت چشمہ، دستانے اور ماسک استعمال کریں۔ 3.
گیلے ہاتھوں سے نہ ملائیں۔ 4.
استعمال کے بعد خالی برتن تلف کر دیں۔ 5.

(ট্ৰাইকোডাৰ্মা ভিৰিডে ১.১৫% WP)

জৈৱ ছত্ৰাকনাশক

2×10^6 সিএফইউ / গ্ৰাম (ন্যূনতম)

ভূমিকা

ট্ৰাইকোডাৰ্মা ভিৰিডে একটি পৰিবেশবান্ধৱ জৈৱ ছত্ৰাকনাশক, যাতে TRICHODERMA VIRIDE ছত্ৰাকৰ স্পোৰ (বীজাণু) থাকে।

ফসল	রোগের নাম	মাত্রা (ফর্মুলেশন)	প্রয়োগ পদ্ধতি	অপেক্ষাকাল
চিনাবাদাম	সিডলিং উইল্ট	8.0 গ্রাম/কেজি বীজ	বীজ শোধন: প্রয়োজনীয় পরিমাণ ট্রাইকোফিক্স WP বীজের সঙ্গে মিশিয়ে সমানভাবে প্রলেপ দিন, ছায়ায় শুকিয়ে বপন করুন। মাটি প্রয়োগ: ২.৫ কেজি ট্রাইকোফিক্স WP ১০০ কেজি পচা গোবর সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি হেক্টরে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন	নেই
গম	লুজ স্মাট	8.0 গ্রাম/কেজি বীজ	বীজ শোধন: উপরে বর্ণিত অনুযায়ী	নেই
মরিচ	রুট উইল্ট	৫.০ গ্রাম/কেজি বীজ; ৫.০ গ্রাম/লিটার পানি	বীজ শোধন: উপরে বর্ণিত অনুযায়ী। চারা মূল ডুবানো: রোপণের আগে চারার মূল ২০ মিনিট দ্রবণে ডুবিয়ে রাখুন। মাটি প্রয়োগ: ৩.০ কেজি ট্রাইকোফিক্স WP ১০০ কেজি পচা গোবর সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি হেক্টরে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন	নেই

প্রয়োগের সময়:
রোপণ বা বপনের পরপরই জমিতে মাটি প্রয়োগ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি:
বীজ শোধন ড্রাম এবং পাতায় স্প্রে করার যন্ত্র যেমন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ব্যাটারি ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার এবং ASPEE HT পাওয়ার স্প্রেয়ার।

প্রাথমিক চিকিৎসা / বিষক্রিয়ার লক্ষণ:
সংস্পর্শে এলে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। লক্ষণ অব্যাহত থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ত্বক ও চোখে জ্বালা এবং বমি বমি ভাব হতে পারে।

প্রতিষেধক:
লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

সংরক্ষণ:
ট্রাইকোফিক্স খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্য সংরক্ষণের স্থান থেকে দূরে পৃথক কক্ষ বা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। পণ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী তালাবদ্ধ আলমারিতে রাখতে হবে।

নিষ্পত্তি:

1. প্যাকেট ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
2. ব্যবহৃত প্যাকেট পুনঃব্যবহার রোধে বাইরে ফেলে রাখবেন না।
3. অতিরিক্ত উপাদান এবং যন্ত্র ও পাত্র ধোয়ার পানি নিরাপদে নিষ্পত্তি করুন যাতে পরিবেশ দূষণ না হয়।

সতর্কতা:

1. দ্রবণ তৈরির সময় শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ এবং ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
2. প্রয়োগের সময় খাওয়া, পান করা, তামাক চিবানো বা ধূমপান করবেন না।
3. স্প্রে দ্রবণ তৈরির সময় গগলস, দস্তানা ও মাস্ক ব্যবহার করুন।
4. খালি হাতে মিশ্রণ করবেন না।
5. ব্যবহারের পর খালি পাত্র ধ্বংস করুন।

(ट्रायकोडर्मा विरिडे 1.15% WP)

जैविक बुरशीनाशक

2×10^6 सीएफयू / ग्रॅम (किमान)

परिचय

ट्रायकोडर्मा विरिडे हे पर्यावरणपूरक जैविक बुरशीनाशक असून त्यामध्ये TRICHODERMA VIRIDE या बुरशीचे बीजाणू असतात.

पीक	रोगाचे नाव	मात्रा (फॉर्म्युलेशन)	वापरण्याची पद्धत	प्रतीक्षा कालावधी
भुईमूग	टोप मर (सीडलिंग विल्ट)	4.0 ग्रॅम/कि.ग्रॅ. बियाणे	**बीज प्रक्रिया: ट्रायकोफिक्स WP आवश्यक प्रमाणात बियाण्यांवर समान लेप करून सावलीत वाळवून पेरावे. मृदा वापर: 2.5 कि.ग्रॅ. ट्रायकोफिक्स WP हे 100 कि.ग्रॅ. चांगले कुजलेले शेणखत यामध्ये मिसळून प्रति हेक्टर समान पसरावे.**	नाही
गहू	लूज स्मट	4.0 ग्रॅम/कि.ग्रॅ. बियाणे	**बीज प्रक्रिया: वरीलप्रमाणे.**	नाही
मिरची	मूळकूज / रूट विल्ट	5.0 ग्रॅम/कि.ग्रॅ. बियाणे; 5.0 ग्रॅम/लिटर पाणी	**बीज प्रक्रिया: वरीलप्रमाणे. रोप मुळ बुडविणे: लागवडीपूर्वी मुळे २० मिनिटे द्रावणात बुडवावीत. मृदा वापर: 3.0 कि.ग्रॅ. ट्रायकोफिक्स WP हे 100 कि.ग्रॅ. कुजलेल्या शेणखतात मिसळून प्रति हेक्टर समान पसरावे.**	नाही

वापरण्याची वेळ:
लागवड किंवा पेरणीनंतर लगेच शेतात मृदा अनुप्रयोगाद्वारे वापरता येते.

वापरण्यात येणारी उपकरणे:
बियाणे प्रक्रिया ड्रम तसेच नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर आणि ASPEE HT पॉवर स्प्रेयर.

प्रथमोपचार / विषबाधेची लक्षणे:
संपर्क झाल्यास भरपूर पाण्याने धुवा. लक्षणे कायम राहिल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वचा व डोळ्यांची जळजळ तसेच मळमळ होऊ शकते.

प्रतिविष:
लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

साठवण:
ट्रायकोफिक्स हे अन्नपदार्थ व इतर वस्तू साठवण्याच्या जागेपासून दूर स्वतंत्र खोलीत किंवा ठिकाणी साठवावे. उत्पादनाच्या प्रमाण व स्वरूपानुसार कुलूपबंद कपाटात ठेवावे.

विल्हेवाट:

1. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरावीत.
2. वापरलेली पॅकेजेस पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर टाकू नयेत.
3. उरलेले साहित्य तसेच यंत्रे व कंटेनर धुतल्याचे पाणी सुरक्षितरीत्या विल्हेवाट लावावे जेणेकरून पर्यावरणाचे प्रदूषण होणार नाही.

खबरदारी:

1. द्रावण तयार करताना श्वासावाटे आत जाणे व त्वचेचा संपर्क टाळावा.
2. वापरादरम्यान खाणे, पिणे, तंबाखू चघळणे किंवा धूम्रपान करू नये.
3. फवारणीचे द्रावण तयार करताना गॉगल्स, हातमोजे व मास्क वापरावेत.
4. उघड्या हातांनी मिश्रण करू नये.
5. वापरानंतर रिकामे कंटेनर नष्ट करावेत

(ટ્રાઈકોડરમા વિરીડે 1.15% WP)

જૈવિક ફહૂંદનાશક

2×10^6 સીએફયુ / ગ્રામ (ઘટે-ઘટ)

જાણ-પહ્ચાણ

ટ્રાઈકોડરમા વિરીડે ઇંક પરિઆવરણ-મિત્તર જૈવિક ફહૂંદનાશક હૈ, જિસ વિંચ TRICHODERMA VIRIDE ફહૂંદ દે બીજાણુ શ્રામલ હન।

ઢમલ	ખિમારી દા નામ	માતરા (ઢારમુલેશન)	વરતેં દા તરીકા	ઉડીક અવપી
મુંગફલી	સીડલિંગ વિલ્ટ	4.0 ગ્રામ/કિલો બીજ	**બીજ ઇલાજ: લેઝીંદી માતરા વિંચ ટ્રાઈકોડિકમ WP નાલ બીજાં ઠું મિલા કે ઇકસાર પરત લગાઈ, છાં વિંચ સુકા કે બીજે। મિંટી વિંચ વરતેં: 2.5 કિલો ટ્રાઈકોડિકમ WP ઠું 100 કિલો ચંગી તરૂં સડી હોઈ ખાદ નાલ મિલા કે પૂરી હૈકટેઅર સમાન તૌર 'તે ફિડકે।**	નહીં
ઘઉં	લૂઝ સ્મટ	4.0 ગ્રામ/કિલો બીજ	**બીજ ઇલાજ: ઉપરોકત અનુસાર।**	નહીં
મિરચ	રૂટ વિલ્ટ	5.0 ગ્રામ/કિલો બીજ; 5.0 ગ્રામ/લીટર પાણી	**બીજ ઇલાજ: ઉપરોકત અનુસાર। પૌધા જડ ડૂંબકી: રોપણી તેં પહિલાં જડાં ઠું 20 મિંટ લઈ ઘોલ વિંચ ડૂંબે। મિંટી વિંચ વરતેં: 3.0 કિલો ટ્રાઈકોડિકમ WP ઠું 100 કિલો સડી હોઈ ખાદ નાલ મિલા કે પૂરી હૈકટેઅર સમાન તૌર 'તે ઢૈલાઓ।**	નહીં

વરતેં દા સમાં:
રોપાઈ જાં બિજાઈ તેં તુરંત બાઅદ ખેત વિંચ મિંટી વિંચ લાગુ કીતા જા સકદા હૈ।

વરતે જાન વાલે ઉપકરટ:
બીજ ઇલાજ ડરીમ અતે પૌંતી છિડકાઅ ખંતર જિવેં નૈપમૈક સપરેઅર, કંપ્રૈશન નૈપસૈક સપરેઅર, કંપ્રૈશન બૈટરી નૈપમૈક સપરેઅર અતે ASPEE HT પાવર સપરેઅર।

મુંચલી સરાઇતા / ઝહિર દે લૅંછટ:
સંપરક હોટ દી સથિતી વિંચ બહુત સારે પાણી નાલ ધોવે। જે લૅંછટ જારી રહિટ તાં તુરંત ડાકટર નાલ સંપરક કરે। ચમડી અતે અંખાં વિંચ જલટ અતે મતલી હે સકદી હૈ।

પ્રતિવિષ:
લૅંછટાં અનુસાર ઇલાજ કરે।

ઢંડારન:
ટ્રાઈકોફિકસ ઠું ખાન-પીટ વાલીઆં વસ્તુઆં તેં દુર વૅખરે કમરે જાં સથાન વિંચ સંભાલે। ઉત્પાદ દી માતરા અતે પ્રકિરતી અનુસાર તાલાબંદ અલમારી વિંચ રંખે।

નિપટારા:

1. પૈકેટાં ઠું તોડ કે આબાદી વાલે ખેતર તેં દુર દંખ દિઓ।
2. વરતે હોટે પૈકેટાં ઠું દુબારા વરતેં રોકટ લઈ બાહર ના છંડે।
3. બચી સમંગારી અતે મશીનાં તે ભાંડિઆં દી ધુલાઈ દા પાણી સુરંખિઅત ઢંગ નાલ નિપટાઓ તાં જે વાતાવરટ પ્રદુશિત ના હોવે

સાવપાનીઆં:

1. ઘોલ બટાઉંદે સમેં સાહ રાહીં અંદર ના જાટ દિઓ અતે ચમડી નાલ સંપરક તેં બચે।
2. વરતેં દૌરાન ખાટા, પીટા, ચબાઉટા જાં ધુમરપાન ના કરે।
3. ઘોલ તિઆર કરદે સમેં મૌનક, દસતાને અતે માસક પહિને।
4. ઠંગે હંથાં નાલ ના મિલાઓ।
5. વરતેં તેં બાઅદ ખાલી ભાંડિઆં ઠું નશટ કરે।

(ट्राइकोडर्मा विरिडे 1.15% WP)

जैविक फहूँदनाशक

2×10^6 सीएफयु / ग्राम (न्यूनतम)

परिचय

ट्राइकोडर्मा विरिडे एक पर्यावरणमैत्री जैविक फुगनाशक छे, जेमां TRICHODERMA VIRIDE फूगना बीजाणुओ समाविष्ट छे.

પાક	રોગનું નામ	માત્રા (ફોર્મ્યુલેશન)	ઉપયોગની પદ્ધતિ	રાહ જોવાની અવધિ
મગફળી	અંકુર સુકાવો (સીડલિંગ વિલ્ટ)	4.0 ગ્રામ/કિગ્રા બીજ	**બીજ ઉપચાર: જરૂરી માત્રામાં ટ્રાઇકોફિક્સ WP સાથે બીજને મિશ્રિત કરી સમાન પડ ચઢાવો, છાયામાં સુકવી વાવો. માટી ઉપયોગ: 2.5 કિગ્રા ટ્રાઇકોફિક્સ WP ને 100 કિગ્રા સારી રીતે સડી ગયેલા ખાતર સાથે મિશ્રિત કરીને પ્રતિ હેકટર જમીનમાં સમાન રીતે ફેલાવો.**	નથી
ઘઉં	લૂઝ સ્મટ	4.0 ગ્રામ/કિગ્રા બીજ	**બીજ ઉપચાર: ઉપર મુજબ.**	નથી
મરચાં	મૂળ સુકાવો (રૂટ વિલ્ટ)	5.0 ગ્રામ/કિગ્રા બીજ; 5.0 ગ્રામ/લિટર પાણી	**બીજ ઉપચાર: ઉપર મુજબ. રોપાની મૂળ ડૂબાડવાની પદ્ધતિ: રોપાના મૂળોને રોપણી પહેલાં 20 મિનિટ સુધી દ્રાવણમાં ડૂબાડો. માટી ઉપયોગ: 3.0 કિગ્રા ટ્રાઇકોફિક્સ WP ને 100 કિગ્રા સારી રીતે સડી ગયેલા ખાતર સાથે મિશ્રિત કરીને પ્રતિ હેકટર જમીનમાં સમાન રીતે ફેલાવો.**	નથી

ઉપયોગનો સમય:
રોપણી અથવા વાવણી પછી તરત જ ખેતરમાં જમીનમાં પ્રયોગ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો:
બીજ ઉપચાર ડ્રમ તથા પર્ણીય છંટકાવ માટેના સ્પ્રેયરો જેમ કે નેપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક બેટરી સ્પ્રેયર અને ASPEE HT પાવર સ્પ્રેયર.

પ્રાથમિક સારવાર / ઝેરના લક્ષણો:
સંપર્કમાં આવે તો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણીથી ધોઈ નાખો. લક્ષણો ચાલુ રહે તો તરત જ ડૉક્ટરની સલાહ લો. ત્વચા અને આંખોમાં ચીડિયાપણું તથા ઉબકા આવી શકે છે.

પ્રતિવિષ:
લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

સંગ્રહ:
ટ્રાઇકોફિક્સ ને ખાદ્ય પદાર્થો તથા અન્ય સામગ્રીના સંગ્રહસ્થાનથી દૂર અલગ રૂમ અથવા સ્થળે રાખવું. ઉત્પાદનની માત્રા અને સ્વરૂપ અનુસાર તાળાબંધ કબાટમાં સંગ્રહિત કરવું.

નિકાલ:

1. પેકેટોને તોડી વસતી વિસ્તારથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા.
2. વપરાયેલ પેકેટો પુનઃઉપયોગ ટાળવા માટે બહાર ન છોડવા.
3. વધારાની સામગ્રી તથા મશીન અને કન્ટેનર ધોવાણનું પાણી સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવું જેથી પર્યાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય.

સાવચેતીઓ:

1. દ્રાવણ બનાવતી વખતે શ્વાસ દ્વારા અંદર ન જાય અને ત્વચા સંપર્ક ટાળો.
2. પ્રયોગ દરમિયાન ખાવું, પીવું, તમાકુ ચાવવું અથવા ધૂમ્રપાન ન કરવું.
3. દ્રાવણ બનાવતી વખતે ગોગલ્સ, હાથમોજાં અને માસ્કનો ઉપયોગ કરવો.
4. નંગા હાથથી મિશ્રણ ન કરવું.
5. ઉપયોગ પછી ખાલી કન્ટેનરોનો નાશ કરવો.

(Trichoderma Viride 1.15% WP)

Bio Fungicide

2x10^6 Cfu's/**g min)**

Introduction

Trichoderma viride is an Eco-friendly Bio fungicide containing spores of fungus TRICHODERMA VIRIDE.

Crop	Name of Disease	Dosages/kg seed/hectare		Waiting Period
		Formulation	Method of application	
Groundnut	Seedling wilt	4.0gm/Kg seeds 2.5 kg/ha	**Seed Treatment** Mix required quantity of the seeds with the required quantity of t.viride WP and ensure uniform coating, shade dry and sow **Soil Application** Mix 2.5 Kgs T.Viride WP with 100 kgs of properly decomposed farmyard manure and spread uniformly over a hectare of land	*Nil*
Wheat	Loose Smut	4.0gm/Kg seeds	**Seed Treatment** As mentioned above	Nil
Chilli	Root Wilt	5.0gm/Kg seeds 5.0gm/ lit. water 3.0 kg/ha	**Seed Treatment** As mentioned above **Seedling dip** Dip roots of the seedlings for 20 minutes at the time of transplanting. **Soil Application** Mix 3.0 kg t.viride with100 kg of properly decomposed farmyard manure and spread uniformly over a hectare of land at the time of crop transplanting and at the time of flowering	Nil

Time of Application :
It can be applied as a soil application in the field immediately after transplanting or sowing.

Application Equipment Used
Seed treatment drums and foliar sprayers like Knapsack sprayers, compression knapsack sprayers. Compression knapsack battery sprayers ASPEE HTP power sprayer.

First Aid / Symptoms of poisoning
In case of contact flush with plenty of water. If the symptoms persists contact physician and get medical attention immediately. Skin & eye irritation and may cause nausea.

Antidote
Treat symptomatically

Storage
TRICHOFIX shall be stored in separate rooms or premises away from rooms or premises for storing articles, particularly articles of food. It should be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the product.

Disposal
1. Packages shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent the reuse.
3. Packages or surplus material and washings from the machines and the containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Precautions
1. Avoid inhalation and skin contact while diluting.
2. Do not eat, drink, chew or smoke during application.
3. Use goggles, gloves, air mask while mixing and preparation of spray solution.
4. Do not mix with bare hands.
5. Destroy empty containers after use.