डायुरॉन 80% डब्लू.पी.
(तणनाशक)

डायुरॉन 80% डब्लू.पी. हे व्यापक प्रभावी तणनाशक असून त्यामध्ये सक्रिय घटक स्वरुपात 80% भार/भार डायुरॉन आणि बाकी सहगामी औषधे आहेत.

इशाराः जलचरांसाठी विषारी असल्यामुळे जलाशयांजवळ आणि मत्स्यपालन होत असलेल्या ठिकाणी वापरू नये.

शिफारसः

पीक	तणांचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)
		स.तत्व (कि.ग्रॅ.)	संरचना (कि.ग्रॅ.)		
केळी (अस्तित्वात असलेले तण हाताने किंवा मशीनने काढून ते उगवण्यापूर्वी वापरावे)	अमरँथस स्पे., डिजीटेरिया स्पे., डक्टीलोक्टेनम ईजीप्टीकम, क्लोरीस बार्बेटा, इराग्रोस्टीस झेलेनिका, कॉमेलिना बेंगालेन्सिस, सायप्रस इरिया	1.60	2.00	625	–
लिंबू (अस्तित्वात असलेले तण काढून ते उगवण्यापूर्वी वापरावे)	डायजेरा आर्वेन्सिस, सायप्रस इरिया, कुकुमीस ट्रायगोनस, ट्रायबुलस टेरेस्ट्रीस, कॉमेलिना न्युडीफ्लोरा	2.00–4.00	2.50–5.00	600	–
कापूस (कापसाच्या बिया पेरल्यानंतर एक किंवा दोन दिवसांनी उगवण्यापूर्वी वापरावे)	चेनोपोडीयम अल्बम, पोर्तुलाका ओलेराशिआ, कॉन्वोलवुलस आर्वेन्सिस, डिजीटेरिया स्पे., पोर्तुलाका ओलेराशिआ, सेटारिया ग्लौका, अमरँथस स्पे., अमेगेलिस आर्वेन्सिस, झांथियम स्ट्रुमेरियम, ऍस्फोडेलस ट्युन्युईफेलियस, विशिया सटायवा	0.75–1.50	1.00 2.00	625	–
द्राक्षे (उगवण्यापूर्वी)	सायप्रस इरिया, अल्टरनेन्थेरा इचिनेटा, युफोर्बिया हिर्टा, इल्युजीन ईजीप्टिया, अर्गेमोन मेक्सिकाना, अमरँथस स्पे., आयपोमिया स्पे., झांथियम स्ट्रुमेरियम, फ्युमेरिया पार्वीफ्लोरा, ऍस्फोडेलस ट्युन्युईफेलियस, मेडीकागो डेंटीक्युलाटा, चेनोपोडीयम अल्बम क्लिओम विस्कोसा	1.60	2.00	625	–
मका (उगवण्यापूर्वी)	इल्युजीन ईजीप्टिया, इचिनोक्लोआ स्पे., युफोर्बिया हिर्टा, फायलँथस न्युरुरी, अमरँथस स्पे., डिजीटेरिया स्पे., चेनोपोडीयम अल्बम, सायप्रस इरिया	0.80	1.00	600	–
रबर (उगवण्यापूर्वी ब्लँकेट पद्धतीने वापरावे)	गवत आणि इतर	1.60–3.20	2.00–4.00	625	–
ऊस	सायप्रस इरिया, पोर्तुलाका रेशिया, इचिनोक्लोआ क्रसगल्ली, सायनोटीस स्पे., अमरँथस स्पे., कॉन्वोनवुलस स्पे., डिजीटेरिया स्पे.	1.60–3.20	2.00–4.00	600	–

वापरण्यासाठी निर्देशः नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर, फ्लॅट फॅन आणि फ्लड जेट नोजल बसवलेले कम्प्रेशन नेपसेक बॅटरी स्प्रेयर.

प्रयोगाची वेळः कापूसः उगवण–पूर्व वापर कापूस बियाणे बुडवल्यानंतर एक किंवा दोन दिवसांनी. केळः वर्तमान तण हाताने किंवा यंत्राने काढून टाकल्यानंतर उगवण–पूर्व वापर करावा. लिंबूः वर्तमान तण काढून टाकल्यानंतर उगवण–पूर्व वापर करावा. द्राक्षेः उगवण–पूर्व. मकाः उगवण–पूर्व. रबरः उगवण–पूर्व सरसकट वापर. ऊसः उगवण–पूर्व.

वापराणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजीः 1. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर ठेवणे. 2. श्वासो–श्वास वाटे घेऊ नये त्वचेवर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये. 3. नेहमी हवेच्या दिशेने ही फवारणी करा. हवेच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करु नये. कारण फवाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये. 4. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा. 5. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणें धूम्रपान करण तथा पान चघळणे इत्यादी करू नये. 6. फवारणी करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे घालावे.

विषबाधेची लक्षणेः डोकेदुखी, मळमळ, उलटी, गरगरणे, अस्वस्थता, चिंता, आचके उद्भवू शकतात.

प्रथमोपचारः 1. गिळलं असल्यास, मानेवर थोपटून उल्टी करवा. उलटीतून स्वच्छ पाणी पडेपर्यंत असं पुन्हा पुन्हा करत रहा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उल्टी करवू नका. 2. कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर पाणी आणि साबणाने स्वच्छ धुवा. 3. डोळे दूषित झाल्यास भरपूर सलाईन/स्वच्छ पाण्याने सुमारे 10–15 मिनिटे धुवा. 4. श्वासावाटे आत गेल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या.

वनस्पतीविषाक्तताः सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घ्यावा.

उताराः कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

डब्यांची विल्हेवाटः 1. तणनाशकांचे रिकामे डबे आणि उरलेलं तणनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे धुणं ही तणनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जवाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. 2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. 3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत.

साठवणीसाठी निर्देशः 1. तणनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत. 2. तणनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचनाः

डायुरॉन टेक्निकल (95% भार/भार वर आधारित)	84.20% भार/भार
अल्किल अरिल सल्फोनेट	2.00% भार/भार
टेमोल पीझेड–1	2.00% भार/भार
चिनी माती	11.80% भार/भार
एकूणः	**100.00% भार/भार**

खबरदारीः या लेबल/पत्रकात दिलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर याचा वापर केला जाऊ नये.

ડાયુરોન 80% ડબલ્યુ.પી.
(નીંદામણનાશક)

ડાયુરોન 80% ડબલ્યુ.પી. એક વિશાળ ફેલાવો ધરાવતું નીંદામણનાશક છે. તેમાં ડાયુરોન 80% ભાર/ભાર નો સક્રિય તત્વ અને બાકીનાં તત્વો તરીકે સમાવેશ થાય છે.

ચેતવણી: આ ઉત્પાદન જળચર જીવો માટે ઝેર સમાન છે. તેથી જળાશયો અને જળચર જીવ સૃષ્ટિની આસપાસ છંટકાવ ન કરવો જોઈએ.

ભલામણ:

પાક	નીંદામણનાં સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીની માત્રા (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસો)
		સ.તત્વ (કિ.ગ્રા.)	સંરચના (કિ.ગ્રા.)		
કેળાં (નિંદામણ હાથથી અથવા મશીનથી દૂર કર્યા પછી નવું નિંદામણ ઊગતાં પહેલાં છંટકાવ)	એમેરાન્થસ એસ્પી., ડિજીટેરિયા એસ્પી., ડેક્ટિલોક્ટેનિયમ ઈજિપ્શિયમ, ક્લોરિસ બાર્બેટા, ઈરાગ્રોસ્ટિસ ઝિલેનિકા, કોમોલિના બેન્ઘાલેન્સિસ, સાઈપરસ ઈરિયા, ઠરાગોસીમ બાર્બેટા	1.60	2.00	625	-
લીંબુ (નિંદામણ દૂર કર્યા પછી નવું નિંદામણ ઊગતાં પહેલાં છંટકાવ)	ડિગેરા આર્વેન્સિસ, સાઈપરસ ઈરિયા, ક્યુક્યુમિસ ટ્રિગોનસ, ટ્રિબ્યુલસ ટેરેસ્ટ્રિસ, કોમેલિના નુડિફોરા	2.00-4.00	2.50-5.00	600	-
કપાસ (કપાસનાં બીજ રોપ્યાં 1 અથવા 2 દિવસ પછી નવું નિંદામણ ઊગતાં પહેલાં છંટકાવ)	ચેનોપોડિયમ એલ્બમ, યુફોર્બિયા એસ્પી., પોર્ચ્યુલાકા ઓલેરાશિયા, કોન્વોલ્વુલસ આર્વેન્સિસ, ડિજીટેરિયા એસ્પી., સેટારિયા ગ્લાઉકા, એમેરાન્થસ એસ્પી., એમાગાલિસ આર્વેન્સિસ, ઝેન્થિયમ સ્ટ્રમેરિયમ, એસ્ફોડેલસ ટ્યુનિફેલિયસ, વિસિયા સેટાઈવા	0.75-1.50	1.00 2.00	625	-
દ્રાક્ષ (નિંદામણ ઊગતાં પહેલાં છંટકાવ)	સાઈપરસ ઈરિયા, અલ્ટરનેન્થ્રા ઈકિનાટા, યુફોર્બિયા હિર્તા, ઈલ્યુઝિન ઈજિપ્શિયા, અર્ગમોની મેક્સિકાના, એમેરાન્થસ એસ્પી., આઈપોમિયા એસ્પી., ઝેન્થિયમ સ્ટ્રમેરિયમ, ફ્યુમારિયા પાર્વિફ્લોરા, એસ્ફોડેલસ ટ્યુનિફેલસ, મેડિકાગો ડેન્ટિક્યુલાટા, ચેનોપોડિયમ એલ્બમ ક્લિઓમ વિસ્કોસા	1.60	2.00	625	-
મકાઈ (નિંદામણ ઊગતાં પહેલાં છંટકાવ)	ઈલ્યુઝિન ઈજિપ્શિયા, ઈકિનોક્લોઆ એસ્પી., યુફોર્બિયા હિર્તા, ફિલાન્થસ નુરુરી, એમેરાન્થસ એસ્પી., ચેનોપોડિયમ એલ્બમ, ડિજીટેરિયા એસ્પી., સાઈપરસ ઈરિયા	0.80	1.00	600	-
રબર (નિંદામણ ઊગતાં પહેલાં બ્લેન્કેટની રીતે છંટકાવ)	ઘાસ અને બિન-ઘાસ	1.60-3.20	2.00 4.00	625	-
શેરડી	સાઈપરસ ઈરિયા, પોર્ચ્યુલાકા ઓલેરાશિયા, ઈકિનોક્લોઆ ક્રુસગાલી, સાઈનોટિસ એસ્પી., એમેરાન્થસ એસ્પી., કોનોવુલ્વસ એસ્પી., ડિજીટેરિયા એસ્પી.	1.60-3.20	2.00 4.00	600	-

ઉપયોગની દિશાનિર્દેશ: ફ્લેટ ફેન અથવા ફ્લડ જેટ નોઝલ લગાડેલ હોય એવા નેપ્સેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપ્સેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપ્સેક બેટરી સ્પ્રેયર.

ઉપયોગનો સમય: કપાસનું બિયારણ રોપ્યા પછી 1- 2 દિવસમાં નીંદામણ ઉગતાં પૂર્વે. કેળાં: હાથથી અથવા મશીનથી નીંદામણ દૂર કર્યા પછી ફરી ઉગતાં પૂર્વે. મોસંબી: જૂનું નીંદામણ દૂર કર્યા પછી ફરી ઉગતાં પૂર્વે. દ્રાક્ષ: નીંદામણ ઉગતાં પૂર્વે. મકાઈ: નીંદામણ ઉગતાં પૂર્વે રબર: નીંદામણ ઉગતાં પૂર્વે બ્લેન્કેટ એપ્લીકેશન તરીકે. શેરડી: નીંદામણ ઉગતાં પૂર્વે.

વાપનાર માટે સાવચેતી: 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. 6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

ઝેરનાં લક્ષણો: માથામાં દુ:ખાવો, ઉબકા, ઉલ્ટી, ચક્કર આવવા, ગભરાટ, ચિંતા, મૂર્છા આવવી વગેરે

પ્રાથમિક ઉપચાર: 1. જો ગળી જાય તો ગળાના પાછલા ભાગમાં ગલગલિયા કરીની ઉલટી કરો. ઉલ્ટી દ્વારા સાફ ના થાય ત્યાં સુધી તેને પુનરાવર્તન કરો. જો દર્દી બેભાન હોય તો ઉલટી ન કરાવો. 2. જો કપડાં અને ચામડી દૂષિત હોય તો કપડાં દૂર કરો અને દૂષિત ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી ધુઓ. 3. જો આંખો દૂષિત થાય છે, તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ માટે ખારા/સ્વચ્છ પાણીથી પુષ્કળ ફ્લશ કરો. 4. જો શ્વાસ લેવામાં આવે, તો દર્દીને તાજી હવામાં રાખો.

વિષપાદપતા: CIB દિશાસૂચનો તપાસો.

ઝેરનું મારણ: ઝેરનું કોઈ ખાસ મારણ નથી. આથી લક્ષણો મુજબ સારવાર કરવી.

ખાલી ડબ્બાનો નિકાલ: 1. આ નીંદામણનાશકના નિર્માતા અને વપરાશકારની એ ફરજ છે કે ખાલી ડબ્બાઓ/વધેલ નીંદામણનાશકના છંટકાવનાં સાધનોના ધોવાણવાળા પાણીનો સુરક્ષિત નિકાલ કરે કે જેથી વાતાવરણ અને પાણી પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેટોનો ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બહાર ન ફેંકશો. 3. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાને તોડીને રહેવાની જગ્યાથી દૂર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દો.

સંગ્રહ માટે સૂચના: 1. આ નીંદામણનાશકના ખાલી ડબ્બાઓ/પેકેટોને અલગ રૂમમાં અથવા જેમાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હોય તેનાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળાં-ચાવીમાં રાખો. આ નીંદામણનાશકને પ્રમાણ અને જરૂરિયાત મુજબ રાખો. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ નીંદામણનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી નીંદામણનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

રાસાયણિક બનાવટ:

ડાઈયુરોન ટેકનિકલ (95% ભાર/ભાર પર આધારિત)	84.20% ભાર/ભાર
આલ્કાઈલ એરાઈલ સલ્ફોનેટ	2.00% ભાર/ભાર
ટેમોલ પી.ઝેડ.-1	2.00% ભાર/ભાર
ચાઈના ક્લે	11.80% ભાર/ભાર
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: આ લેબલ/લીફલેટ પર દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલો પર વાપરવું નહીં.

ਡਾਇਯੂਰੱਨ 80% ਡਬਲਿਯੂ.ਪੀ.
(ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਡਾਇਯੂਰੱਨ 80% ਡਬਲਿਯੂਪੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਯੂਰੱਨ 80% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਫਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀ.)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ.ਆਈ. (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਫਾਰਮੁ–ਲੇਸ਼ਨ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)		
ਕੇਲਾ (ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)	ਅਮਾਰਾਨਥਸ ਐਸਪੀਪੀ, ਡਿਜੀਟਾਰੀਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਡੈਕਟਾਇਲੋਕਟੇਨਮ ਆਇਜਿਪਟਸ਼ਿਅਮ, ਕਲੋਰਿਸ ਬਾਰਬਾਟਾ, ਏਰਾਗ੍ਰੋਸਟਿਸ ਜ਼ੇਲੈਨਿਕਾ, ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਬੈਂਘਾਲੇਨਸਿਸ, ਸਾਇਪ੍ਰਸ ਆਈਰੀਆ	1.60	2.00	625	-
ਸਿਟਰਸ (ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)	ਡਿਜੇਰਾ ਅਰਵੇਨਸਿਸ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਈਰੀਆ, ਕੁਕੁਮਿਸ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਸ, ਟ੍ਰਾਈਬੁਲਸ ਟੈਰੇਸਟ੍ਰਿਸ, ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਨਿਯੁਡੀਫਲੋਰਾ	2.00–4.00	2.50–5.00	600	-
ਕਪਾਹ (ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ)	ਚੇਨੋਪੋਡਿਅਮ ਅਲਬਮ, ਯੂਫੋਬੀਆਐਸਪੀ, ਪੋਰਟੁਲਾਕਾ ਓਲਰੇਰਸ਼ੀਆ, ਕੋਨਵੋਵੁਲਸ ਅਰਵੇਨਸਿਸ, ਡਿਜੀਟਾਰੀਆ ਬਾਇਫੈਸੀਕੁਲਾਟਾ, ਪੋਰਟੁਲਾਕਾ ਓਲਰੇਰਸ਼ੀਆ, ਸੇਟਾਰੀਆ ਗਲਾਉਕਾ, ਅਮਾਰਾਨਥਸ ਐਸਪੀਪੀ, ਅਨਾਗਾਲਿਸ ਅਰਵੇਨਸਿਸ, ਜ਼ੈਨਥਿਅਮ ਸਟ੍ਰੋਮਾਰਿਅਮ, ਐਸਫੋਡੇਲਸ ਟਿਯੂਨਿਫਾਲਿਅਸ, ਵਿਸ਼ਿਆ ਸਾਤਿਵਾ	0.75-1.50	1.00-2.00	625	-
ਅੰਗੂਰ (ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)	ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਈਰੀਆ, ਅਲਟਰਨਥੇਰਾ ਏਕੀਨਾਟਾ, ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਹਿਰਤਾ, ਐਲਿਯੂਸਾਈਨ ਆਇਜਿਪਟੀਆ, ਆਰਗੇਮੋਨ ਮੈਕਸੀਸਾਨਾ, ਅਮਾਰਾਨਥਸ ਐਸਪੀਪੀ, ਲਿਪੋਮੀਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਜ਼ੈਨਥਿਅਮ ਸਟ੍ਰੋਮਾਰਿਅਮ, ਫੁਮਾਰੀਆ ਪਾਰਵੀਫਲੋਰਾ, ਐਸਫੋਡੇਲਸ ਟਿਯੂਨਿਫਾਲਿਅਸ, ਮੈਡੀਕਾਗੋ ਡੈਂਟੀਕੁਲਾਟਾ, ਚੇਨੋਪੋਡਿਅਮ ਅਲਬਮ, ਕਲੇਓਮੇ ਵਿਸਕੋਸਾ	1.60	2.00	625	-
ਮੱਕੀ (ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)	ਐਲਿਯੂਸਾਈਨ ਆਇਜਿਪਟੀਆ, ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਹਿਰਤਾ, ਫਾਇਲਾਂਟਸ ਨੁਰੂਰੀ, ਅਮਾਰਾਨਥਸ ਐਸਪੀਪੀ, ਡਿਜੀਟਾਰੀਆ ਐਸਪੀਪੀ, ਚੇਨੋਪੋਡਿਅਮ ਅਲਬਮ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਈਰੀਆ	0.80	1.00	600	-
ਰਬੜ (ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸਤੇਮਾਲ)	ਘਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ ਘਾਹ	1.60–3.20	2.00 4.00	625	-
ਗੰਨਾ	ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਈਰੀਆ, ਪੋਰਟੁਲਾਕਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਏਕੀਨੋਕਲੋਆ ਰਸਗਾਲੀ, ਸਾਇਨੋਟਿਸ ਐਸਪੀਪੀ, ਅਮਾਰਾਂਥਸ ਐਸਪੀਪੀ, ਕੋਨਵੋਨਵੁਲਸ ਐਸਪੀਪੀ, ਡਿਜੀਟਾਰੀਆ ਐਸਪੀਪੀ	1.60–3.20	2.00–4.00	600	-

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਯੇਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਯੇਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਕਪਾਹ: ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਕੇਲਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸਿਟ੍ਰਸ: ਮੌਜੂਦਾ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਅੰਗੂਰ: ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੱਕੀ: ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਬੜ: ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਗੰਨਾ: ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਫ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 4. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਧੋਵੋ। 5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। 6. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰਖਿਅੰਤ ਕਪੜੇ ਪਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਸਿਰ ਚੱਕਰਾਉਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਚਿੰਤਾ, ਕੜਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ: 1. ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਾਓ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਾਫ਼ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। 2. ਜੇਕਰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਤ੍ਵਚਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤ੍ਵਚਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 3. ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਈਨ/ਸਾਫ਼ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10–15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਧੋਵੋ। 4. ਜੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਫਾਇਟੋਟਾਇਕਸੀਸਿਟੀ: ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ: ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ। 2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3. ਪੈਕੇਟਾ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ।

ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। 2. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਡਾਇਯੂਰੱਨ ਟੈਕਨੀਕਲ (95% ਭਾ/ਭਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ)	84.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਅਲਕਾਇਲ ਅਰਾਇਲ ਸਲਫੋਨੇਟ	2.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਤਾਮੋਲ ਪੀਜ਼ੈਡ-1	2.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਚਾਇਨਾ ਕਲੇ	11.80% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਜੋੜ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

डायुरान ८० प्रतिशत डब्ल्यू.पी.
(खरपतवारनाशक)

यह एक तेज असरकारक खरपतनाशक है जिसमें वजन के अनुसार 80 प्रतिशत डायुरान सक्रिय तत्व तथा अन्य सहयोगी है।

*सावधानः जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

उपयोग :

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्र (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन में)
		सक्रिय तत्व (कि.ग्रा.)	संरचना (कि.ग्रा.)		
केला (हाथों से निकाल कर खरपतवार उगने से पहले)	जंगली चौलाई, मकरा, क्लोरिस, चिड़िया का दाना, पीला मोथा, कनकउआ, क्रेवघास	1.60	2.00	625	—
नींबू (उगने से पहले)	लहसुआ, पीला मोथा, बड़ा गोखरू, कनकउआ, कुकुमिस	2.00-4.00	2.50-5.00	600	—
कपास (उगने से पहले बीज को 1 से 2 दिन भिगोकर)	बथुआ, कुल्फा, हिरनखुरी, बंदरा–बंदरी, जंगली चौलाई, कृष्णनील, बड़ा गोखरू, प्याजी	0.75-1.50	1.00-2.00	625	—
अंगूर (उगने से पहले)	पीला मोथा, कोदों, मकरी, प्याजी, वासिया, बड़ा गोखरू, आइयोमिया, जंगली चौलाई, सत्यावाली, बड़ी दूधी, आल्हा नेन्या, हुलहुल, कुल्फा	1.60	2.00	625	—
मक्का (उगने से पहले)	कोदो, बड़ी दूधी, जंगली चौलाई, हजारदास, क्रेवघास, बथुआ, समाधान, पीला मोथा	0.80	1.00	600	—
रबड़ (उगने से पहले)	घास तथा अन्य खरपतवार	1.60-3.20	2.00-4.00	625	—
गन्ना	पीला मोथा, बंदरा–बंदरी, बथुआ, जंगली चौलाई, क्रेवघास	1.60-3.20	2.00-4.00	600	—

उपयोग के लिए निर्देश : नैपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक कम्प्रेशन नैपसेक बैटरी फ्लैट फैन तथा फ्लड जेट नोजल के साथ।

प्रयोग का समय : कपास : उगने से पहले बीज को 1 से 2 दिन भिगोकर। केला : हाथों से खरपतवार निकाल कर खरपतवार उगने से पहले। नीम्बू : उगने से पहले। अंगूर : उगने से पहले। मक्का : उगने से पहले। रबड़ : उगने से पहले। गन्ना : उगने से पहले।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रमान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़ें पहनें।

विष के लक्षण : सरदर्द, मिचली, उल्टी, चक्कर आना, सुस्ती, घबराहट, झटके (मिरगी) हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपड़ें और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में लें जायें।

पौधविशाक्तताः सीआईबी दिशा–निर्देश देखें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : निर्माताओं, उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ दें। प्रयोग किये हुए डिब्बों को दोबारा प्रयोग के लिए बाहर न छोड़ें। डिब्बों या बची सामग्री या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि आसपास की चीजें, पानी प्रदूषित न हों।

संग्रहण की शर्तें : 1. खरपतवारनाशक के पैकेटों को अलग कमरों अथवा जगहों में खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों अथवा जगहों से अलग–अलग अलमारियों में ताला चाबी के अन्दर रखना चाहिए। 2. जिस कमरें अथवा जगह में खरपतवार का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना, सूखा, हवादार तथा प्रकाश युक्त व काफी लम्बा–चौड़ा होना चाहिए जिससे खरपतवार नाशक की भाप से वातावरण दूषित न होने पाये।

रासायनिक संरचनाः

डायुरान टेक्निकल (भारानुसार 95 पर आधारित)	84.20% भा/भा
एल्काइल एराइल सल्फोनेट	2.00% भा/भा
टैमोल पी.जेड.–1	2.00% भा/भा
चाइना क्ले	11.80% भा/भा
योग :	**100.00% भा/भा**

चेतावनी : लेबल/लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है।

Diuron 80% WP
(Herbicide)

Diuron 80% WP is a broad spectrum herbicide containing. Diuron 80% W/W as active ingredients and balance adjuvants.

*Caution: Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage/Ha		Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in Days)
		AI (kg)	Formulation (kg)		
Banana *(Pre-emergence application after eliminating the existing weed manually or mechanically.)*	Amaranthus spp., Dactyloctenium aegyptium, Chloris barbata, Eragrostis zeylanica, Cyperus iria, Commelina benghalensis, Digitaria spp. Eragrostis barbata	1.60	2.00	625	—
Citrus *(Pre-emergence application after eliminating the existing weed.)*	Digera arvensis, Cyperus iria, Tribulus terrestris, Commelina nudiflora, Cucumis trigonus,	2.00-4.00	2.50-5.00	600	—
Cotton *(Pre-emergence application a day or two days after dipping cotton seeds.)*	Chenopodium album, Euphorbia sp., Portulaca oleracea, Convolvulus arvensis, Digitaria sp., Setaria glauca, Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Xanthium strumarium, Vicia sativa, Asphodelus tenuifolius	0.75-1.50	1.00-2.00	625	—
Grapes *(Pre-emergence)*	Cyper iria, Eleusine aegyptiaca, Medicago denticulata, Asphodelus tenuifolius, Fumaria parviflora, Xanthium strumarium, Ipomea spp., Amaranthus spp., Argemone mexicana, Euphorbia hirta, Alternanthera echinata, Cleome viscosa, Chenopodium album	1.60	2.00	625	—
Maize *(Pre-emergence)*	Eleusine aegyptiaca, Euphorbia hirta, Amaranthus spp., Phyllanthus niruri, Digitaria spp., Chenopodium album, Echinochloa spp., Cyperus iria	0.80	1.00	600	—
Rubber *(Pre-emergence blanket application)*	Grasses & non-grasses Digitaria	1.60-3.20	2.00-4.00	625	—
Sugarcane	Cyperus iria, Portulaca oleracea, Echinochloa crusgalli, Cynotis spp., Amaranthus spp., Convolvulus spp., Digitaria spp.	1.60-3.20	2.00-4.00	600	—

Direction of Use : Knapsack, compression knapsack sprayer. Compression knapsack battery sprayer with flat fan or flood jet nozzle.

Time of Application: Cotton : Pre-emergence application a day or two days after dipping cotton seed. Banana : Pre-emergence application after eliminating the existing weed manually or mechanically. Citrus : Pre-emergence application after eliminating the existing weeds. Grapes : Pre-emergence. Maize : Pre-emergence. Rubber : Pre-emergence blanket application. Sugarcane : Pre-emergence.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Headache, Nausea, Vomiting, Giddiness, Nervousness, Anxiety, Convulsions may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: Refer CIB guidelines.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: It shall be the duty of manufactures, formulators of product and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine the container shall be disposed off in safe manner. So as to prevent environmental and water pollution. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Condition: 1. The package containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key, depending upon the nature and quantities of herbicides. 2. The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid to contamination with vapour.

Chemical Composition:

Diuron Technical (based on 95% w/w)	84.20% w/w
Alkyl Aryl Sulfonate	2.00% w/w
Tamol PZ-1	2.00% w/w
China Clay	11.80% w/w
Total:	**100.00% w/w**

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

AgroStar®

DORON
Diuron 80% WP
(Herbicide)

डोरोन
डायुरान ८० प्रतिशत डब्ल्यू.पी.
(खरपतवारनाशक)

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

INSTRUCTIONS
Read the leaflet before use.

सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by :
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED.
Office Nos. 001 and 002, Ground Floor
Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground
Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon
Sheri, Pune - 411014, Maharashtra.

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No. 73/B, Survey No. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.



Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
✉ **info@agrostar.in** ☎ **9503095030**
or **customer service team** at the above address

డైయూరాన్ 80 శాతం డబ్ల్యూ.పీ.
(కలుపునాశిని)

డైయూరాన్ 80 శాతం డబ్ల్యూపీ బహుళ ఉపయోగాల కలుపునాశిని. దీనిలో డైయూరాన్ 80 శాతం భా/భా సక్రియ పదార్థాలు మరియు తక్కినవి అనుబంధ ఔషధాలు గలవు.

హెచ్చరికలు: చేపలకు, జలచరాలకు విషపూరితమైనది. కాబట్టి జలాశయాలు, చేపలు పెంచే చోట ఉపయోగించరాదు.

సిఫారసు:

டையூரான் 80% டபிள்யூ.பி.
(களைக்கொல்லி மருந்து)

டையூரான் 80% டபிள்யூபி ஓர் விரிவான ஆற்றல் கொண்ட களைக்கொல்லியாகும். இதில் டையூரான் 80% எ/எ செயல்படும் உட்பொருளாகவும், மீதம் துணை மருந்து பொருட்களாகும்.

எச்சரிக்கை: மீன்களுக்கு நச்சூட்டக்கூடியது, எனவே, நீர்நிலைகள், மீன்பண்ணை அருகே பயன்படுத்தக்கூடாது.

பரிந்துரை:

ಡಿಯುರೋನ್ 80% WP
(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಡ್ಯೆಯುರಾನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ. ಎನ್ನುವುದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೆಯುರಾನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಚರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ডাইউরন 80% ডবলু.পি.
(আগাছানাশক)

ডাইউরন 80% ডবলুপি একটি বহু ব্যবহারপোযোগী আগাছানাশক।

ডিউরন 80% ডবলু/ডবলু সক্রিয় উপাদান এবং ভারসাম্য সহায়ক।

সতর্কতা: জলজ জীব এর জন্য বিষাক্ত তাই জলাশয়, মাছ চাষ হয়েছে এমন জলাশয় বা পিসিকালচার হয়েছে এমন এলাকার কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত নয়।

অনুমোদন:

ഡിയുറോൺ 80% WP
(ഹെർബിസൈഡ്)

ഡിയുറോൺ 80% WP എന്നത് ഡിയുറോൺ 80% W/W ആക്ടീവ് ചേരുവകളായും ബാലൻസ് അഡ്ജുവന്റായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം ഹെർബിസൈഡ് ആണ്. *ജാഗ്രത: ജലജീവികൾക്ക് വിഷബാധ ഏൽപ്പിക്കും, ജലാശയങ്ങൾ, അക്വാകൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം ഉപയോഗിക്കരുത്.

ശുപാർശ:

ڈیورون 80% ڈبلوپی
(عشبہ کش)

ڈیورون 80% ڈبلوپی ایک کثیرجہتی عشبہ کش ہے جس میں ڈیورون 80% ڈبلو/ڈبلوایک فعال مادہ ہےاور باقی معاون مادے ہیں –

احتیاط: یا مچھلیوں اور پانی کی مصنوعات کے لئے بھی زہریلا ہے اس لئے اسے مچھلی پالن اور پانی کی جگہوں پر استعمال نہ کریں۔

سفارش: