AgroStar®

STROBIC COMPLETE

Dimethomorph 12% + Pyraclostrobin 6.7% WG
Fungicide

स्ट्रोबिक कम्प्लीट
डाइमेथोमॉर्फ 12% + पाइराक्लोस्ट्रोबिन 6.7% डब्ल्यू जी
फफूंदीनाशक

For Agricultural Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

INSTRUCTIONS
READ LEAFLET BEFORE USE.

सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

MARKETED BY:ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Regd. Office Nos 001 and 002, Ground Floor, Wing A,And Nos 003 and 004, Ground Floor Wing B,Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune, Maharashtra- 411014

यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर 001 और 002, ग्राउंडफ्लोर, विंग, A और नंबर 003 और 004, ग्राउंडफ्लोर विंग B, न्याति टेकपार्क, वडगांव शेरी, पुणे, महाराष्ट्र– 411014, भारत।

Manufactured by: Parijat Industries (India) Limited
Registered Office: M-77, Ist & IInd Floor, M-Block Market, Greater Kailash II, New Delhi - 110048 (India).
Factory: Unit 2 (B): Village Khera Gani, Near Village - Fatehgarh, Raipur Rani Road, Distt -Ambala, Haryana-134201, India.
Unit 3 (C): 1043, 1042, 1040, 1011, 1009 & 1008, GIDC, Waghodia – 391760, Vadodara, Gujarat.

निर्माता: पारिजात इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड,
पंजीकृत संस्थान: एम–77, पहला और दूसरा तल, एम ब्लॉक मार्किट ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048 (इंडिया).
फैक्ट्री: यूनिट 2 (बी): ग्राम खेरा गनी, नियर ग्राम फतेहगढ, रायपुर रानी रोड, जिला – अम्बाला, हरियाणा 134201, इंडिया।
यूनिट 3 (सी): 1043, 1042, 1040, 1011, 1009 और 1008, जीआईडीसी, वाघोडिया – 391760, वडोदरा, गुजरात।

Destroy container after use as directed on leaflet
पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात डिब्बों को नष्ट करें।
वापरल्यानंतर रिकामे डबे, निर्देशपत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे.
ઉત્પાદનનો છંટકાવ કરી લીધા પછી કન્ટેનરનો નાશ લિફ્લેટમાં સૂચવેલ નિર્દેશો મુજબ કરો.
ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।
লিফলেটে নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহারের পর পাত্রটি ধ্বংস করে দিন।
ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଖାଲି ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁସ୍ତିକାରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
பயன்படுத்திய பிறகு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டபடி பெட்டியை சிதைத்து விடவும்.
కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా ఉపయోగించిన తరువాత కంటైనర్ని నాశనం చేయాలి.
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾಶಪಡಿಸಿ.
ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കണം.
ہدایت کی پرچی پر دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کے بعد دوا کے خالی ڈبوں کو تلف کردیں

Warranty: Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product.



Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan
Scan to download the AgroStar app
For **customer feedback** contact us: **info@agrostar.in** **9503095030** or **customer service team** at the above address

FRONT

Dimethomorph 12% + Pyraclostrobin 6.7% WG (Fungicide)

It is used for control of downy Mildew disease in Grape and Cucumber; Late Blight in Potato Crop and Early Blight in Tomato.

Crop and Insect/Pest Name (Recommendation):

Crop(s)	Common name of Pests	Dosage / Ha		Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (gram)	Formulation (ml)		
Cucumber	Downey Mildew	28.5	1500	500	10
Grapes	Downey Mildew	220.5	1500	750-1000	34
Potato	Late Blight	183.75	1250	500	26
Tomato	Early Blight	183.75 gm	1250g	500	10

Direction Of Use: Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies or pisciculture area. Apply as soon as disease incidence appears using recommended dosage and spray volume.
Manner of Application: Apply the product as a foliar spray on the crop.
Time of Application: Apply as soon as the first symptom of the disease is visible.
Precautions: Avoid inhalation and skin & eyes contact. Keep away from foodstuffs and animals feed in cool dry place away from the habitation. Keep the containers under lock key when are not used. Destroy empty containers after use. Do not eat, drink or smoke during application. Wash contaminated skin and clothes with soap and water after application.
Symptoms Of Poisoning: Mild to moderate toxicity typically consist of mild dermal and mucous membrane irritation. Burning of mucous membranes may occur within gestion as well as gastrointestinal upset. Respiratory tract pain, eye pain, pruritus, skin redness, weakness, headache and dizziness can occur following an inhalational exposure after an aerial application, dullness, salivation, nausea, vomiting, eye and skin irritation.
First Aid: If ingested: On ingestion, rinse mouth thoroughly with water. Never induce vomiting or give anything by mouth if the victim is unconscious, seek medical attention. **If inhaled**: Keep patient calm, remove to fresh air the seek medical attention. **In case of skin contact**: After contact with skin, remove contaminated clothes. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If irritation develops, seek medical attention. **In case of eye contact:** On contact with eye, immediately wash affected eye for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.
Phytotoxicity: Non phytotoxic when used as recommended.
Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.
Good Practices relating to pesticide application techniques:
Dosage/Area (Per Hectare): As mentioned on table.
Weather conditions (in general): Spray when the wind is steady and ideal. Avoid spraying in temperature above 30°C.
Soil & Water (Wherever applicable): Spray when there is sufficient moisture in soil.
Application Techniques: Foliar spray.
Application Timings: Apply as soon as the first symptom of the disease is visible
Crop Stage of application: Application shall be done at vegetative growth stage of the crop as soon as there is an incidence of disease appearance.
Equipment type: Knapsack sprayer or high-volume sprayer fitted with hollow cone nozzle.
Nozzle Type: Hollow cone nozzle.
Re-entry period: 48 hrs.
Pre-Harvest Interval (Days): As mentioned on table.
Frequency Including max Number of Sprays: 2-3 sprays at 15-20 days interval depending upon the disease severity.
Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Not to be applied during crop maturity and just before crop harvest.
Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honeybees and natural enemies of pests: As bees and other pollinators forage during the day, spray is recommended in early morning or late evening to reduce the risk of exposure.
Purpose: For Agricultural Use only.
Storage Conditions: 1. The packages containing the herbicide shall be stored in separate rooms and premises, away from the rooms and premises used for storing other articles particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicide. 2. The rooms and premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.
Disposal Of Used Container: 1. Empty packages or surplus materials or washing should be disposed off in a safe manner as to not cause environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Empty containers should not be re-used. These should be triple rinsed with water and rinsate should be poured to the spray mix. 4. The packages shall be broken and buried away from habitation.
DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS.
Chemical Composition: Silicon dioxide (Anti-caking) 6.7 % w/w, Sodium salt of alkyl-naphthlenesulfonic acid (Wetting agent) 2.4 % w/w, Polymethylsilioxane in aqueous emulsion (Defoamer) 0.8 % w/w, Sodium lignosulfonate (Co-Dispersant) Q.S. % w/w, Dimethomorph a.i. 12.0 % w/w, Pyraclostrobin a.i. 6.7 % w/w, Sodium salt of a condensation product of naphthalenesulfonic acid with formaldehyde (Dispersing agent) 25.0 % w/w, Kaolin (Carrier) 20.0 % w/w, **Total 100 % w/w.**
Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on Label & Leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. Avoid to mix with water bodies as product is toxic to fish and honeybees.

ENGLISH

डाइमेथोमॉर्फ 12% + पाइराक्लोस्ट्रोबिन 6.7% डब्ल्यू जी (फफूंदीनाशक)

इसका उपयोग अंगूर और खीरे में कोमल फफूंदी रोग; आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग और टमाटर में अर्ली ब्लाइट के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

फसलें और कीट समूह (सिफारिश):

फसल	कीट के सामान्य नाम	मात्रा/हे०		पानी की मात्रा (ली०)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
		स. त. (ग्रा.)	मिश्रण (मि ली)		
खीरा	डाऊनी मिल्डयु	28.5	1500	500	10
अंगूर	डाऊनी मिल्डयु	220.5	1500	750-1000	34
आलू	लेट ब्लाइट	183.75	1250	500	26
टमाटर	अर्ली ब्लाइट	183.75 ग्रा.	1250 ग्रा.	500	10

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: यह जलीय जीवों के लिए विषैला है, इसलिए इसका उपयोग जल निकायों या मछलीपालन क्षेत्र के पास नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही बीमारी के लक्षण दिखें, बताई गई डोज़ और स्प्रे वॉल्यूम के अनुसार लगाएं।
उपयोग का तरीका: उत्पाद को फसल पर पर्ण स्प्रे के रूप में उपयोग करें।
प्रयोग का समय:बीमारी का पहला लक्षण दिखते ही इसे लगाएं।
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: साँस लेने और त्वचा व आँखों के संपर्क से बचें। खाने-पीने की चीज़ों और जानवरों के चारे से दूर रखें और घर से दूर ठंडी और सूखी जगह पर रखें। इस्तेमाल न होने पर कंटेनरों को ताले में बंद रखें। इस्तेमाल के बाद खाली कंटेनरों को नष्ट कर दें। इस्तेमाल के दौरान कुछ न खाएँ, पिएँ या धूम्रपान न करें। इस्तेमाल के बाद दूषित त्वचा और कपड़ों को साबुन और पानी से धोएँ।
विष के लक्षण: हल्की से मध्यम विषाक्तता में आमतौर पर त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली में हल्की जलन शामिल होती है। गर्भावस्था के दौरान श्लेष्मा झिल्ली में जलन के साथ-साथ जठरांत्र संबंधी गड़बड़ी भी हो सकती है। हवा में लगाने के बाद साँस के संपर्क में आने से श्वसन तंत्र में दर्द, आँखों में दर्द, खुजली, त्वचा का लाल होना, कमज़ोरी, सिरदर्द और चक्कर आना, सुस्ती, लार आना, मतली, उल्टी, आँखों और त्वचा में जलन हो सकती है।
प्राथमिक चिकित्सा: यदि निगल लिया जाए: निगलने पर, पानी से मुँह अच्छी तरह धो लें। कभी भी उल्टी न करवाएँ या मुँह से कुछ न दें। यदि पीड़ित बेहोश है, तो चिकित्सीय सहायता लें। **यदि साँस के द्वारा अंदर चला जाए:** रोगी को शांत रखें, ताज़ी हवा में ले जाएँ और चिकित्सीय सहायता लें। **त्वचा के संपर्क में आने पर:** त्वचा के संपर्क में आने के बाद, दूषित कपड़े उतार दें। दूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ। यदि जलन हो, तो चिकित्सीय सहायता लें। **आँख के संपर्क में आने पर:** आँख के संपर्क में आने पर, प्रभावित आँख को तुरंत कम से कम 15 मिनट तक बहते पानी के नीचे पलकें खुली रखते हुए धोएँ, किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें।
विषनाशक: कोई विशिष्ट प्रतिविष ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।
पौधविशाक्तता : सुझायी गई मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर पौध विषाक्त नही।
कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास:
मात्रा/क्षेत्र (प्रति हेक्टेयर) : तालिका पर दिए अनुसार।
मौसम की स्थिति (सामान्य रूप से): जब हवा स्थिर और आदर्श हो तब स्प्रे करें। 30° से अधिक तापमान में छिड़काव से बचें।
मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो): जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तब छिड़काव करें।
छिड़काव तकनीक: पत्तियों पर स्प्रे करें।
छिड़काव समय: बीमारी का पहला लक्षण दिखते ही इसका छिड़काव करें।
छिड़काव के लिए फसल की अवस्था: रोग की उपस्थिति की घटना होते ही फसल की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था पर छिड़काव किया जाना चाहिए।
उपकरण प्रकार: हॉलो कोन नोजल लगा नैपसैक स्प्रेयर या हाई-वॉल्यूम स्प्रेयर।
नोज़ल : हॉलो कोन नोजल।
पुनः प्रविष्टि:48 घंटे।
अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन): तालिका पर दिए अनुसार।
आवृत्ति सहित अधिकतम संख्या में स्प्रे: बीमारी की गंभीरता के आधार पर 15-20 दिन के अंतराल पर 2-3 स्प्रे करें।
चरण जिनके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए: फसल परिपक्वता के दौरान और फसल कटाई से ठीक पहले नहीं लगाया जाना चाहिए।
मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: चूंकि मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता दिन के दौरान भोजन करते हैं, इसलिए जोखिम को कम करने के लिए सुबह जल्दी या देर शाम को स्प्रे करने की सलाह दी जाती है।
प्रयोजन : कृषि उपयोग के लिए।
संग्रहण की शर्तें: 1. शाकनाशी युक्त पैकेटों को अलग कमरों और परिसरों में संग्रहित किया जाएगा, जो अन्य वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्रयुक्त कमरों और परिसरों से दूर होंगे, अथवा शाकनाशी की मात्रा और प्रकृति के आधार पर उन्हें अलग अलमारी में ताला लगाकर रखा जाएगा। 2. शाकनाशी के भंडारण के लिए बने कमरे और परिसर अच्छी तरह से निर्मित, सूखे, अच्छी तरह से प्रकाशित, हवादार और पर्याप्त आयामों वाले होंगे।
खाली डिब्बों का निपटारा: 1. खाली पैकेट, अतिरिक्त सामग्री या धुलाई का निपटान सुरक्षित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो। 2. इस्तेमाल किए गए पैकेट को दोबारा इस्तेमाल से रोकने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। 3. खाली डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें पानी से तीन बार धोना चाहिए और बचे हुए पानी को स्प्रे मिश्रण में डालना चाहिए। 4. पैकेट को तोड़कर घर से दूर गाड़ देना चाहिए।
खाली कंटेनरों का पुन: उपयोग करना खतरनाक है।
रासायनिक संरचना: सिलिकॉन डाइऑक्साइड (एंटी-केकिंग) 6.7% भा/भा, एल्काइल-नेफ्थलीनसल्फोनिक एसिड का सोडियम लवण (वेटिंग एजेंट) 2.4% भा / भा, जलीय इमल्शन में पॉलीमेथिलसिलिओक्सेन (डिफोमर) 0.8% भा / भा, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट (को-डिसपरसेंट) पर्याप्त मात्रा % भा / भा, डाइमेथोमॉर्फ ए.आई. 12.0% भा / भा, पाइराक्लोस्ट्रोबिन ए.आई. 6.7% भा / भा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ नेफ़थलीनसल्फोनिक एसिड के संघनन उत्पाद का सोडियम लवण (डिसपर्सिंग एजेंट) 25.0% भा / भा, काओलिन (वाहक) 20.0% भा / भा, **कुल :100% भा / भा.**
चेतावनी: 1. लेबल और पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग न करें। 2. पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट कर दें। 3. इसे जल निकायों में न मिलाएँ क्योंकि यह उत्पाद मछलियों और मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है।

HINDI

डायमेथोमॉर्फ 12% + पायराक्लोस्ट्रोबिन 6.7% डब्ल्यूजी (बुरशीनाशक)

द्राक्ष व काकडी पिकांतील डावणी मिलडु (केवडा) रोगाच्या नियंत्रणासाठी, तसेच बटाटा पिकातील उशिरा येणाऱ्या करपा रोगाच्या आणि टोमॅटो पिकातील लवकर येणाऱ्या करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी याचा वापर करण्यात येतो.

पीक आणि कीटक/कीटकांचे नाव (शिफारस):

पिक(के)	कीटकांचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्यातील मिश्रणाचे प्रमाण (लिटरमध्ये)	शेवटच्या फवारणीपासून ते कापणीपर्यंतचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
		ए. आय. (ग्रॅम)	संरचना (मिली)		
काकडी	डावणी मिलडु (केवडा)	28.5	1500	500	10
द्राक्षे	डावणी मिलडु (केवडा)	220.5	1500	750-1000	34
बटाटा	उशिरा येणारा करपा	183.75	1250	500	26
टोमॅटो	लवकर येणारा करपा रोग	183.75 ग्रॅम	1250 ग्रॅम	500	10

वापरासंबंधी सूचना: ही औषधी जलचर सजीवांसाठी विषारी असल्यामुळे ती पाणीसाठे, जलाशय किंवा मत्स्यपालन क्षेत्राच्या परिसरात वापरू नये. रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येताच शिफारस केलेल्या मात्रेनुसार व फवारणी द्रावणाच्या प्रमाणानुसार त्वरित फवारणी करावी.
फवारणीची पद्धत: सदर उत्पादनाची पिकावर पर्णफवारणी स्वरूपात फवारणी करावी.
फवारणीचा कालावधी: रोगाची प्रारंभिक लक्षणे दिसताच तात्काळ फवारणी करावी.
घ्यावयाची काळजी: औषधाचा श्वासावाटे प्रवेश होणार नाही याची दक्षता घ्यावी तसेच त्वचा व डोळ्यांच्या संपर्कापासून दूर ठेवावे. अन्नपदार्थ व पशुखाद्यापासून दूर, थंड व कोरड्या ठिकाणी, वस्तीपासून सुरक्षित अंतरावर साठवण करावी. वापरात नसताना कंटेनर कुलूपबंद स्थितीत ठेवावेत. वापरानंतर रिकामे कंटेनर शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट करावेत. फवारणी दरम्यान अन्न सेवन, पाणी पिणे किंवा धूम्रपान करू नये. फवारणी पूर्ण झाल्यानंतर औषध लागलेली त्वचा व वस्त्रे साबण व स्वच्छ पाण्याने नीट धुवावीत.
विषबाधेची लक्षणे: सौम्य ते मध्यम विषारी परिणाम आढळू शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने त्वचा व श्लेष्मल त्वचेची सौम्य त्रास दिसून येतो. औषध गिळल्यास श्लेष्मल त्वचेवर जळजळ होऊ शकते तसेच जठरांत्र मार्गात अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. हवाई फवारणीदरम्यान श्वसनावाटे संपर्क आल्यास श्वसनमार्गातील वेदना, डोळ्यांत वेदना, खाज (प्रुरिटस), त्वचेची लालसरता, अशक्तपणा, डोकेदुखी व चक्कर येणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. तसेच मंदावलेपणा, लाळस्राव वाढणे, मळमळ, उलटी, डोळे व त्वचेची जळजळ आदी लक्षणेही संभवतात.
प्राथमिक उपचार: गिळल्यास: चुकून गिळल्यास तोंड स्वच्छ पाण्याने नीट धुवावे. रुग्ण बेशुद्ध अवस्थेत असल्यास उलटी करवू नये किंवा तोंडावाटे काहीही देऊ नये. **श्वासात गेल्यास:** रुग्णास शांत ठेवून त्वरित स्वच्छ हवेशीर ठिकाणी हलवावे व आवश्यक असल्यास तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्यावी. **त्वचेच्या संपर्कात आल्यास:** त्वचेवर संपर्क झाल्यास दूषित वस्त्रे त्वरित काढून टाकावीत. दूषित त्वचा साबण व स्वच्छ पाण्याने नीट व पूर्णपणे धुवावी. त्वचेची जळजळ किंवा दाह निर्माण झाल्यास तात्काळ वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. **डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास:** औषध डोळ्यांत गेल्यास पापण्या उघड्या ठेवून तत्काळ किमान 15 मिनिटे स्वच्छ वाहत्या पाण्याखाली प्रभावित डोळा धुवावा. यानंतर नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
फायटोटॉक्सिसिटी: शिफारस केल्याप्रमाणे वापरल्यास फायटोटॉक्सिसिटी नाही.
विषरोधक: कोणतेही विशिष्ट विषरोधक ज्ञात नाहीत. लक्षणात्मक उपचार करा.
कीटकनाशकांच्या वापराच्या तंत्रांशी संबंधित चांगल्या पद्धती:
प्रमाण प्रती क्षेत्र (प्रती हेक्टर): तक्त्यात सांगीतल्या प्रमाणे
हवामान स्थिती (सामान्यपणे): जेव्हा वारे शांत व स्थिर असेल तेव्हा फवारणी करा. 30°C च्या वर तापमान असल्यास फवारणी टाळा.
माती व पाणी (जे लागू असेल ते: मातीमध्ये पुरेसा ओलावा असल्यावर फवारणी करा.
फवारणीची तंत्रे: पानांवरील फवारणी
फवारणीचा कालावधी: रोगाची प्रारंभिक लक्षणे दिसताच तात्काळ फवारणी करावी.
उपयोग करण्याचा पिकाचा टप्पा: पिकाच्या वनस्पतीच्या वाढीच्या टप्प्यात रोग दिसू लागताच लवकरात लवकर उपयोग करावा.
फवारणी उपकरणाचा प्रकार: पोकळ शंक्वाकार नोजल बसविलेला नॅपसॅक फवारणी यंत्र किंवा उच्च-प्रमाण फवारणी यंत्र वापरावे.
नोजल प्रकार: पोकळ कोन नोझल
पुनर्प्रवेश कालावधी: 48 तास
कापणीपूर्व अंतराल(दिवसांमध्ये): टेबल मध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे.
फवारणीची वारंवारता व कमाल फवारण्यांची संख्या: रोगाच्या तीव्रतेनुसार 15-20 दिवसांच्या अंतराने 2 ते 3 फवारण्या कराव्यात.
कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके वापरू नयेत अशी अवस्था: पीक परिपक्व होण्याच्या टप्प्यावर आणि कापणीच्या अगदी आधी फवारणी करू नये.
मधमाशी आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू असणाऱ्या कीटकांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी: मधमाशी व इतर परागकर्ता दिवसा चारा शोधत असल्याने संसर्गाची जोखीम टाळण्यासाठी सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा फवारणी करण्याची शिफारस केलेली आहे.
उद्देश: फक्त शेतीच्या वापरासाठी.
साठवणुकीच्या अटी: 1. तण नाशकाची पाकीटे इतर वस्तु ठेवलेल्या खोल्या किंवा आवारापासून लांब इतर खोलीत किंवा आवारात तण नाशकाची मात्रा आणि स्वभावानुसार कपाटात कुलूप घालून ठेवावी. 2. तण नाशक साठविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा जागा चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या, कोरड्या, पुरेशा उजेडाच्या, वायुवीजन असलेल्या आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.
वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट: 1. रिकामे पॅकेजेस, शिल्लक औषध किंवा धुण्याचे पाणी यांची विल्हेवाट अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी की पर्यावरण किंवा जलस्रोतांचे प्रदूषण होणार नाही. 2. वापरलेले पॅकेजेस त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी उघड्यावर टाकू नयेत. 3. रिकाम्या डब्यांचा पुन्हा उपयोग करू नये. 4. रिकामे कंटेनर तीन वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवावेत (त्रिस्तरीय धुलाई करावी) आणि मिळालेला धुवून निघालेला द्राव फवारणी द्रावणामध्ये समाविष्ट करावा. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरले पाहिजेत.
रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे.
रासायनिक संघटन: सिलिकॉन डायऑक्साइड (गाठी निर्माण होऊ न देणारे घटक): 6.7% वजनानुसार (w/w), अल्किल-नॅफ्थलीन सल्फॉनिक आम्लाचे सोडियम मीठ (ओलावा निर्माण करणारे द्रव्य) : 2.4% w/w, जलीय इमल्शनमधील पॉलीमेथिल सिलिऑक्सेन (फेसनाशक) : 0.8% w/w, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट (सह-प्रसारणकारक) :आवश्यक प्रमाणात (Q.S.) वजनानुसार, डायमेथोमॉर्फ तांत्रिक घटक (a.i.) :12.0% w/w, पायरॅक्लोस्ट्रोबिन तांत्रिक घटक (a.i.) : 6.7% w/w, नॅफ्थलीन सल्फॉनिक आम्ल व फॉर्माल्डिहाइड यांच्या संघनन उत्पादनाचे सोडियम मीठ (प्रसारणकारक): 25.0% w/w, काओलिन (वाहक द्रव्य):20.0% w/w, **एकूण: 100% w/w.**
सावधानतेचे विधान: 1. लेबल आणि पत्रकांवर नमूद केलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरले जाऊ नये. 2. पत्रकात सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा. 3. हे उत्पादन मासे व मधमाश्यांसाठी विषारी असल्यामुळे ते जलस्रोतांमध्ये मिसळू देऊ नये.

MARATHI

ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ 12% + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 6.7% ਡਬਲਿਊ ਜੀ (ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ (ਝੁਲਸਾ ਰੋਗ) ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਬਲਾਈਟ (ਅਗੇਤੇ ਝੁਲਸਾ ਰੋਗ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਸਲ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ/ਪੇਸਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼):

ਫਸਲ/ਫਸਲਾਂ	ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨਾਂ)
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲਾ (ਮਿਲੀ)		
ਖੀਰਾ	ਡਾਊਨੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ	28.5	1500	500	10
ਅੰਗੂਰ	ਡਾਊਨੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ	220.5	1500	750-1000	34
ਆਲੂ	ਪਛੇਤ੍ਰਾਝੁਲਸਾ	183.75	1250	500	26
ਟਮਾਟਰ	ਅਰਲੀ ਝੁਲਸਾ	183.75 ਗ੍ਰਾਮ	1250 ਗ੍ਰਾਮ	500	10

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਪੀਓ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪਿਓ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਤੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਜਲਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੁਜਲੀ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸੁਸਤੀ, ਲਾਰ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ: ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ: ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਪਲਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਧੋਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਂਟੀਡੋਟ: ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਂਟੀਡੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ:
ਮਾਤਰਾ/ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ): ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ): ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। 30°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ: ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਪੜਾਅ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਹਾਈ-ਵਾਲਿਊਮ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ।
ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 48 ਘੰਟੇ।
ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨ): ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਆਵ੍ਰਿਤੀ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ 2-3 ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਫਸਲ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਗਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦੇਸ਼: ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ।
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ : 1. ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਭਾਲਣ ਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਕ ਤਹਿਤ ਆਲੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਮਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰੇ ਜ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨਾਸ਼ਕ ਰਖੱਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਇਆ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕਾ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਯੋਗ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ: 1. ਖਾਲੀ ਪੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਧੋਣ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4. ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਕੈਮੀਕਲ ਰਚਨਾ: ਸਿਲੀਕੋਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਐਂਟੀ-ਕੇਕਿੰਗ) 6.7% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਅਲਕਾਈਲ-ਨੈਫਥਲੀਨੇਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ (ਵੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ) 2.4% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਐਕਿਊਸ ਇਮਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਮੀਥਾਈਲਸਿਲੀਓਕਸੇਨ (ਡੀਫੋਮਰ) 0.8% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ (ਕੋ-ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ) ਕਿਊ.ਐਸ. % ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ ਏ.ਆਈ. 12.0% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਏ. ਆਈ. 6.7% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ (ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਫਥਲੀਨੇਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੰਘਣਤਾ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ 25.0% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਕਾਓਲਿਨ (ਕੈਰੀਅਰ) 20.0% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ, ਕੁੱਲ 100% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। 3. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।

PUNJABI

ડાયમેથોમોર્ફ 12% + પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન 6.7% ડબલ્યુજી (ફૂગનાશક)

તેનો ઉપયોગ દ્રાક્ષ અને કાકડીમાં ડાઉની માઇલ્ડ્યુ, બટાકામાં પાછોતરાં સુકારા અને ટામેટાંમાં આગોતરા સુકારાને નિયંત્રિત કરવા માટે થાય છે.

પાક અને જંતુ/જીવાતો નામ (ભલામણ):

પાક(કો)	જીવાત નું સામાન્ય નામ	ડોઝ / HA		પાણીમાં ઓગાળવુ (લીટર)	અંતિમ છંટકાવથી લણણી સુધીનો પ્રતીક્ષાનો સમયગાળો (દિવસો)
		એ. આઇ. (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિલી)		
કાકડી	ડાઉની માઇલ્ડ્યુ	28.5	1500	500	10
દ્રાક્ષ	ડાઉની માઇલ્ડ્યુ	220.5	1500	750-1000	34
બટાકાં	પાછોતરો સુકારો	183.75	1250	500	26
ટામેટાં	આગોતરો સુકારો	183.75 ગ્રામ	1250 ગ્રામ	500	10

ઉપયોગ અંગે માર્ગદર્શન: જળચર જીવો માટે ઝેરી હોવાથી પાણીના સ્ત્રોતો અથવા મત્સ્યઉછેર વિસ્તારની નજીક ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ભલામણ કરેલ ડોઝ અને છંટકાવના જથ્થાનો ઉપયોગ કરીને રોગ દેખાય કે તરત જ લાગુ કરો.
ઉપયોગની રીત: ઉત્પાદનને પાક પર ફોલીયર સ્પ્રે તરીકે લાગુ કરો.
ઉપયોગનો સમય: રોગનું પ્રથમ લક્ષણ દેખાય કે તરત જ લાગુ કરો.
સાવચેતીઓ: શ્વાસમાં લેવાનું અને ત્વચા અને આંખોના સંપર્કને ટાળો. ખોરાક અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર ઠંડી સૂકી જગ્યાએ વસવાટથી દૂર રાખો. જ્યારે ઉપયોગમાં ન હોય ત્યારે કન્ટેનરને તાળા-ચાવી હેઠળ રાખો. ઉપયોગ કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો નાશ કરો. ઉપયોગ દરમિયાન ખાવું, પીવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં. ઉપયોગ કર્યા પછી દૂષિત ત્વચા અને કપડાંને સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો.
ઝેરના લક્ષણો: હળવાથી મધ્યમ ઝેરી અસરમાં સામાન્ય રીતે ત્વચા અને મ્યુકોસ મેમ્બ્રેનની હળવી બળતરાનો સમાવેશ થાય છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન, મ્યુકસ મેમ્બ્રેનમાં બળતરા થઈ શકે છે અને પેટની સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. હવામાં લગાવ્યા પછી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, આંખોમાં દુખાવો, ખંજવાળ, ત્વચાની લાલાશ, નબળાઇ, માથાનો દુખાવો અને ચક્કર, સુસ્તી, લાળ, ઉબકા, ઉલટી, આંખો અને ત્વચામાં બળતરા થઈ શકે છે.
પ્રાથમિક સારવાર: જો ગળવામાં આવે તો: ગળી જાય તો, મોંમાં કોગળા કરી પાણીથી સારી રીતે ધોઇ લો. જો વ્યૈક્તિ બેભાન થઈ જાય તો ક્યારેય ઉલટી કરાવશો નહીં અથવા મોં દ્વારા કંઈપણ આપશો નહીં, તબીબી સહાય મેળવો. **જો શ્વાસમાં લેવામાં આવે તો:** દર્દીને શાંત રાખો, તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને તબીબી સહાય મેળવો. **ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં:** ત્વચાના સંપર્ક પછી, દૂષિત કપડાં દૂર કરો. દૂષિત ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઇ લો. જો બળતરા થાય, તો તબીબી સહાય મેળવો. **આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં:** આંખના સંપર્કમાં, તરત જ અસરગ્રસ્ત આંખને ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી વહેતા પાણી હેઠળ પોપચા ખુલ્લી રાખીને ધોઇ લો, આંખના નિષ્ણાતની સલાહ લો.
ફાયટોટોક્સિસિટી (પાક પર ઝેરી): ખેતર માટેની ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પાદન વિષ પાદપ નથી.
મારણ : કોઇ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.
જંતુનાશકોના ઉપયોગની તકનીકોને લગતી સારી પદ્ધતિઓ.
માત્રા/વિસ્તાર (હેક્ટર દીઠ) : કોષ્ટકમાં જણાવ્યા મુજબ.
હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે) : જ્યારે પવન સ્થિર અને આદર્શ હોય ત્યારે છંટકાવ કરો.
30° સે. થી ઉપરના તાપમાને છંટકાવ કરવાનું ટાળો.
માટી અને પાણી (જ્યાં લાગુ પડતું હોય) : જમીનમાં પૂરતો ભેજ હોય ત્યારે છંટકાવ કરો.
ઉપયોગની તકનીકો : પર્ણીય છંટકાવ.
ઉપયોગનો સમય: રોગનું પ્રથમ લક્ષણ દેખાય કે તરત જ લાગુ કરો.
છંટકાવ કરવા માટે પાકનો તબક્કો: પાકના વિકાસના તબક્કે અને બીમારીનાં લક્ષણો નજરે પડતાં તરત જ છંટકાવકરવો જોઇએ.
સાધનોનો પ્રકાર: હોલો કોન નોઝલ સાથે ફીટ કરેલ નેપસેક સ્પ્રેયર અથવા હાઇ-વોલ્યુમ સ્પ્રેયર.
નોઝલનો પ્રકાર: હોલો કોન નોઝલ.
પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો : 48 કલાક.
લણણી પહેલાંનો અંતરાલ (દિવસો): કોષ્ટકમાં જણાવ્યા મુજબ.
મહત્તમ છંટકાવની સંખ્યા સહિત આવર્તન: રોગની તીવ્રતાના આધારે 15-20 દિવસના અંતરાલ પર 2-3 છંટકાવ.
તબક્કા કે જે દરમ્યાન કોઈપણ પાક પર જંતુનાશકો અમલમાં ન લાવવા જોઈએ : પાકની પરિપક્વતા દરમ્યાન અથવા લણણી પહેલા ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.
મધમાખીઓ અને જંતુઓના કુદરતી દુશ્મનો જેવા ફાયદાકારક જંતુઓને નુકસાન ન થાય તે માટે લેવાતી સાવચેતીઓ: દિવસ દરમ્યાન મધમાખીઓ અને અન્ય પરાગ રજકો ખોરાક લેતા હોવાથી, સંપર્કના જોખમને ઘટાડવા માટે વહેલી સવારે અથવા મોડી સાંજે છંટકાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
હેતુ : માત્ર કૃષિ ઉપયોગ માટે.
સંગ્રહ માટેની શરતો : 1. ફૂગનાશક ધરાવતા પેકેજો, અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય વસ્તુઓ રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા રૂમ્સ અથવા જગ્યાઓથી અલગ રૂમમાં અથવા જગ્યામાં સંગ્રહિત કરવામાં આવશે અથવા નીંદણનાશકના જથ્થા અને પ્રકૃતિના આધારે લોક અને કી હેઠળ અલગ અલગ કબાટમાં રાખવામાં આવશે. 2. ફૂગનાશક રાખવા માટેના રૂમ્સ અથવા પરિસર પૂરતા પ્રમાણમાં સુકા, સારી રીતે ઉજાશવાળા અને હવાની અવરજવર અને બાષ્પના દૂષણને ટાળી શકે તે મુજબના બના બનાવવામાં આવશે.
વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ : 1. ખાલી પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રી અથવા ધોવાણનો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ જેથી પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણ ન થાય. 2. વપરાયેલા પેકેજીસ તેમનો ફરીથી ઉપયોગ થતો અટકે તે માટે બહાર છોડવાં નહીં. 3. ખાલી પાત્રોનો ફરી વાર ઉપયોગ ના કરશો. આને પાણીથી ત્રણ વખત ધોવા જોઈએ અને ધોવાણનું પાણી સ્પ્રે મિશ્રણમાં રેડવું જોઈએ. 4. પડીકાંને તોડીને વસવાટથી દૂર દાટી દેવામાં આવશે.
ખાલી કન્ટેનરનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે.
રાસાયણિક રચના: સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ (એન્ટી-કેકિંગ) 6.7 % w/w, આલ્કિલ-નેફ્થલેનેસલ્ફોનિક એસિડનું સોડિયમ ક્ષાર (વેટિંગ એજન્ટ) 2.4 % w/w, જલીય ઇમલ્શનમાં પોલીમિથાઇલસિલોક્સેન (ડીફોમર) 0.8 % w/w, સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ (કો-ડિસ્પર્સન્ટ) Q.S. % w/w, ડિમેથોમોર્ફ a.i. 12.0 % w/w, પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન a.i. 6.7 % w/w, નેફ્થલેનેસલ્ફોનિક એસિડના ફોર્માલ્ડીહાઇડ સાથેના કન્ડેન્સેશન પ્રોડક્ટનું સોડિયમ ક્ષાર (ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ) 25.0 % w/w, કાઓલિન (કેરિયર) 20.0 % w/w, કુલ 100 % w/w.
ચેતવણી આપતું નિવેદન: 1. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સૂચવવામાં આવેલા હેતુઓ સિવાય અન્ય કોઈપણ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. 2. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરવો. 3. પાણીના સ્ત્રોતો સાથે મિશ્રણ કરવાનું ટાળો કારણ કે ઉત્પાદન માછલી અને મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે.

GUJARATI

445.00 mm

320.00 mm

ଡାଇମେଥୋମର୍ଫ୍ 12% + ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 6.7% WG
(ଫିମ୍ପିନାଶକ)

ଅଙ୍ଗୁର ଏବଂ କାକୁଡିରେ ଡାଉନି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ ରୋଗ, ଆଳୁ ଫସଲରେ ଉଛୁର ଏବଂ ଟମାଟୋରେ ସଅଳ ବ୍ଲାଇଟ୍ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ଫସଲ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ/ ଫସଲ ଶତ୍ରୁ ର ନାମ (ସୁପାରିଶକରଣ):

ଶସ୍ୟ(ଗୁଡିକ)	ଫସଲ ଶତ୍ରୁ ସାଧାରଣ ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର		ସିଞ୍ଚନ ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲିଟର)	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ (ଦିନରେ)
		ଏ.ଆଇ. (ଗ୍ରାମ)	ପ୍ରସ୍ତୁତି (ମିଲି)		
କାକୁଡି	ଡାଉନି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ	28.5	1500	500	10
ଅଙ୍ଗୁର	ଡାଉନି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ	220.5	1500	750-1000	34
ଆଳୁ	ଉଛୁର ବ୍ଲାଇଟ୍	183.75	1250	500	26
ଟମାଟୋ	ସଅଳ ବ୍ଲାଇଟ୍	183.75 ଗ୍ରାମ	1250 ଗ୍ରାମ	500	10

ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ : ଜଳଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ତେଣୁ ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ମାଛଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସୁପାରିଶ କୃତ ମାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ଭଲ୍ୟୁମ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପଦ୍ଧତି: ଉତ୍ପାଦକୁ ଫସଲରେ ଫୋଲିୟର୍ ସ୍ପ୍ରେ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସମୟ: ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ସାବଧାନତା: ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଏବଂ ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପଶୁଖାଦ୍ୟଠାରୁ , ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ଥଣ୍ଡା ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାବେଳେ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲା ଚାବି ଥିବା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବହାର ପରେ ଖାଲି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସଂକ୍ରମଣ ତ୍ୱଚା ଏବଂ ପୋଷାକକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ବିଷାକ୍ତତା ସାଧାରଣତଃ ମୃଦୁ ଚର୍ମରୋଗ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମୁକୋସ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍‌ରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଜଳିବା ସହିତ ମୁକୋସ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍‌ରେ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇପାରେ । ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରୁରିଟସ୍, ତ୍ୱଚାରେ ଲାଲ୍ଲଣତା, ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତ, ପ୍ରଭୃତି ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ଲାଳ ବାହାରିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ଆଖି ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ ।
ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ : ଯଦି ଗିଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ: ଗିଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପାଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ରୋଗୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ କଦାପି ବାଧ୍ୟ କରି ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଟିରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । **ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଯାଇଥାଏ :** ରୋଗୀକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । **ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ :** ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସଂକ୍ରମିତ ପୋଷାକକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ତ୍ୱଚାକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । **ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ :** ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଆଖିକୁ ଅତି କମରେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁଥିବା ପାଣି ତଳେ ଆଖିପତା ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
ଫାଇଟୋଟୋକ୍ସିସିଟି: ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଫାଇଟୋଟୋକ୍ସିସିଟି ହେବ ନୁହେଁ।
ପ୍ରତିଷେଧକ: କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଜଣାନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।
କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ:
ମାତ୍ରା/କ୍ଷେତ୍ର (ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର): ଟେବୁଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି।
ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା (ସାଧାରଣତ ଭାବରେ): ପବନ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । 30°C ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମାଟି ଏବଂ ଜଳ (ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ): ମାଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କୌଶଳ: ପତ୍ର ସ୍ପ୍ରେ ।
ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସମୟ: ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରୟୋଗର ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ରୋଗ ଦେଖାଦେବା ମାତ୍ରେ ଫସଲର ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ।
ଉପକରଣ ପ୍ରକାର: ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର କିମ୍ବା ହୋଲୋ କୋନ୍ ନୋଜଲ୍ ଥିବା ଉଚ୍ଚ-ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ପ୍ରେୟର।
ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର : ହୋଲୋ କୋନ୍ ନୋଜଲ୍ ।
ପୁନଃ-ପ୍ରବେଶ ଅବଧି: 48 ଘଣ୍ଟା।
ଅମଳ- ପୂର୍ବ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ): ଟେବୁଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି।
ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାର ବାରମ୍ବାରତା : ରୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 15-20 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2-3 ଥର ସ୍ପ୍ରେ।
କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଫସଲରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ: ଫସଲ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ମହୁମାଛି ପରି ଉପକାରୀ କୀଟ ଏବଂ ଅପକାରୀ କୀଟଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ : ଯେହେତୁ ଦିନରେ ମହୁମାଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରାଗସଂଗମ କରୁଥିବା କୀଟମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍।
ବ୍ୟବହାରର୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: କେବଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି : କୀଟନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଶେଷକରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଲଗା କୋଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। କିମ୍ବା କୀଟନାଶକର ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଲମିରାରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍। 2. ଗୁଳ୍ମନାଶକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀ ଏବଂ ପରିସରଟି ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଶୁଷ୍କ, ସୁଆଲୋକିତ, ଉତ୍ତମ ବାୟୁଚଳାଚଳ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ପରିମାଣର ହେବା ଉଚିତ।
ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍କାସନ: 1. ଖାଲି ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ବଳକା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଧୋଇଧୋଇ ପାଣିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେପରି ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହୁଏ। 2. ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହାର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ବିପଦଜନକ ଅଟେ। 3. ଖାଲି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ତିନିଥର ଧୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ମିଶ୍ରଣରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। 4. ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।
ଖାଲି ଡବାଗୁଡିକର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ।
ରାସାୟନିକ ଗଠନ: ସିଲିକନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (ଆଣ୍ଟି-କେକିଂ) 6.7% w/w, ଆଲକାଇଲ୍-ନାପଥ୍ଲେନସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ (ୱେଟିଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ) ର ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ 2.4% w/w, ଜଳୀୟ ଏମଲ୍ସନ୍ ରେ ପଲିମିଥାଇଲସିଲିଅକ୍ସେନ (ଡିଫୋମର) 0.8% w / w , ସୋଡିୟମ୍ ଲିଗ୍ନୋସଲଫୋନେଟ୍ (ସହ-ଡିସ୍ପର୍ସେଟ୍) Q.S. % w/w, ଡାଇମେଥୋମର୍ଫ୍ ଏ.ଆଇ. 12.0%w/w, ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ଏ.ଆଇ. 6.7% w/w,ଫର୍ମାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ସହିତ ନାପଥାଲେନସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଏକ ଘନୀଭୂତ ଉତ୍ପାଦର ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ (ଡିସ୍ପର୍ସିଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଟ) 25.0% w/w, କାଓଲିନ୍ (କ୍ୟାରିଅର୍) 20.0% w/w, **ମୋଟ : 100% w/w।**
ସତର୍କତାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ : 1. ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଲିଫଲେଟ୍ ରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । 2. ବ୍ୟବହାର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡବା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 3. ମାଛ ଏବଂ ମହୁମାଛି ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳାଶୟ ରେ ମିଶିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Oriya

டைமெத்தோமார்ஃப் 12% + பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின் 6.7% WG
(பூஞ்சைக் கொல்லி)

இது திராட்சை மற்றும் வெள்ளரியில் அடிச்சாம்பல் நோயைக் கட்டுப்படுத்தவும், உருளைக்கிழங்கில் பின் கருகல் நோயையும், தக்காளியில் முன் கருகல் நோயையும் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது.

பயிர் மற்றும் பூச்சி/நோய்ப்பூச்சி பெயர் (பரிந்துரைப்பு):

பயிர் (கள்)	பூச்சிகளின் பொதுவான பெயர்	மருந்தளவு/ ஹெக்டேர்		நீரில் நீர்த்தல் (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பு முதல் அறுவடை வரை காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)
		A.I. (கிராம்)	கலவைத் திட்டம் (மிலி)		
வெள்ளரி	அடிச்சாம்பல் நோய்	28.5	1500	500	10
திராட்சை	அடிச்சாம்பல் நோய்	220.5	1500	750-1000	34
உருளைக் கிழங்கு	பின் கருகல் நோய்	183.75	1250	500	26
தக்காளி	பின் கருகல் நோய்	183.75 கிராம்	1250 கிராம்	500	10

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்: நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது, எனவே நீர்நிலைகள் அல்லது மீன் வளர்ப்பு பகுதிகளுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக்கூடாது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு மற்றும் தெளிப்பு அளவைப் பயன்படுத்தி நோய் பாதிப்பு தோன்றியவுடன் பயன்படுத்தவும்.
பயன்படுத்தும் முறை: பயிரின் மீது இலைவழி தெளிப்பாகப் பயன்படுத்தவும்.
பயன்படுத்தும் நேரம்: நோயின் முதல் அறிகுறி தெரிந்தவுடன் பயன்படுத்தவும்.
முன்னெச்சரிக்கைகள்: உள்ளிழுப்பதையும், சருமம் மற்றும் கண்களுடன் தொடர்பு கொள்வதையும் தவிர்க்கவும். உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தீவனங்களிலிருந்து தள்ளி குளிர்ந்த, உலர்ந்த இடத்தில், வாழ்விடங்களிலிருந்து தள்ளி வைக்கவும். பயன்படுத்தப்படாதபோது கொள்கலன்களைப் பூட்டுச் சாவியின் கீழ் வைக்கவும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு காலியான கொள்கலன்களை அழிக்கவும். பயன்பாட்டின் போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ அல்லது புகைப்பிடிக்கவோ கூடாது. பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு அசுத்தமான சருமம் மற்றும் துணிகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும்.
விஷமேறியதற்கான அறிகுறிகள்: லேசானது முதல் மிதமான நச்சுத்தன்மை பொதுவாக லேசான சருமம் மற்றும் சளி சவ்வு எரிச்சல் ஏற்படலாம். விழுங்கினால் சளி சவ்வுகளில் எரிதல் மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறு ஏற்படலாம். உள்ளிழுக்கும் போது சுவாசக் குழாய் வலி, கண் வலி, அரிப்பு, சருமம் சிவத்தல், பலவீனம், தலைவலி மற்றும் தலைச்சுற்றல் ஏற்படலாம் வான்வழி பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு மந்தமான உணர்வு, உமிழ்நீர் சுரப்பு, குமட்டல், வாந்தி, கண் மற்றும் சரும எரிச்சல் ஏற்படலாம்.
முதலுதவி: உட்கொண்டால்: உட்கொண்டவுடன், வாயை தண்ணீரில் நன்கு கொப்பளிக்கவும். பாதிக்கப்பட்டவர் மயக்கமடைந்தால் வாந்தியைத் தூண்டவோ அல்லது வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கவோ கூடாது, மருத்துவ உதவியைப் பெறவும். **உள்ளிழுத்தால்:** நோயாளியை அமைதிப்படுத்தி, புதிய காற்று இருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று மருத்துவ உதவியைப் பெறவும். **சருமத்தில் பட்டால்:** சருத்துடன் தொடர்பு கொண்ட பிறகு, அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றவும். மாசுபட்ட சருமத்தை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் நன்கு கழுவவும். எரிச்சல் ஏற்பட்டால், மருத்துவ சிகிச்சை பெறவும். **கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்:** கண்ணில் பட்டால், பாதிக்கப்பட்ட கண்ணை உடனடியாக ஓடும் நீரின் கீழ் குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கண் இமைகள் திறந்த நிலையில் கழுவவும், ஒரு கண் நிபுணரை அணுகவும்.
தாவர நச்சுத்தன்மை: பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி பயன்படுத்தும் போது தாவர நச்சு தன்மை அற்றது.
முறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட முறிவு மருந்து எதுவும் இல்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சையளிக்கவும்.
பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாட்டு நுட்பங்கள் தொடர்பான நல்ல நடைமுறைகள்:
மருந்தளவு/பரப்பளவு (ஒரு ஹெக்டேருக்கு): அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி.
வானிலை நிலைமைகள் (பொதுவாக): காற்று சீராகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும்போது தெளிக்கவும். 30°C க்கும் அதிகமான வெப்பநிலையில் தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
மண் மற்றும் நீர் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்): மண்ணில் போதுமான ஈரப்பதம் இருக்கும்போது தெளிக்கவும்.
பயன்பாட்டு நுட்பங்கள்: இலைவழி தெளிப்பு.
பயன்பாட்டு நேரங்கள்: நோயின் முதல் அறிகுறி தெரிந்தவுடன் பயன்படுத்தவும்
பயன்பாட்டிற்கான பயிர் நிலை: பயிரின் தாவர வளர்ச்சி நிலையில் நோய் தோன்றியவுடன் உடனடியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
உபகரண வகை: முதுகுப்பை தெளிப்பான் அல்லது குழிவான கூம்பு முனையுடன் பொருத்தப்பட்ட அதிக அளவு தெளிப்பான்.
முனை வகை: குழிவான கூம்பு முனை. (ஹாலோ கோன் நாசில்)
மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம்.
அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி (நாட்கள்): அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி.
அதிகபட்ச தெளிப்புகளின் எண்ணிக்கைகள் உட்பட இடைவெளி: நோயின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து 15-20 நாட்கள் இடைவெளியில் 2-3 தெளிப்புகள்.
எந்தப் பயிரிலும் பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாத நிலைகள்: பயிர் முதிர்ச்சியடையும் போது அல்லது அறுவடைக்கு சற்று முன்பு பயன்படுத்தக்கூடாது.
தேனீக்கள் மற்றும் பூச்சிகளின் இயற்கையான எதிரிகள் போன்ற பயனளிக்கும் பூச்சிகளுக்கு கேடு விளைவிக்காமல் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள்: தேனீக்கள் மற்றும் பிற மகரந்த சேர்க்கையாளர்கள் பகலில் உணவு தேடுவதால், வெளிப்பாட்டின் ஆபத்தை குறைக்க அதிகாலை அல்லது மாலையில் தெளிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
நோக்கம்: விவசாய பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே.
சேமிப்புநிலைமைகள்: 1. களைக்கொல்லி அடங்கிய பொட்டலங்கள் தனி அறைகளிலோ அல்லது வளாகத்திலோ மற்ற பொருட்களை, குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களை சேமித்து வைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களிலிருந்து தள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது களைக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மைக்கேற்ப தனித்தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கப்பட வேண்டும். 2. களைக்கொல்லியை சேமித்து வைப்பதற்கான அறைகள் மற்றும் வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், நல்ல வெளிச்சம் உள்ளதாகவும், காற்றோட்டமானதாகவும், போதுமான பரிமாணங்களைக் கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: 1 காலியான பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரி பொருட்கள் அல்லது கழுவுதல் ஆகியவை சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தாத வகையில் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. உபயோகித்த மருந்துப்பெட்டிகளை மறுஉபயோகம் செய்யப்படுவதைத் தடுக்க வசதியாக அவற்றை வெளியில் வைக்க வேண்டாம். 3. காலியான கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது. இவற்றை மூன்று முறை தண்ணீரில் கழுவி, அவற்றின் கலவையை தெளிப்பு கலவையில் ஊற்ற வேண்டும். 4. பேக்கேஜ்கள் உடைக்கப்பட்டு வாழ்விடங்களிலிருந்து தள்ளி புதைக்கப்பட வேண்டும். காலியான கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது.
இரசாயனக் கலவை: சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு (கேக்கிங் எதிர்ப்பு) 6.7 % w/w, அல்கைல் - நாப்த்லீன்சல்போனிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு (ஈரமாக்கும் பொருள்) 2.4 % w/w, அக்யூஸ் குழம்பில் உள்ள பாலிமெதில்சிலியோக்சேன் (நுரை எதிர்ப்பி) 0.8 % w/w, சோடியம் லிக்னோசல்போனேட் (இணை-பரப்பி) Q.S. % w/w, டைமெத்தோமார்ஃப் a.i. 12.0 % w/w, பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின் a.i. 6.7 % w/w, ஃபார்மால்டிஹைடு (பரப்பும் பொருள்) உடன் நாப்தலீன்சல்போனிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கப் பொருளின் சோடியம் உப்பு 25.0 % w/w, கயோலின் (கேரியர்) 20.0 % w/w, மொத்தம் 100 % w/w.
எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. பிரசுரத்தில் விவரித்தபடி கொள்கலனை அழித்துவிடவும். 3. மீன் மற்றும் தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது என்பதால் நீர்நிலைகளுடன் கலப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

TAMIL

ಡೈಮೆಥೊಮಾರ್ಫ್ 12% + ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 6.7% WG
(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಇದನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಜು ತುಪ್ಪಟ ರೋಗ; ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ/ಪೀಡೆಯ ಹೆಸರು (ಶಿಫಾರಸು):

ಬೆಳೆಗಳು	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರ್		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲೀ)		
ಸೌತೆಕಾಯಿ	ಬೂಜು ತುಪ್ಪಟ	28.5	1500	500	10
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಬೂಜು ತುಪ್ಪಟ	220.5	1500	750-1000	34
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಅಂತ್ಯ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ	183.75	1250	500	26
ಟೊಮೆಟೊ	ಆದಿ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದ	183.75 ಗ್ರಾಂ	1250 ಗ್ರಾಂ	500	10

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬೆಳೆಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಬಳಸುವ ಸಮಯ: ರೋಗದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ, ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ, ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಬಳಸದೇ ಇರುವಾಗ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇರಿಸಿ. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ವಿಷದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವಿಷತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೋಳೆಪೊರೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಳೆಪೊರೆಗಳು ಉರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಠರಗರುಳಿನ ತೊಂದರೆಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದ ನೋವು, ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು, ತುರಿಕೆ, ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮಂದತೆ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸೇವಿಸಿದರೆ: ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಂಡರೆ:** ರೋಗಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:** ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ನಂತರ, ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:** ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿದರೆ, ಬಾಧಿತ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಿರಿ, ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿವಿಷ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.
ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು:
ಪ್ರಮಾಣ/ಪ್ರದೇಶ (ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ): ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ.
ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ): ಗಾಳಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 30°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು (ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ): ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ.
ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯಗಳು: ರೋಗದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಅನ್ವಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಬೆಳೆಗಳ ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
ಸಲಕರಣೆಯ ವಿಧ: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.
ನಳಿಕೆಯ ವಿಧ: ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಜಲ್
ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆಗಳು.
ಪೂರ್ವ ಕೊಯ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರ (ದಿನಗಳು): ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ: ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 15-20 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು.
ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದ ಹಂತಗಳು: ಬೆಳೆ ಪಕ್ವತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು.
ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ, ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ: ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡಬ್ಬಿ / ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ, ತಂಪಾದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಆವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು, ಒಣಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿಯಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಬಳಸಿದ ಧಾರಕದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು: 1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ / ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಡಬ್ಬಿ / ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಖಾಲಿ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿನ್ಸೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. 4. ಡಬ್ಬಿ / ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.
ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (ಆಂಟಿ-ಕೇಕಿಂಗ್) 6.7% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಆಲ್ಕೈಲ್-ನಾಫ್ಥೆಲೀನ್‌ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು (ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್) 2.4% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಅಕ್ವಿಯೋಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಮೀಥೈಲ್ಸಿಲಿಯೋಕ್ಸೇನ್ (ಡಿಫೋಮರ್) 0.8% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್ (ಸಹ-ಪ್ರಸರಣ) ಕ್ಯೂ.ಎಸ್. % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಡೈಮೆಥೊಮಾರ್ಫ್ ಎ.ಐ. 12.0% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಎ.ಐ. 6.7% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಾಫ್ಥಲೀನ್‌ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು (ಪ್ರಸರಣ ಏಜೆಂಟ್) 25.0 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, ಕಾಯೋಲಿನ್ (ವಾಹಕ) 20.0 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು, **ಒಟ್ಟು : 100 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು.**
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಧಾರಕವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. 3. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

Kannada

ডাইমেথোমর্ফ 12%+পাইরাক্লোস্ট্রোবিন 6.7% ডাব্লুজি
(ছত্রাকনাশক)

এটি আঙ্গুর এবং শসায় ডাউনি মিলডিউ(ছাতরা রোগ) রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়; আলুর ফসলে নাবি ধ্বসা এবং টমেটোর ফসলে জলদি ধ্বসা।

ফসল এবং পোকামাকড়/কীটপতঙ্গের নাম (সুপারিশ):

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর		জলে দ্রবণীয় (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষার সময়কাল (দিনে হিসাব করা হয়েছে)
		এ.আই. (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মিলি)		
শসার	ছাতরা রোগ	28.5	1500	500	10
আঙুর	ছাতরা রোগ	220.5	1500	750-1000	34
আলু	নাবি ধ্বসা	183.75	1250	500	26
টমেটো	জলদি ধ্বসা	183.75 গ্রাম	1250 গ্রাম	500	10

ব্যবহারের দিক: জলজ প্রাণীর জন্য বিষাক্ত, তাই জলাশয় বা মৎস্য চাষের এলাকার কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে সুপারিশকৃত মাত্রা এবং স্প্রে পরিমাণ ব্যবহার করুন।
প্রয়োগ পদ্ধতি: ফসলে পাতার স্প্রে হিসেবে পণ্যটি প্রয়োগ করুন।
প্রয়োগের সময়: রোগের প্রথম লক্ষণ দেখা মাত্রই প্রয়োগ করুন।
সাবধানতা: শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ঢোকা এবং ত্বক ও চোখের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। খাদ্যদ্রব্য এবং পশুপাখির খাবার থেকে দূরে বাসস্থান থেকে দূরে ঠান্ডা,শুকনো জায়গায় রাখুন। যখন পাত্র ব্যবহার করা হয় না, তখন তালা দিয়ে রাখুন। ব্যবহারের পর খালি পাত্র নষ্ট করে ফেলুন। প্রয়োগের সময় কোনো কিছু খাবেন না, পান করবেন না বা ধূমপান করবেন না। প্রয়োগের পর দূষিত ত্বক এবং কাপড় সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
বিষক্রিয়ার লক্ষণ: হালকা থেকে মাঝারি বিষাক্ততার ফলে সাধারণত ত্বক এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে হালকা জ্বালাপোড়া হয়। পেটের মধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে জ্বালাপোড়া এবং পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাতাসে প্রয়োগের পর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণের পর শ্বাসনালীর ব্যথা, চোখের ব্যথা, চুলকানি, ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা, মাথাব্যথা এবং মাথা ঘোরা, নিস্তেজতা, লালা, বমি বমি ভাব, বমি, চোখ এবং ত্বকে জ্বালা হতে পারে।
প্রাথমিক চিকিৎসা: যদি খেয়ে ফেলে: খাওয়ার পর, জল দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়ে ফেলুন। আক্রান্ত ব্যক্তি অজ্ঞান থাকলে কখনও বমি করাবেন না বা মুখ দিয়ে কিছু খেতে দেবেন না, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। **যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ঢুকে যায়:** রোগীকে শান্ত রাখুন। **ত্বকের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে:** ত্বকের সংস্পর্শের পরে দূষিত ত্বক সাবান ও জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
যদি জ্বালা করে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। **চোখের সংস্পর্শে এলে:** চোখের সংস্পর্শে এলে, অবিলম্বে আক্রান্ত চোখটি কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে চলমান জলের নীচে ধুয়ে ফেলুন এবং চোখের পাতা খোলা রাখুন, একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।
ফাইটোটক্সিসিটি: সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হলে ফাইটোটক্সিক নয়।
প্রতিষেধক: কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করুন।
কীটনাশক প্রয়োগের কৌশল সম্পর্কিত সুঅভ্যাস:
মাত্রা/জায়গা (প্রতি হেক্টর): সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
আবহাওয়ার পরিস্থিতি (সাধারণভাবে): হাওয়া স্থির এবং আদর্শ থাকলে স্প্রে করুন। 30° ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় স্প্রে করা এড়িয়ে যান।
মাটি এবং জল (যেখানে প্রযোজ্য): মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকলে স্প্রে করুন।
প্রয়োগ কৌশল: পাতায় স্প্রে।
প্রয়োগের সময়: রোগের প্রথম লক্ষণ দেখা মাত্রই প্রয়োগ করুন।
প্রয়োগের জন্য ফসলের পর্যায়: রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফসলের শাকসবজির বৃদ্ধি পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে।
সরঞ্জামের ধরণ: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার অথবা ফাঁপা শঙ্কু নজল সহ হাই-ভলিউম স্প্রেয়ার।
নজলের প্রকার: ফাঁপা কোণ নজল।
পুনরায় প্রবেশের সময়কাল: 48 ঘন্টা।
প্রাক-ফসল তোলার ব্যবধান (দিনে): টেবিলে করা উল্লেখ অনুসারে।
স্প্রে করার সর্বোচ্চ সংখ্যা সহ ফ্রিকোয়েন্সি: রোগের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ১৫-২০ দিনের ব্যবধানে ২-৩টি স্প্রে।
যে পর্যায়ে কোনো ফসলেই ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়:
ফসলের পরিপক্কতার সময় বা ফসল কাটার ঠিক পূর্বে প্রয়োগ করা যাবে না।
মৌমাছি এবং কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক শত্রুর মতো উপকারী পোকামাকড়ের ক্ষতি এড়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা: দিনের বেলা মৌমাছি এবং অন্যান্য পরাগায়নকারী কীটপতঙ্গের জন্য, ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমাতে ভোরে বা সন্ধ্যায় স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
উদ্দেশ্য: শুধুমাত্র কৃষি কাজের জন্য।
সংরক্ষণের শর্তাবলী: 1. ভেষজনাশকের পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে প্যাকেটগুলো অন্যান্য জিনিসপত্র, বিশেষত খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণের ঘর থেকে দূরে পৃথক কক্ষ বা প্রাঙ্গণে রাখতে হবে, অথবা আলাদা আলমারিতে তালা-চাবি দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। 2. ঘর অথবা বাড়ি যেখানে ভেষজনাশকে রাখা হবে সেটি হতে হবে মজবুত, প্রচুর আলোবাতাস আছে এমন এবং বেশ বড় আয়তনযুক্ত ঘরে রাখতে হবে, যেখানে জলীয় বাষ্প তৈরি না হয়।
ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি: 1. খালি প্যাকেজ বা অতিরিক্ত জিনিসপত্র বা ধোওয়া জল নিরাপদে এমনভাবে ফেলা উচিত যাতে পরিবেশ বা জল দূষিত না হয়। 2. পুনর্ব্যবহার রোধ করার জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজটি বাইরে ফেলে রাখা যাবে না । 3. খালি পাত্রগুলি নষ্ট করে মাটির তলায় আবাস-স্থলের থেকে দূরে কোথাও পুঁতে ফেলুন। এগুলো তিনবার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং স্প্রে মিশ্রণে ঢেলে দিতে হবে। 4. প্যাকেটগুলো ভেঙ্গে লোকালয় থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।
খালি পাত্রে পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক।
রাসায়নিক গঠন: সিলিকন ডাই অক্সাইড (অ্যান্টি-কেকিং) 6.7% ডব্লু/ডব্লু, অ্যালকাইল-ন্যাপথলিনসালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট (ওয়েটিং এজেন্ট) 2.4% ডব্লু/ডব্লু, জলে গুলে পলিমিথাইলসিলিওক্সেন (ডিফোমার) 0.8% ডব্লু/ডব্লু,সোডিয়াম লিগনোসালফোনেট (কো-ডিসপারসেন্ট) কিউ.এস.% ডব্লু/ডব্লু,, ডাইমেথোমর্ফ এ.আই. 12.0% ডব্লু/ডব্লু,, পাইরাক্লোস্ট্রোবিন এ.আই. 6.7% ডব্লু/ডব্লু, ন্যাপথলিনসালফোনিক অ্যাসিডের সাথে ফর্মালডিহাইডের ঘনীভবন পণ্যের সোডিয়াম সল্ট (ডিসপারসিং এজেন্ট) 25.0% ডব্লু/ডব্লু,, কাওলিন (ক্যারিয়ার) 20.0% ডব্লু/ডব্লু, **মোট : 100% ডব্লু/ডব্লু।**
সতর্কতামূলক বিবৃতি: 1. লেবেল এবং লিফলেটগুলোতে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। 2. পুস্তিকায় থাকা নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহারের পরে পাত্র নষ্ট করে দিন। 3. মাছ এবং মৌমাছির জন্য বিষাক্ত হওয়ায় জলাশয়ের সাথে মেশানো এড়িয়ে চলুন।

Bengali

డైమెథోమోర్ఫ్ 12% + పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 6.7% డబ్ల్యుజి
(శిలీంధ్రనాశిని)

ఇది ద్రాక్ష మరియు దోసలో డౌనీ బూజు తెగులు, బంగాళాదుంపలో ఆకుమాడు తెగులు మరియు టొమాటోలో ముందుగా వచ్చే ఆకు మాడు తెగులు నియంత్రణకు ఉపయోగించబడుతుంది.

పంట మరియు కీటకం/తెగులు పేరు (సిఫార్సు):

పంట(లు)	శిలీంధ్రనాశిని సాధారణ పేరు	మోతాదు/హెక్టార్		నీటిలో పలుచన చేయడం (లీ)	మునుపటి పిచికారీ మరియు కోత మధ్య వేచి ఉండాల్సిన సమయం (రోజులలో)
		ఎ.ఐ. (గ్రాము)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)		
దోస	డౌనీ బూజు తెగులు	28.5	1500	500	10
ద్రాక్ష	డౌనీ బూజు తెగులు	220.5	1500	750-1000	34
బంగాళాదుంప	ఆకుమాడు తెగులు	183.75	1250	500	26
టొమాటో	ముందుగా వచ్చే ఆకు మాడు తెగులు	183.75 గ్రాము	1250 గ్రాము	500	10

ఉపయోగించడానికి సూచన: చేపలు మరియు ఇతర జల జీవులకు విషపూరితం, కాబట్టి నీటి వనరులు లేదా పిసికల్చర్ ప్రాంతాల సమీపంలో ఉపయోగించకూడదు. సిఫార్సు చేసిన మోతాదును మరియు పిచికారీ పరిమాణాన్ని తెగుళ్లు మొదటి లక్షణం కనిపించిన వెంటనే ఉపయోగించాలి.
ఉపయోగించే విధానం: ఉత్పత్తిని పంటలలో ఆకులపై పిచికారీగా ఉపయోగించాలి.
ఉపయోగించవలసిన సమయం: తెగుళ్లు మొదటి లక్షణం కనిపించిన వెంటనే ఉపయోగించాలి.
ముందు జాగ్రత్తలు: పీల్చడం మరియు చర్మం పై & కళ్ళలో పడటాన్ని నివారించాలి. ఆహార పదార్థాలు మరియు పశువుల దాణాకు, నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో ఉంచాలి. పాత్రలను ఉపయోగించకపోతే వాటిని తాళం వేసి భద్రపరచాలి. ఉపయోగించిన తరువాత ఖాళీ పాత్రలను నాశనం చేయాలి. ఉపయోగించే సమయంలో తినడం, త్రాగడం లేదా పొగ త్రాగడం చేయకూడదు. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితమైన చర్మం మరియు దుస్తులను సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రం చేయాలి.
విషప్రభావ లక్షణాలు: తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు స్థాయి విషపూరిత ప్రభావం సాధారణంగా చర్మం మరియు మ్యూకస్ మెంబ్రేన్లలో చికాకును కలిగించవచ్చు. మింగినప్పుడు మ్యూకస్ మెంబ్రేన్లలో మంట, అలాగే జీర్ణాశయ సంబంధిత అసౌకర్యం కూడా కలుగవచ్చు. గాలి మార్గం ద్వారా మందు చల్లిన తరువాత శ్వాస ద్వారా ప్రభావానికి గురైతే వాయు నాళంలో, కళ్ళలో నొప్పి, తీవ్రమైన దురద, చర్మం ఎర్రగా కావడం, బలహీనత, తలనొప్పి మరియు తల తిరగడం, చురుకుదనం తగ్గడం, లాలాజల స్రావం, వాంతులు, కళ్ళు మరియు చర్మం చికాకు ఉండవచ్చు.
ప్రథమ చికిత్స: మింగితే: లోపలికి తీసుకుంటే, నోటిని, నీటితో బాగా శుభ్రం చేయాలి. బాధితుడు స్పృహలో లేకపోతే వాంతిని ప్రేరేపించకూడదు లేదా నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకూడదు. వైద్య సహాయం పొందాలి. **పీల్చితే:** రోగిని ప్రశాంతంగా ఉంచాలి, తాజా గాలిలోకి తరలించాలి. వైద్య సహాయం పొందాలి. **చర్మానికి తాకితే:** చర్మానికి తాకితే, కలుషిత దుస్తులను తొలగించాలి. కలుషిత చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రం చేయాలి. చికాకు కలిగితే, వైద్య సహాయం పొందండి. **కళ్ళలో పడితే:** కళ్ళలో పడితే, వెంటనే ప్రభావిత కంటిని కనీసం 15 నిమిషాలు నిరంతరంగా వస్తున్న నీటిలో కడగాలి, కనురెప్పలను తెరచి పట్టుకోవాలి, కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.
ఫైటోటాక్సిసిటీ: సిఫార్సు చేసిన విధంగా ఉపయోగిస్తే ఫైటోటాక్సిక్ రాదు.
విషానికి విరుగుడు: నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏదీ తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స అందించాలి.
పురుగుల మందును ఉపయోగించడానికి సంబంధించి మంచి పద్ధతులు:
మోతాదు/ప్రాంతం (హెక్టారుకి): పట్టికలో పేర్కొన్నట్లు.
వాతావరణ పరిస్థితి (సాధారణంగా): గాలి స్థిరంగా మరియు తగినట్లుగా ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి. 30°C కంటే ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయడాన్ని నివారించండి.
నేల & నీరు (వర్తించే చోట): నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి.
పిచికారీ పద్ధతులు: ఆకులపై పిచికారీ.
ఉపయోగించవలసిన సమయం: తెగుళ్లు మొదటి లక్షణం కనిపించిన వెంటనే ఉపయోగించాలి.
ఉపయోగించవలసిన పంట దశ: పంట ఏపుగా ఎదుగుతున్న దశలో తెగుళ్లు మొదటి లక్షణం కనిపించిన వెంటనే ఉపయోగించాలి.
సామగ్రి రకం: న్యాప్ సాక్ స్ప్రేయర్ లేదా హాలో కోన్ నాజిల్ బిగించిన అధిక-పరిమాణ స్ప్రేయర్
నాజిల్ రకం: హాలో కోన్ నాజిల్.
పునఃప్రవేశించే సమయం: 48 గంటలు.
కోతకు ముందు అంతరం (రోజులు): పట్టికపై పేర్కొన్నట్లు.
గరిష్ట పిచికారీల సంఖ్యతో సహా తరచుదనం: తెగుళ్లు తీవ్రత ఆధారంగా 15-20 రోజుల అంతరంలో 2-3 పిచికారీలను చేయాలి.
ఏదైనా పంటలపై ఈ సేంద్రీయ శిలీంధ్రనాశిని ఉపయోగించకూడని దశలు:
రోజులో తేనెటీగలు చురుకుగా ఆహారాన్ని వెతికే సమయంలో పిచికారీ చేయకూడదు.
తేనెటీగలు వంటి ప్రయోజనకర కీటకాలు మరియు పంటలో మిత్ర కీటకాలకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు: తేనెటీగలు మరియు ఇతర పోలినేటర్లు పగటి సమయం ఆహారం కోసం వెతుకుతాయి కాబట్టి, అవి రసాయనాలకి బహిర్గతం అయ్యే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం తరువాత పిచికారీ చేయాలని సిఫార్సు చేయబడుతుంది.
ప్రయోజనం: వ్యవసాయ సంబంధం వినియోగానికి మాత్రమే.
నిల్వచేయటానికి నియమాలు: 1. శిలీంధ్రనాశినిని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలను విడిగా గదుల్లో లేదా ఇతర వస్తువులు, ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా పరిసరాలకు దూరంగా నిల్వ చేయాలి లేదా కీటకనాశిని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తలుపు, తాళం ఉన్న అల్మారాలలో నిల్వ చేయాలి. 2. శిలీంధ్రనాశినిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు మరియు ప్రాంగణాలు ధృఢంగా, పొడిగా, మంచి గాలి, వెలుతురును కలిగి, తగిన కొలతలలో ఉండాలి.
ఉపయోగించిన పాత్రలను పారవేయడం: 1. ఖాళీ ప్యాకేజీలు లేదా అదనపు పదార్థాలను లేదా వాషింగ్ ను, పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యానికి కారణం కాకుండా సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి వాడటాన్ని నివారించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ఖాళీ పాత్రలను తిరిగి ఉపయోగించకూడదు. వీటిని నీటితో మూడుసార్లు పూర్తిగా కడిగి, ఆ కడిగిన నీటిని పిచికారీ ద్రావణంలో కలపాలి. ప్యాకేజీలను నాశనం చేసి, నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.
ఖాళీ పాత్రలను తిరిగి ఉపయోగించడం హానికరం.
రసాయనిక మిశ్రమం: సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ (యాంటీ-కేకినగ) 6.7 % w/w, ఆల్కిల్-నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం సోడియం లవణం (వెట్టింగ్ ఏజెంట్) 2.4 % w/w, పాలీమిథైల్ సిలోక్సేన్ ఆక్వియస్ ఎమల్షన్‌లో (డీఫోమర్) 0.8 % w/w, సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్ (సహ-డిస్ పర్సెంట్) Q.S. % w/w, డైమెథోమార్ఫ్ a.i. 12.0 % w/w, పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ a.i. 6.7 % w/w, నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం మరియు ఫార్మాల్డిహైడ్ సంయోగం ద్వారా ఏర్పడిన పదార్థం యొక్క సోడియం లవణం (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్) 25.0 % w/w, కయోలిన్ (క్యారియర్) 20.0 % w/w, **మొత్తం: 100 % w/w.**
హెచ్చరిక ప్రకటన: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రం పై పేర్కొన్నవాటికి తప్ప వేరే ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించకూడదు. 2. కరపత్రం పై పేర్కొన్నట్లు ఉపయోగించిన తరువాత పాత్రను నాశనం చేయాలి. 3. ఈ ఉత్పత్తి చేపలు మరియు తేనెటీగలకు విషపూరితం కాబట్టి నీటి వనరులలో కలుపడాన్ని నివారించాలి.

Telugu

ڈائمتھومورف 12% + پیراکلوسٹروبن 6.7% ڈبلیو جی
(فنگسائڈ)

یہ انگور اور کھیرے میں روئیں دار پھپھوندی کی بیماری، آلو کی فصل میں دیر سے جھلسنے کی بیماری اور ٹماٹر میں جلدی جھلسنے کی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

فصل اور کیڑے/کیڑوں کے نام (تجاویز):

فصل (فصلیں)	بیماریوں کے عمومی نام	مقدار / ہیکٹر		پانی میں تحلیل (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ اور کٹائی کے درمیان انتظار کا وقفہ (دن)
		فعال جز (گرام)	تشکیل (ملی لیٹر)		
کھیرا	روئیں دار پھپھوندی	28.5	1500	500	10
انگور	روئیں دار پھپھوندی	220.5	1500	750-1000	34
آلو	دیر سے جھلسنا	183.75	1250	500	26
ٹماٹر	جلدی جھلسنا	183.75 گرام	1250 گرام	500	10

استعمال کی ہدایات: آبی نامیاتی اجسام کے لیے زہریلا ہے اس لیے اسے آبی ذخائر یا پائسی کلچر یعنی مچھلی پالنے والے علاقے کے قریب استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ جیسے ہی بیماری کے واقعات ظاہر ہوں تجویز کردہ خوراک اور چھڑکاؤ کی مقدار کا استعمال کرتے ہوئے اس کا چھڑکاؤ کریں۔ **استعمال کا طریقہ:** پروڈکٹ کو فصل پر پتوں پر چھڑکاؤ کے طور پر استعمال کریں۔ **استعمال کا وقت:** بیماری کی پہلی علامت ظاہر ہوتے ہی استعمال کریں۔ **احتیاطی تدابیر:** سانس کے ذریعہ اندر جانے اور جلد اور آنکھوں میں لگنے سے بچائیں۔ رہائش سے دور کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں کے چاروں سے دور ٹھنڈی خشک جگہ پر رکھیں۔ جب استعمال نہ ہو تو کنٹینرز کو چابی سے مقفل کرکے رکھیں۔ استعمال کے بعد خالی کنٹینرز کو تلف کر دیں۔ استعمال کرتے وقت نہ کھائیں، نہ پئیں اور نہ ہی سگریٹ نوشی کریں۔ استعمال کے بعد آلودہ جلد اور کپڑوں کو صابن اور پانی سے دھوئیں۔ **زہر آلودگی کی علامات:** ہلکے سے معتدل زہریلاپن عام طور پر جلد اور بلغمی جھلی کی ہلکی جلن پر مشتمل ہوتا ہے۔ حمل کے اندر نیز معدے کی خرابی میں بلغمی جھلیوں میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ ہوائی چھڑکاؤ کے بعد سانس کے ذریعہ اندر جانے اور اس کی زد میں آنے کے بعد سانس کی نالی میں درد، آنکھ میں درد، شدید خارش، جلد کی سرخی، کمزوری، سر درد اور چکر آنا، سستی، کثرت لعاب، متلی، الٹی، آنکھ اور جلد میں جلن ہو سکتی ہے۔ **ابتدائی طبی امداد:** اگر نگل گئے ہوں: نگل جانے پر، منہ کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو کبھی بھی الٹی نہ کرائیں اور نہ ہی منہ سے کچھ دیں، طبی توجہ طلب کریں۔ اگر سانس کے ذریعہ اندر گیا ہو: مریض کو پرسکون رکھیں، تازہ ہوا میں لے جائیں اور طبی توجہ طلب کریں۔ جلد سے رابطے کی صورت میں: جلد میں لگنے کے بعد، آلودہ کپڑوں کو نکال دیں۔ متاثرہ جلد کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر جلن پیدا ہوتی ہے تو طبی توجہ حاصل کریں۔ آنکھ سے رابطے کی صورت میں: آنکھ میں لگنے کی صورت میں، متاثرہ آنکھ کو کم از کم 15 منٹ تک بہتے ہوئے پانی کے نیچے پلکیں کھول کر فوری طور پر دھوئیں، ماہر امراض چشم سے مشورہ کریں۔ **نباتی سمیّت:** مشورے کے مطابق استعمال ہونے پر پودوں کے لیے مضر نہیں ہے۔ **تریاق:** کوئی مخصوص تریاق معلوم نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔ کیڑے مار دوا کے استعمال کی تکنیکوں سے متعلق اچھے طریقے۔ **مقدار/رقبہ (فی ہیکٹر):** جیسا کہ جدول میں ذکر ہے۔ **موسم کی حالت (عام طور پر):** جب ہوا مستحکم اور مثالی ہو اس وقت چھڑکاؤ کریں۔ 30 ڈگری سیلسئس سے زیادہ درجہ حرارت میں چھڑکاؤ کرنے سے گریز کریں۔ **مٹی اور پانی (جہاں قابل اطلاق ہو):** اس وقت چھڑکاؤ کریں جب مٹی میں مناسب نمی ہو۔ **استعمال کی تکنیک:** فولیئر اسپرے۔ **استعمال کے اوقات:** بیماری کی پہلی علامت ظاہر ہوتے ہی استعمال کریں۔ **فصل کے لیے چھڑکاؤ کا مرحلہ:** چھڑکاؤ فصل کی ابتدائی نشوونما کے مرحلے پر کیا جانا چاہیے جیسے ہی بیماری ظاہر ہو۔ **آلے کی قسم:** کھوکھلے مخروطی نوزل فٹ کی گئی پیٹھ پر لاد کر چھڑکاؤ کرنے کی مشین یا ہائی والیوم والی چھڑکاؤ کرنے کی مشین۔ **نوزل کی قسم:** کھوکھلے شنک والی نوزل۔ **دوبارہ داخلے کا وقت:** 48 گھنٹے۔ **کٹائی سے پہلے کا وقفہ (دن):** جیسا کہ ٹیبل میں بیان کیا گیا ہے۔ **تعدد بشمول چھڑکاؤ کی زیادہ سے زیادہ تعداد:** بیماری کی شدت کے لحاظ سے 15-20 دن کے وقفے سے 2-3 چھڑکاؤ کریں۔ **وہ مراحل جن کے دوران کسی بھی فصل پر کیڑے مار ادویات کا استعمال نہیں کیا جانا چاہئے:** فصل کے پکنے کے دوران اور فصل کی کٹائی سے بالکل پہلے استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ **مفید کیڑے مثلاً شہد کی مکھیاں اور قدرتی دشمنوں کو نقصان سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر:** چونکہ شہد کی مکھیاں اور دیگر جرثومے دن کے وقت خوراک تلاش کرتے ہیں، لہٰذا اسپرے صبح سویرے یا شام دیر سے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ ان کے سامنا ہونے کا خطرہ کم ہو۔ **مقصد:** صرف زرعی استعمال کے لیے۔ **ذخیرہ کرنے کی شرائط:** 1. فنگسائڈ کے ڈبوں کو علیحدہ کمروں یا جگہوں میں اس جگہ یا کمرے سے دور ذخیرہ کیا جانا چاہئے جسے دیگر اشیاء خاص طور پر کھانے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو یا کیڑے مار دوا کی نوعیت کے مطابق الگ الماری میں تالا چابی لگا کر ذخیرہ کیا جانا چاہئے۔ 2. فنگسائڈ کے ذخیرے کے لیے مخصوص کمرہ یا احاطہ مضبوط بناوٹ کا، خشک، اچھی طرح روشن، ہوادار اور مناسب طول و عرض کا ہونا چاہیے۔ **استعمال شدہ کنٹینر کی تلفی:** 1. خالی ڈبوں یا بچے ہوئے مواد اور دھوئے ہوئے پانی کو محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جانا چاہئے تاکہ ماحولیاتی یا آبی آلودگی نہ ہو۔ 2. استعمال شدہ ڈبوں کو باہر نہ پھینکا جائے تاکہ ان کے دوبارہ استعمال کو روکا جا سکے۔ 3. خالی کنٹینرز کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ ان کو پانی سے تین بار دھویا جانا چاہئے اور دھلائی کا پانی اسپرے کے محلول میں ڈالا جانا چاہیے۔ 4. ڈبوں کو توڑ کر انھیں آبادی سے دور زمین میں دفن کر دیا جائے۔ خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔ **کیمیائی ترکیب:** سلیکان ڈائی آکسائیڈ (اینٹی کیکنگ) 6.7% وزن/وزن، الکائل نیفتھلین سلفونک ایسڈ کا سوڈیم نمک (گیلا کرنے والا ایجنٹ) 2.4 % وزن/وزن، ایکووس ایملشن میں پولی میتھیلسیلوکسین (ڈیفومر) 0.8% وزن/وزن، سوڈیم لگنو سلفونیٹ (مشترکہ ڈسپرسنٹ) کیو. ایس. % وزن/وزن، ڈائمتھومورف فعال جزو 12.0 % وزن/وزن، پیراکلوسٹروبن فعال جزو 6.7 % وزن/وزن، فارمل ڈی ہائیڈ (منتشر کرنے والے ایجنٹ) کے ساتھ نیفتھالین سلفونک ایسڈ کے گاڑھا کرنے والے پروڈکٹ کا سوڈیم نمک 25.0% وزن/وزن، کاولن (کیریئر) 20.0% وزن/وزن، کل 100% وزن/وزن۔ **احتیاطی بیان:** 1. لیبل اور کتابچہ میں بیان کردہ مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ 2. کتابچہ میں دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کے بعد کنٹینرز کو تلف کر دیں۔ 3. آبی ذخائر میں ملانے سے بچیں کیونکہ یہ پروڈکٹ مچھلیوں اور شہد کی مکھیوں کے لیے زہریلا ہے۔

Urdu

445.00 mm